

حيوانات لبنان البرية والمائية

أي حيوانات لبنان الأبدية من بريّة ومائيّة

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

مَشَوْرَاتُ الْجَامِعَةِ الْبَيْتَانِيَّةِ
المكتبة

قِسْمُ الدَّرَاسَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ

٩

٢٥٣٦

حَيَوَانَاتُ لَبْنَانَ الْبَرِّيَّةِ وَالْمَائِيَّةِ

أَيُّ حَيَوَانَاتِ لَبْنَانَ الْأَبَدَةِ مِنْ بَرِّيَّةٍ وَمَائِيَّةٍ

١٠ أَرْصَافٍ ١٩٨٥



بِقَلَمِ
إِدْوَارِ غَالِبِ
مُهَنْدِسِ زَرَاعِي

كَلِيَّةُ التَّرْبِيَّةِ
المكتبة

الجزء الثاني
الطَّيْر



بَيْرُوت

١٩٧٠

لمحة تاريخية

عندما نذكر الطائر، اي طائر كان، وقبل ان نشاهده، نتصور في مخيلتنا بعض ما انطبع في خلايا جهازها اللاقط الحافظ عن هذا المخلوق الذي يحلق في الفضاء فوق اليابسة والماء بعيداً عن ترهات الناس، قصي البعد عن مهارات الاسياد، ومسكنة الانظمة الاجتماعية ودساتيرها، وسخافة ملاجن الحرية والعدل والمساواة...

مخلوق يتميز بالطيران كما يتميز بالريش والمنقار. واذا كانت القدرة على الطيران ومقياس طاقته وجهده ونشاطه تختلف من طائر الى طائر كما هي الحال بين العقاب والهدهد. او كادت تتلاشى كما في الدجاج الاهلي والفرغر. او اضمحلت تماماً كما في العوادي كالنعامة والروحاء والشبنم... فهذه الشذوذ لا تنال من التعريف العام ولا تنقص شيئاً من قيمة القنوس الجوهريّة التي يرتكز عليها.

لذلك يمكن القول ان خاصية الطيران مع الريش والمنقار هي الركائز الاساسية التي يتميز بها الطائر.

واذا كان معظم الحشرات وبعض الثدييات كالخفافيش والوطايط يستطيع الطيران ايضاً فهذا لا يشوب الطائر ولا يغالط تحديده.

وقبل البحث في اهلية الطيران او خاصيته وما تستوجه من تكوين جسماني خاص، لابد من الرجوع الى الاحافير العائدة الى عصور واحقاب ما قبل التاريخ التي مكنت اصحاب الاختصاص من كشف النقاب عن بعض الحقائق الراهنة وعن معظم ما كان يساور الشكوك في التقدير والترجيح... فترى اولاً ان الطيور والثدييات تشترك في بعض الصفات الجسمورية العامة التي تحدّرت من اصليهما منذ التكوين البدائي قبل صراع مناشع التطور.

ونرى ايضاً ان روابط التشابه بين الطيور والزواحف كانت وثيقة الاوصار، متابعة الحلقات، ممّا يدعو الى القول بان الزواحف كانت اسلاف الطيور واصولها الغابرة الى نحو ٢٠٠ او ٢٥٠ مليون سنة. وان الزواحف والطيور ان اختلفتا، اليوم، في المظهر الجسموري الخارجي فواجه الشبه الشوزبية الداخلية لا تزال جلية في بناء الهيكل العظمي وواضحة

لمحة تعريفية

الطيور صف حيوانات فقارية بيوض من ذوات الريش والدم الحار والحرارة الثابتة. جميع ميزات الجسمانية ان شوزية او جسمورية وثيقة الصلة بخاصة الطيران. وتمكيناً لهذا الهدف، تلاشت منها بعض الاعضاء وانحصر فيها مركز الثقل فاصبحت اجهزة الجسم دقيقة قوية تستطيع ان تجبه المجهود الذي يتطلبه كفاح عناصر الاجواء.

لذلك فهي بمعظمها انسيابية الشكل، خفيفة الوزن النسبي، دقيقة العظم. وعظامها غنية باملاح الكالسيوم التي تفعم الصلابة. اما تجاويف العظام فهي اما مملوءة بالهواء الذي يخفف من وزنها دون ان يضر صلابتها كما هي الحال في الجوارح والقواطع والضواري، اما مملوءة بالنخاع كما هي الحال في الطيور الجارية التي لا تستوجب معيشتها الانتقال البعيد ومكافحة عناصر الطبيعة.

والريش فضلاً عن كونه اداة الطيران فانه الغطاء الواقي لحرارة الجسم ولطاقته المحركة التي تشمل جميع الاجهزة اخصها اجهزة التنفس والدورة الدموية.

مناقيدها واعناقها وقوائمها واصابعها ومخالبها متباينة الاشكال المختلفة لكنها تتفق دائماً مع طبيعة حياة الطائر.

جهازها العصبي مرهف الاحساس يمكنها من الشعور باقل مؤثرات البيئة. وكذلك حواس السمع والبصر العظيمة الدقة والنشاط. ومما يزيد بصر الطير حدة، احتواء مخاريط عينونها على كريات زيتية تمتص بعض الالوان اخصها اللون الازرق وتحول دون استقبال الامواج الضوئية المنحرفة بتأثير الاتربة والضباب. لذلك فالطير يبصر من بعيد ما هو كامن في الجو وتحت زرقة السماء والغبار والضباب.

اما حواس الشم والذوق فانها كثيرة التباين ويمكن القول انها بادية الضعف عند معظم الاجناس.

اما الغدد الجلدية فقليلة جداً، والغدد التنحية لا وجود لها، انما يوجد في اعلى العصوص، عند مغرز الذنب، غدة صغيرة الحجم تدعى الغدة الزيتية يجتمع فيها افراز

لا تقبل الجدل اذا ما قورنت بالاثار الباقية من الحزام الحوضي وبحراشف الاطراف الخلفية الحجفية والسردية وتكوين المخ وبعض الاجهزة الداخلية اخصها الجهاز الهضمي.

وتشابه الطيور والزواحف ايضاً في كونها حيوانات بيوض. الا ان الطير بمعظمه يعني بحضانة البيض ورعاية الفراخ في حين ان الزواحف تضع البيض وتركه لعناية الاقدار ورعايتها. ومع ذلك فانه يوجد بين الطير اقلية تبيض ولا تحضن كالثقبان والبططاب والنهق والينتوح... ويوجد بين الزواحف من هي حاضنة كالاصلة وسرلودة كمعظم الافاعي وبعض الثعابين والعطاء.

واذا عدنا قليلاً الى سطم الكائنات الحية عبر احقاب التاريخ الكوني المقدر، نرى ان حفرة اول طائر معروفة حتى الآن تعود الى الساف الجوري من ارضين الحقبة الثانوية التي تميزت بانتشار الزخافات وبظهور الطيور واللبونات.

وعند التدقيق في حفرة هذا الطائر البائد الذي يدعى اركيوبتاريكس نرى انها قريبة الشبه من بعض الزواحف البائدة وان الفروقات الهيكلية القائمة بين طائر هذه الحفرة وبين الطائر المعاصر لا تعدى بعض عمليات الاندغام والاختزال مثال ذلك ان المخطين كانا مزودان باسنان، وان الاطراف الامامية كانت تحمل ثلاث اصابع منفصلة مخليية، وان الذنب كان كثير الفقرات، بالغ الطول قصير الريش.

لذلك، وبعد التطور النفعي الذي مرت به هذه الحيوانات منذ التكوين البدائي اللامؤرخ الى الحالة الاحفورية الراهنة ثم المؤرخة والمعاصرة المنظورة... نرى انها سارت بتطورها سير جميع المخلوقات من حيث الهدف الحيائي او تنازع البقاء الذي اوجب سلوك ملجن اعسامي خاص قضى بتحويل الاجهزة التي يتطلبها جهد الطيران ويستلزمها نهج الانتقال في الفضاء.

زيتي يستخرجه الطائر بضغط المنقار فيطلي به الريش لوقايته من عبث الماء.

وأعضاء التناسل في الطير تتألف عند الذكور من تليستين وحالبين وحوصلة نودلية الشكل يجتمع فيها الكراض تقوم مقام القضيب عند البك. يستثنى من هذا التديير العام بعض الطيور القليلة العدد من البط والاوز والعوادي مزودة بقضيب ميزابي السطح، عادم القناة الداخلية، ينقل الكراض، عند البك، في مجرى اخدوده السطحي. أما أعضاء شوار الاناث فهي كاملة العدة لكنها لا متساوية العمل والانتاج لان عملها ونتاجها يقوم بهما جهاز الميسرة المؤهب للاخصاب بينما يستمر جهاز الميمنة هزيلًا ضامراً عقيماً حتى الموت. انواع الطير المعروفة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ تجتمع في اطار ١٢٩ فصيلة، تنتمي الى ٢٤ رتبة، تنضم تحت لواء ثلاث شعب: الجوجيئات والعوادي وعديمات الريش.

فشعبة الجوجيئات تجمع ٢١ رتبة وتشمل ١٢٤ فصيلة، أشهرها التدرجيات والحماميات والوزيات والصقريات والزقاقات والضوضيات والخطافات والبوميات والبيغاوات والطرغونيات والتفلقيات والناقويئات والوقواقيات والبلشونيات والبعجيات والنورسيات والبطريقيات... وشعبة العوادي او الرواكض تشمل اربع فصائل، النعاميات والروحانيات والشبنيئات والكيبويئات، جميعها ارضية المسرح تتميز بالعدو بدلاً من الطيران.

أما شعبة عديمات الريش فهي وحيدة الرتبة والفصيلة. اشهر اجناسها الطسناج والطرسوح والبطريق. جميعها مائية المسرح تتميز بارياشها الخاصة ويقصر اجنحتها الزعنفية الشكل المستحالة الى اداة تجذيف للسير فوق سطح الماء بدلاً من الفضاء.

طيور لبنان الأوابد والضوارب

بعد هذه المقدمة التعريفية المقتضبة عن الطيور عبر احقاب العصور الغابرة والدفينة وما طرأ عليها من تطوير وما هي عليه الآن في الزمن الحاضر. نعود الى محور بحثنا الرئيسي وموضوعه ذكر الطيور الموجودة في لبنان وتحليلتها نوعاً نوعاً. هذا، وأنا لا نذكر منها القواطع التي تمر في سماء لبنان ولا تبيت في ربوعنا ليلة.

la Baléarique	والغرناق	le Héron	كالبلشون
la Grue	والكركي او الرهو	l'Épervier chatain	والبيدق
le Faucon pigeon	والكونج الدبسي	le Tantale	والتنطل
le Kobez	واللزيق	la Bondrée	والحوام
le Busard	والمرزة	le Pygargue vulgaire	والشميطة
le Flamant	والنحام	l'Aigle doré	والعقاب الذهبية
		l'Épervier majeur	والعلام


ولا نذكر الدخيلة التي يتعاطى تربيتها الانسان لانها تخرج عن نطاق هذا البحث ومفهومه

le Paon	والطاووس	les Poules	كالدجاج
le Faisan	والندرج	les Pigeons	والحمام
le Canari	والكنار	les Pintades	والغرغر
le Perroquet	والبيغاة	les Dindons	والحبش او الديك الرومي
la Perruche	والدرّة	les Canards	والبط
		les Oies	والاوز

انما نذكر الاوابد التي تقيم طوعياً في البلاد، والضوارب التي تضيف ربوعنا بعض الوقت. وقد قسمناها كالحيوان الى ثلاث فئات: النافعة والمتوسطة النفع والضارة. وسنوردها ابجدياً بدون مراعاة الفته والفضيلة.

أَبْلَقُ الْقَلْعُ	بُوَهَةٌ	خَيْلٌ	دُرْسَةُ سَوْدَاءِ الرَّأْسِ
أَبُو الْحَرْنِ	تُبْسُ سِرْيَانِي	خُرْقَةٌ	دُرْسَةُ صَفْرَاءَ
أَبُو زُرَيْقٍ	تِرْعَلَةٌ شَائِعَةٌ	خُضَارٌ مَبْدُولٌ	دَعْنَانُشٌ مَبْدُولٌ
أَبُو طَيْبِطٍ مُتَوَجِّعٌ	تِرْعَلَةٌ مُطَوَّقَةٌ	خُضَيْرٌ	دَلَمٌ
أَبُو قَلَنْسُوَةٌ	تِفْلِقُ الْمَاءِ	خُطَافُ الْمَدَائِحِينَ	دُورِي الْبِيَادِرِ
أَبُو لُؤَيٍّ	تُقَيْفِيحِي مَبْدُولٌ	خُطَافُ النَّوَاذِ	دُورِي الْبِيُوتِ
أُرْطَلَانٌ	تَنْجِي فِرْمِزِيٌّ	دُجٌّ أَرْزَقٌ	دُورِي الْغَابِ
أَكْحَلٌ	جُشْنَةُ الْحَصْلِ	دُجٌّ الصُّخُورِ	دُعْرَةُ الرَّبِيعِ
بَارِزِيٌّ	حَجَلٌ أَحْمَرٌ	دَجَاجَةٌ الْأَرْضِ الْمَبْدُولَةُ	دُعْرَةُ بَلْقَاءَ
بَاشِقٌ مَعْرُوفٌ	حَجَلٌ رُومِيٌّ	دَجَاجَةٌ الْمَاءِ الْمَبْدُولَةُ	دُعْلُوقَةُ الزَّيْتُونِ
بَجْعٌ أَشْفَحٌ	حِذَاءُ حَمْرَاءَ	دُخْلَةُ الْبَسَاتِينِ	رَخْمَةٌ
بُرْمَكَةٌ	حِذَاءُ سَوْدَاءَ	دُخْلَةُ ثَرْنَارَةَ	زَاغٌ
بَعْفَةٌ مَبْدُولَةٌ	حَدَفٌ شَتَوِيٌّ	دُخْلَةُ شَائِعَةٌ	زُرْزُورٌ مَأْلُوفٌ
بُبْلٌ لُبْنَانِيٌّ	حَدَفٌ صَيْفِيٌّ	دُخْلَةُ سُوَالَةَ	زُرْقٌ الشَّرْقِ
بُوبَانَةُ الطُّيُونِ	حُرٌّ	دُخْلَةُ غَرِيدَةَ	زُعْرُوعٌ أَغْبَسٌ
بُوفَيْقَةُ سُلْطَانِيَّةٌ	حَسُونٌ	دَخْنَاءُ	زَفْرَاقٌ مُذْهَبٌ
بُومَةٌ أَدْنَاءُ	حَنْمَةٌ	دُرَاجٌ شَائِعٌ	زَفْرَاقٌ مُطَوَّقٌ
بُومَةٌ صَمْعَاءُ	حَيْدُونٌ	دُرْسَةُ رَمْدَاءَ	زُمَيْجُ الْمَاءِ الْأَرْقَشِ

زُمَيْجُ الْمَاءِ الْأَغْبَرِ	صِرٌّ الصُّخُورِ	عَنْدَلِيبٌ	مُتَوَقِّلُ الْغَابِ
سُبْدٌ شَائِعٌ	صِرَارَةٌ الْمَتَوَسِّطِ	غُرَابٌ أَبْقَعٌ	مُرْعَةٌ شَائِعَةٌ
سَقَاوَةٌ شَائِعَةٌ	صُرْدٌ أَرْبَدٌ	غُرَابٌ لُبْنَانِيٌّ	مُرْقَةٌ
سَمَامَةٌ الصُّرُودِ	صَعْوَةٌ قُبَيْرِيَّةٌ	غُرَّةٌ سَوْدَاءُ	نَدَاخَةٌ
سَمَامَةٌ رَبْدَاءُ	صَعْوَةٌ مُجَدَّعَةٌ	فُدَادَةُ الشَّرْقِ	نَسْرُ الْجَوَاءِ
سَمَامَةٌ سَوْدَاءُ	صُفَارِيَّةٌ مَبْدُولَةٌ	فِرْيٌ مَبْدُولٌ	نَعَارٌ
سَمْرَمَرٌ	صِفْرِدٌ	فُبْرَةُ الْحُقُولِ	نُقَازٌ مَبْدُولٌ
سُمْنَةُ اللَّدْبِقِ	صَقْرٌ	فُبْرَةُ الْغِيَاضِ	نُقَارٌ أَحْمَرُ الرَّأْسِ
سُمْنَةُ مِجْوَالَةَ	صَقْرُ الْجِرَادِ	فُبْرَةٌ مُتَوَجِّعَةٌ	نُقَارٌ صَغِيرٌ
سُمْنَةُ مُطْرِبَةَ	طَرَبَالٌ مُطَوَّقٌ	فُرْقَفٌ أَرْزَقٌ	نُقَارٌ كَبِيرٌ
شَاهِينٌ	طَيْطُوِيٌّ أَحْمَرُ السَّاقِ	فُرْقَفٌ كَبِيرٌ	نُقَشَارَةُ الْحَدَائِقِ
شُحْرُورٌ أَسْوَدٌ	طَيْطُوِيٌّ أَخْضَرٌ	قِرْلَى شَائِعٌ	نُقَشَارَةُ صِنَائِيَّةٌ
شُحْرُورٌ سُورِيٌّ	عَاسِقٌ مَعْرُوفٌ	قَشْعَامٌ أَكْلَفٌ	نُهْبُوعٌ نَاحِسٌ
شُرْشُورٌ مَبْدُولٌ	عُضْفُورٌ الشُّوكِ الْجَبَلِيِّ	قَطَاةٌ شَرْقِيَّةٌ	هَازِجَةٌ السُّعْدِ
شَرْقٌ	عُضْفُورٌ الشُّوكِ الصَّغِيرِ	قَطَاةٌ كُذْرِيَّةٌ	هَازِجَةُ الْقَصَبِ
شُسْنَةُ خُضْرَاءَ	عُقَابٌ سَقْعَاءُ	قَيْوْنُ الْغَابِ	هَذْهَدٌ شَائِعٌ
شُقْرَاقٌ أَرْزَقٌ	عُقَابٌ قَيْصَرِيَّةٌ	كُرْوَانٌ مَبْدُولٌ	هَزَارٌ أَشْرَقٌ
شُكْبَةٌ صَغِيرَةٌ	عُقَابٌ مُسِيرَةٌ	كُعْمَرٌ مَبْدُولٌ	وَرَشَانٌ
شُكْبَةٌ مَبْدُولَةٌ	عُقَابٌ مُؤَزَّرَةٌ	لَقْلَقٌ أَيْبِضٌ	وَصَعَةٌ
شُنْدَلٌ أَنْمَرٌ	عَقْعَقٌ مَعْرُوفٌ	لَهَيْبٌ أَسْوَدُ الرَّأْسِ	وَقَوَاقٍ أَرْبَدٌ
صَدْيٌ	عُلْعُلٌ مَعْرُوفٌ	لَهَيْبٌ أَسْوَدُ الزُّورِ	



أَبْلَقُ الْقَلْعِ ، قَلْبَعِي

نوع من الأبلق وهو عصفور من الجوائم وفصيلة الحشروريات . صغير القدّ، ابلق الثوب ، يكثر من الوقوف على القلع والصخور ولذا سميّ ابلق القلع وقلبي . موطنه شاسع الاطراف يشمل معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم . اعطانه اللبناية تمتد من السواحل الى الجرود .

جسمه صغير القدّ . طوله نحو ١٦ سم . وبسطه لا تقلّ عن ١٨ سم . ثوبه الى الكهبة الرمادية الزاهية . صدغاه الى البياض . محسراه وحتار عينيه حتى قاعدة المنقاد الى السواد الفحمي اللامع . جناحاه الى السمرة السوداء . ريش ذنبه ابيض القاعدة والنصف الاول ، اسود النصف الاخير ، يستثنى منه رفلتا الوسط العادمتا البياض . زوره وصدرة الى الصهبة . بطنه وخوافيه وافنيكه ببيض . حدقة عينه خرنوبية اللون . منقاده اسود الحلة ، دقيق ، مستقيم . رسغاه واصابعه الى السمرة السوداء . مخالبه نحيلة ودقيقة .

الانثى اصغر قدّاً من الذكر واكثر صهبة منه واقلّ اسوداداً ولعة .

يألف الاجرال والبراص والاراضي المذحاة والكروم وحواشي الحقول المزدرة . وهو رشيق الحركة ، كثير الانتقال ، شديد الحذر ، يتحرّز من كل شيء جديد وخاصة من الانسان . يمتيز بكثرة الشكر وباستمرار استئالة الذنب وخفضه .


طيرانه سفيف قصير الشوط متتابع التصفيق . زرقته عادمة التوقيع ولكنه لا ينقطع عن ترديدها طوال النهار .

يسرح من الشروق الى الغروب . قوته الحشرات والهوام واخصها غمديات الجناح والحرفيات والذباب والديدان والاساريع ، يختطف الطائر منها في الفضاء وبلتقط الجاثم منها والداب بسرعة السهم .

يدنّ عشّه في اوقاب الصخور وصدوع الاطلال والخرائب وتجاويف الاشجار وبين اكوام الحطب وفي الشجيرات الجئلة الصوجانة . عشّه صاجي الشكل ، متوسط التقعير ، غليظ الحبك يبطنه بالصفوف والريش والزغب والغفر . الانثى تضع في اوائل ايار من ٥ الى ٧

N.S. Saxicola œnanthe, *œnanthe œnanthe*.
Fr. Traquet motteux, Motteux, Sacristain, Cul-blanc, Tarier.
Eng. Wheatear, Fallow-finch.

بيضات لونها الى البياض الاغبر الازرق المواج تعلوه رقشة خفيفة جووية او خضراء . الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء ثم رعاية الفراخ والعناية بها . يعتبر من العصافير الجزيلة النفع ، العادمة الضرر ، الواجب حمايتها .




N.S. Erithacus rubecula,
Rubecula familiaris.

Fr. Rouge-gorge, Rouge-gorge familier.

Eng. Robin, Robin-redbreast.

أبو الحنَّاء، أبو الحنَّاء



N.S. Garrulus glandarius.

Fr. Geai glandivore,
Geai vulgaire, Geai des chênes.

Eng. Common Jay

أبو زريق،
زرياب البلوط

طائر من الزرياب وفصيلة الغراييات. موطنه يمتد من الهند الى الشرق الادنى ومعظم الاقطار الارويية، اعطانه اللبنانيه تمتد من الوسط الى الجردود.

جسمه متوسط القد، قدره قدر اليمامة، طوله نحو ٣٥ سم. وبسطه نحو ٤٢ سم. ثوبه اصدا اللون مجدع الجناحين بزرقه وخضار وسواد وبياض. ريش قترعته الى البياض الازرق الموج يعلوه تخطيط طولي اسود. عنقه مجدع بجذتين يمتنى ويسرى لونهما الى السمرة الفحمية. زوره وعجزه وزمكاه الى البياض الساطع. جناحه مستعرض الشكل متوسط الطول. ذنبه مستطيل القد، رتاجي الريش، اسود اللون، اربد القاعدة. مناقده مستغلظ الجرم، مخزري الشكل، مسن الطرف الاعلى، اسود اللون. عينه كبيرة مطوقة بالاسود. حدقة عينه الى الزرقه العابقة. ساقه واصابعه الى الحنطي الاسمر. مخالفه مستغلظة، معتدلة التحجين، شديدة السمرة.

الشقان لا يختلفان قدًا وثوبًا.

يألف الاحراج واخصها احراج السديان. وهو نشيط الهمة خفيف الحركة، شديد الحذر، أرب رواع. يسير على الارض بخفة ويتسلق الاغصان برشاقة. طيرانه متقطع الشوط القصير القاب.

قوته البلوط والحبوب والتفاح والثمار اليانعة وجميع انواع العصافير الصغيرة وجلابيها ويبيضها والفار والعطاء والحشرات

يدئن عشه في الاشجار الصغيرة الداسية على ارتفاع بضعة اقدام من الارض. الانثى تبيض في اواخر نيسان من ٥ الى ٧ بيضات لونها الى الشبهة الخضراء الموج يعلوها تبيح حنطي. الحطن يستمر نحو ١٧ يومًا تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. يألف القفص ويتقبل التأديب فيقتبس الاصوات ويرددها.

يعتبر من الطيور الضارة المؤذية لانه اوقع نهاب لجلابي العصافير ويبيضها والدعدو لثمار المتافع الجردية التي ينختها الواحدة تلو الاخرى.


طائر من العصافير وحيد الجنس والنوع من فصيلة الشحروريات. موطنه الشرق الاوسط واروية وافريقية الشمالية والشرقية. وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان وقتًا طويلاً نحو سبعة اشهر من كل عام.

جسمه صغير القد، منسوب التقاطع، يطول نحو ١٥ سم. وتبلغ بسطته نحو ١٩ سم. ثوبه جميل الالوان. رأسه ورداؤه وظهره وجناحه وذنبه الى الشبهة السمراء. جبهته ومقدم محسراه وزوره وصدرة الى الحمرة البرتقالية. مؤخر محسراه ولواحف كلاه الى الشبهة الزرقاء الموج. عجزه زيتي الماجة. اسفل صدره ومقدم بطنه وابطلاه الى الصفرة الرمادية. مؤخر البطن والافنيك الى البياض الاغبر يعلوه موج فضي. عيناه كبيرتان، مستديرتان. حدقة عينه الى البتي الداكن. مناقره حنطي اللون، اسمر الموج. رسغاه واصابعه بنية. مخالفه دقيقة سمراء. الشقان لا يختلفان قدًا وثوبًا واليافع منه كالبالغ.

يألف الادغال والحدائق والجنائن والبراري على السواء وكروم التين والعنب. وهو من العصافير الغريدة، الحذرة، الزرقه الطباع، الخفيفة الحركة والسريعة الانتقال والقصيرة الشوط قوته الحشرات على اختلاف انواعها من التملة الى اليرقة والدودة والفراشة.


يدئن في الادغال والاشجار الفناء. عشه قدحي الشكل متوسط الحبك والصنع يغلفه بالطحلب ويطنه بالحشيش الناعم والسبيب والصوف. الانثى تحضن من ٥ الى ٧ بيضات مرتين في العام. المرة الاولى في اوائل ايار والمرة الثانية في اواسط حزيران. يبيضها ابيض اللون تعلقه رقشة بنية يكثر تجميعها عند العقب. الترخيم يستمر من ١٣ الى ١٤ يومًا تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

يعتبر من العصافير النافعة الواجب حمايتها.



N.S. Sylvia atricapilla.
Fr. Fauvette à tête noire.
Eng. Black cap.

أبو قَلَنْسُوءَة



N.S. Vanellus vanellus,
Vanellus cristatus.
Fr. Vanneau huppé.
Eng. Green Plover.

أبو طَيْبُ مَتْوَج ، طَيْبُ مَتْوَج ،
زَقْرَاقُ شَامِي ، أبو بَيْق ، طَرْطَيْس

طائر من الدخخل وفصيلة الدخليات وهو من عصافير التين المشهورة. موطنه يمتد من باكستان الى الشرق الاوسط واروثة وافريقية الشمالية والشرقية. وهو من الضواري التي تقيم في لبنان نحو ستة اشهر.

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٤ سم. وبسطته نحو ١٨ سم. منقاره صغير الجرم مدبب الطرف. جناحه معتدل الطول والانفراج، اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبه متوسط الطول مخدوش الطرف يرتكب من اثنتي عشرة رفة.

الذكر اسود الرأس يدعى «الخوري». رداؤه وظهره وجناحاه وعجزه وذنبه الى الجؤوة الرمداء. زوره وصدره وبطنه الى الصهبية الزرقاء. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره ورسغاه واصابعه الى الصهبية الرصاصية الموج. مخالبه نحيلة، دقيقة، محججة، سمراء.

الانثى مغراء الرأس تدعى «الشماس» وثوبها افتح لوناً من ثوب الذكر وبطنها يسيل الى الغبرة البيضاء الموج.

يسرح من الفجر الى الغروب. مرتعه الجنائن والحدائق والبساتين والادغال. يتميز بالنشاط والخفة والرشاقة وحسن التغريد وعذوبة الالغان. يألف الففص ويقتبس اصول التغريد.

قوته الهوام والحشرات الصغيرة والثمار البانعة المختلفة واخصها التين.

يدثن عشه في الشجيرات والجنبات الشائكة. الانثى تبيض مرتين في السنة. المرة الاولى في مطلع ايار والثانية في اواسط تموز. حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الصهبية المغراء تعلقها نقط سود مبعثرة بدون قياس. والحضن يستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

يعتبر من العصافير الضواري المتوسطة النفع.

طائر من الزقراق ينتمي كسائر انواع جنسه الى فصيلة الزقراقيات ورتبة طوال الساق. يدعى في مصر «زقراق شامي» و«قطقاط اخضر» وهو من القواطع التي تجوب الشرق واروثة وافريقية الشمالية والشرقية حتى خط الاستواء. يعتبر من الضواري التي تقيم في الربوع اللبنانية نحو ثلاثة اشهر من فصل الشتاء.

جسمه رشيق القوام قدره الحمامة. طوله نحو ٣٤ سم. وبسطته نحو ٤٥ سم. ثوبه العلوي الى السواد اللامع تعلوه زرقة وخضرة ومواج اسفع يرتكز على الاحمر والصنابي الذهبي. قمة رأسه وقنزعتة وجدة زوره واعلى صدره الى السواد اللامع. والقسم الآخر من صدره مع بطنه وخوافيه الى البياض العاجي. علاطا عنقه الى البياض الاغبر يعلوه توشيح اربد. قفنه الى الحنطي الاسمر. محسره الى البياض الاكدر يعلوه خط اسود ترتكز عليه العين ويمتد نحو مؤخر الرأس. جناحه فضفاض يلحف الذنب. كرسوع منكبها مجهز بمنخس قرني المادة مدبب الطرف. ذنبه قصير، مستدق، ابيض النصف الاول، اسود النصف الثاني، حنطي الافنيك. عينه مطوقة ومكحلة بالحنطي الاسمر. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده اسود. ساقاه رفيعتان، نحيلتان، لونهما مع الاصابع الى الجؤوة الباهتة.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وتحتل بذات الثوب الا انه اقل لعة وزهائ وقنزعتها اقصر قدماً. يألف المناقع وضايف الانهار والغدران. قوته الحشرات والديدان والحلزون والبراق والرخويات والقشريات وبعض نواحي النباتات المنقعية. يرد الماء للشرب والاعتسالم اكثر من مرتين في النهار، خاصة في زمن الصيف. ويعتبر من ابكر القواطع في النزوح نحو بلاد مصيفها وفي العودة الى البلاد مشتاهها. اسرابه كبيرة، كثيرة العدد، تتقدمها في ترحالها ذهاباً أم اياباً، على مسيرة ساعة او ساعتين، طلائع من القدامى مهمتها انتقاء اماكن الحط المناسبة.

يدثن افحوصه بين الاعشاب في حفرة يفرشها بالحشائش الناعمة. الانثى تحضن من ٣ الى ٤ بيضات اجاصية الشكل لونها الى المغرة الفاتحة تعلقها رقشة سمراء داكنة. الترخيم يستمر من ٢٤ الى ٢٧ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر في اثناء الليل. يعتبر من الطيور النافعة.



N.S. Emberiza hortulana.
Fr. Bruant ortolan, Ortolan.
Eng. Ortolan Bunting.

أرطلان، دُرْسَة صَفْرَاء العُنُق،
بُلْبُل الشَّعِير، صَعْوَة الحَطَب

نوع من الدرس وهو عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم مشرومات المناقير. موطنه الشرق الادنى وبعض الاصقاع الاروية اخصها مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. اعطانه اللبانية تشمل جميع البلاد.


جسمه متوسط القد بطول من ١٥ الى ١٦ سم. وبسطه نحو ١٨ سم. رأسه وزوره واعلى صدره الى الصهبة الرمداء الزيتية الموج. عنقه الى الصفرة. رداؤه وظهره الى الصهبة العاقبة. اسفل صدره وبطنه الى الصفار الاطحل. جناحاه الى السمرة الموشمة والموشحة والمجدعة بالجووة العاقبة والصهبة والبياض. عجزه وزمكاه الى الصهبة الزاهية. ذنبه بلون الاباهر والقوادم. منقاده احمر اللون. عيناه مطوقتان بالاصفر. حدقة عينه كستية اللون. ساقاه الى الجووة الفاتحة الباهتة. مخالبه الى السمرة.

الانثى تتحلّى بثوب الذكر. اما رأسها فبني اللون، اسمر التخطيط. واعلى صدرها مرقط بالاسمر.

يألف الادغال والمراعي والسياجات والغابات الصغيرة المنفرقة. يسرح من الشروق الى الغروب ويغرد طوال النهار خاصة في زمن السفاد. طيرانه خليط من السيف والتخليق والحوم. سعيه على الارض رشيق الحركة خفيفها.

يدتن عشه في الادغال والسياجات. عشه قدحي الشكل جيد الحبك يغلفه بالحشيش والحزاز ويبطنه بالصفوف والسيب. الانثى تبيض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنتها تراوح من ٢ الى ٥ بيضات، لونها الى الوردي يعلوه وشم اسمر ونقط سود. الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

قوته الحشرات الصغيرة المختلفة وبعض البزور البرية.
يعتبر من العصافير النافعة الجديرة بالحماية.



N.S. Jynx torquilla,
Yunx torquilla.
Fr. Torcol, Torcol vulgaire,
Torcou.
Eng. Wryneck.

أبو لوي، لواء

طائر من المتسلقات وفصيلة النقرات. يدعى في مصر «ام الوى» موطنه يمتد من الهند الى الشرق الادنى واروية وافريقية الشمالية والشرقية. اعطانه اللبانية تشمل جميع البلاد واخصها الوسط والجرود الوسطى.

جسمه متوسط القد. قدره قدر الصرد، طوله نحو ٢٠ سم. وبسطه نحو ٢٢ سم. رأسه متوسط الحجم يتميز باللواء في جميع الاتجاهات. حدقة عينه عنائية اللون. منقاده مخروطي الشكل، ذلق الطرف، راثس القاعدة، لسانه متممط لكنه عادم المحاجم والملاقط. جناحه متوسط الطول، مستدير الكفاف. ذنبه مستعرض الشكل، رهل الرقال. رسغه سهفي القشار. رجله رباعية الاصابع. حادة المخالب السود.

ثوبه ادس اللون من قمة رأسه الى طرف ذنبه. دهسته ترتكز على الطحلة تعلوها تراويق وخطوط لولية تضرب الوانها من البني الى الجوزي. توشيم الظهر ادكن من توشيم الرداء والعجز. زوره وعنقه الى الصفرة المجدعة بالاسود. صدره وبطنه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمراء ثلاثية الاضلع. منقاده ورسغاه الى الخضار الاصفر تعلوه ماجة طحلاء.

الذكر والانثى متساويان في الثوب واليافع كالبالغ. يألف الاحراج المبعثرة الاشجار ويردد على بعض الاشجار المثمرة واخصها اللوز حيث يكثر النمل. قوته الحشرات الصغيرة وبنوع خاص النمل والديدان الكامنة تحت لحاء الاشجار. يسرح من الصباح الى المساء. طيرانه متقطع العيفة قصير الشوط. يتنقل على جذوع الاشجار واغصانها بحفة ولا يتسلقها كما يدل التعريف وكما يزعم البعض.

يدتن عشه في تجاويف الاشجار القديمة العهد. الانثى تضع من ٥ الى ٨ بيضات لونها الى البياض العاجي العادم الرقشة. الحضن يستمر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية.

يعتبر من الطيور الجزيلة النفع الجديرة بالحماية.



N.S. Astur palumbarius,
Accipiter gentilis.

Fr. Autour commun,
Autour des palombes.

Eng. Common Goshawk.

بَازِي ، صَقْرَبَاز ،
شَاه بَاز ، لُونِيحِي

طائر من البزاة وفصيلة الصقريات. موطنه شاسع الاطراف يشمل البلاد الاسيوية والافريقية والاروبية، يجوب معظمها ضارباً او قاطعاً ويقوم في بعضها اكثر من فصل، شتاءً كان او صيفاً. يعتبر من عوابر لبنان غير النظامية لانه لا يضيف ربوعه، على التوالي، كل عام ولانه يقيم فيه من يومين الى اسبوعين.


جسمه كبير القد. طوله نحو ٦٠ سم. وبسطه نحو ١٢٠ سم. وهو مستدير الرأس الابدس الاسفع. احمر العينين. اسود المنسر الشديد الانعقاد. ادبس الرداء والظهر والمنكبين والسقطين والذنب. زوره وصدرة وبطنه وابطلاه الى البياض الانمر الموشم بالاسمر. زفده وساقاه واصابعه الى الصفار الحنطي. مخالفه محجّنة حادة سوداء اللون.

الانثى اكبر قدماً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب.

يألف الاحراج الكثيفة النائية. يسرح في النهار ويعتبر من اعنف الكواسر واضيقها خلقاً. وهو خفيف الجناح، سريع الطيران، شديد الوثب والاقدام، شرس، حزم، جسور، متوحش. قوته كل ما استطاع اليه سبيلاً من الحيوان والطيور.

يدتّن وكره في الاشجار الباسقة وخصّها الصنوبر والشربين. الانثى تضع من ٣ الى ٤ رفنات لونها الى البياض الاخضر المواج تعلوه رقشة سمراء خفيفة. الحضان يستمر نحو ٣٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء والحماية عند الاقتضاء.

يعتبر من الكواسر الضارة المؤذية لانه شره نهم لا يعف عن داجن او غير داجن يتمكّن منه.



N.S. Emberiza calandra,
Miliaria europea.

Fr. Bruant proyer,
Proyer d'Europe.

Eng. Common Bunting, Corn-Bunting.

أَكْحَل ، كَحْلَاء ،
دُرْسَة كَبِيرَة ، قُمِيحِي


طائر من الجوائم مخروطيات المناقير ينتمي الى فصيلة الشرشوريات. موطنه يمتد من اطراف الشرق الادنى الى اروبة وافريقية الشمالية. وهو من العصافير الضوارب التي تجوب البلاد طلباً للرزق والمصيف والمشتى. يقم في لبنان بعض الوقت في زمن رحيله نحو اروبة وفي زمن ايباه نحو الجزيرة وحوض البحر الاحمر.

جسمه ممشوق القوام، قريب الشبه من الصغنج، يطول نحو ٢٠ سم. وبسطه لا تقل عن ٢٤ سم. ثوبه العلوي الى الطحلة البنية يعلوها تمشيق اسود وتعصيب حنطي. جبهته وقمة رأسه ومحسراه وقوادمه وذنبه مكحلة بالسمرة العابقة. زوره وصدرة وبطنه وابطلاه وافنيكه الى البياض تعلوه ماجة حنطية ورقشة مشرطة سوداء. عينه كبيرة مستديرة. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده مخروطي الشكل، معتدل القد، اصفر اللون، سيوري المواج، مسنن الافك الاعلى. جناحه معتدل الطول، ذلق الطرف، اطول قوادمه الاربع الاولى. ذنبه طويل القد، فارق الطرف. رسغاه واصابعه الى السمرة الحنطية الداكنة. مخالفه الى الطحلة السمراء القاتمة. الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب.

يألف السهول والمراعي ويجتنب الاحراج والغابات. يتميز بالنفور والوجل وبخفة الانتقال على الارض. طيرانه سريع الحركة، قليل التعاريج، كثير السفيف.

قوته بعض البرور والحبوب البرية والزراعية وبعض الحشرات الصغيرة والنمل والديدان. يدتّن عشه في الادغال وبين الزروع. انثاه تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة وتضع في كل حضنة من ٤ الى ٥ بيضات صغيرة القد، مستطيلة الشكل، غبراء اللون، حنطية المواج، سمراء الرقشة والتنقيب. الحضان يستمر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء.

يعتبر من الطرائد المرغوب فيها ومن العصافير القليلة النفع والاذى.



N.S. Pelecanus crispus.
Fr. Pélican frisé.
Eng. Crested Pelican.

بَجَعُ أَشَقَح

ومن اسمائه الحَوْصَلُ والقُوقُ والسَّقَاءُ والكُيِّ وجَمَلُ الماء. كنيته أَبُو شِلْبَةَ وَأَبُو جِرَابِ وَأَبُو قَرِيَّة.

نوع من البجع وهو طائر مائي من شاملات الكف وفصيلة البجعيّات. اعطانه تمتد من اروبة الشرقية والجنوبية الى الشرق الاوسط ومنغوليا. ويقطع في الشتاء الى مصر والسودان والخليج الفارسي والهند وجنوب الصين. يمر في الاجواء اللبنانية عند قطوعه نحو مصر والسودان والحيشة وقد يبيت في الربوع اللبنانية من ليلة الى ليلتين.

جسمه كبير القدّ. طوله يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. وبسطه من ٣٠٠ الى ٣٣٠ سم. رأسه معتدل الحجم. عيناه صغيرتان مستديرتان عاريتا الحواجب والجفون. حدقة عينه الى الصفرة الباهتة. منقاده كبير الجرم وشعي الشكل يحمل في مخطمه السفلي جعبة عظيمة كالجراب يخزن فيها صيده من السمك. ومنقاده حنطي اللون، رصاصي القاعدة والطرف، برتقالي الجعبة. عنقه مستطيل القدّ معتدل الثخانة. جناحه كبير مستعرض. اطول قوادمه الثالثة. ذنبه قصير، مستدير، يتألف من ٢٠ الى ٢٤ رفلة. ساقه غليظة، مثدونة، رمادية اللون. اصابعه مستطيلة كاملة الحظاب. مخالفه صغيرة.

ثوبه اشقح الريش الابيض المواج. ريش قنّته مستطيل، مقوس، مجعد. سيقان ريش المنكبين والظهر والجناحين والذنب الى السمرة القائمة. قوادم الجناح الى البني الداكن. صدره وبطنه الى البياض الاغبر الباهت، ويتوسط صدره بقعة فسيحة صفراء اللون.

الانثى اصغر قدّاً من الذكر ولكنها تتحلى بالثوب ذاته. اما اليافع فتوبه العلوي الى الطحلة البنية المواج وثوبه السفلي الى البياض الاغبر الارمد.

يعيش جماعات واسراً متفاوتة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٦٠ او ٨٠ زوجاً. يألف، عادة، المياه الضحلة ان عذبة او ملحة ذلك لان الوسادة الهوائية الكامنة تحت جلده تجعل قدرته على الغوص محدودة.

قوته الاسماك والقشريات.



N.S. Accipiter nisus.
Fr. Épervier commun,
Émouchet, Tiercelet.
Eng. Sparrow Hawk.

بَاشِقُ مَعْرُوفٌ ، طُوطُ

طائر من البواشق وفصيلة الصقريات. موطنه الاصلي، حيث يأبد صيفاً وشتاءً، يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الغربية. ومنهم من قال ان موطنه يمتد من اطراف آسية الغربية الى اروبة الشمالية باستثناء سكندنافيه والجزر البريطانية.

جسمه معتدل القدّ رشيق القوام. طوله نحو ٣٧ سم. وبسطه نحو ٥٤ سم. يتميز باستطالة الذنب وباستدارة السقط المتوسط الطول. ثوبه العلوي الى السمرة الرصاصية السبورية المواج الجلّية التوشيم. محسراه ولواحف اذنيه الى الصفرة. زوره وصدره وبطنه الى البياض الاغبر الموشّم بالجووة الصنافية. خوشاه وفخذه موشّم بخطوط دقيقة داكنة. ذنبه كبير القدّ، لونه الى الزرقة السبورية تعلوها خطوط معترضة سمراء داكنة. حدقة عينه صفراء زاهية. منسره صغير القدّ، سبوري اللون، اصفر الزفد، اسود البهرة الذرّبة الشديدة التحجين. ساقه واصابعه الى الصفرة الخضراء المواج. مخالفه قوية الانعقاد سوداء اللون.


الانثى قريبة الشبه من الذكر الا ان ثوبها العلوي ابرز في اللون البني وابهت في اللون السبوري. وثوبها السفلي يعلوه توشيم بني بدلاً من الجوّري الصنابي.

اما اليافع فتوبه العلوي الى البني الداكن يعلوه مواج امغر ناتج عن حافات الريش المحمّرة. وثوبه السفلي يراوح بين الابيض والاصفر الباهت تعلوه نمشة وتوشيم وخطوط جووية. يألف الاحراج والغابات. طيرانه حوم وسفيف قلماً يرتفع عن سطح الارض اكثر من ١٠٠ متر ولا يحوم فوق الارض الجرداء الا عند الصيد. وهو قوي النفس. حادّ المزاج، خفيف الحركة، شديد الحذر والوقاحة والعسارة والخديعة والزعارة.

قوته العصافير والقواضم والعطاء والحشرات.

يدتّن ولكنه بين شناعيب الاشجار وشخالفها واخصها السنديان والملول والشربين. الانثى تبيض من ٤ الى ٦ رفنات تحضنها وحدها نحو ٢٤ يوماً. رفنها الى البياض التبيني يعلوه تمشيش اشقح ورقشة سمراء تطوق العقب.

يعتبر من الكواسر الضارة لانه شديد الاذى يفتك بمختلف العصافير والطيور الداجنة.



N.S. *Anas platyrhynchos*
Fr. Canard colvert.
Eng. Mallard.

بُرْكَة ،

بَطَّ خُضَارِي ، شَرِيف خُضْرِي

طائر من الخضري ينتمي الى فصيلة البطيات ورتبة كفتيات القدم صفيحيات المناقير. موطنه فسيح الارحاء يشمل البلاد الاسيوية والافريقية والاروبية التي يجوب بعض اصقاعها كل عام. يحط في لبنان في اثناء قطاعه ورجاعه ولكنه لا يقيم اكثر من ثلاثة ايام وغالباً يوماً واحداً.

جسمه كبير القد. طوله نحو ٥٦ سم. وبسطه لا تقل عن ٦٦ سم. رأسه كبير مستطيل. منقاده كبير الجرم، صفيحي الشكل المستعرض المفلطح، اصفر اللون، اخضر الموج، اسود العقصة. فتحتا منثقيه اهليلجيتا الشكل مركزهما عند حدود الزام الاول من المنقاد. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنية اللون.

ثوبه يختلف باختلاف الشق. ثوب الذكر متراكب الالوان الجميلة يغلب فيها الاخضر الاطحل. رأسه وعنقه الى الخضار الاغيس العابق الاسفع الموج. عنقه مطوق بحزام ابيض يفصله عن الرءاء ومقدم الصدر. رداؤه وظهره الى البني الاطحل يعلوه وشم دقيق متعرج. منكباها ابهت لوناً من ظهره. جناحه كبير مدبب. اطول قوادمه الاولى والثانية. قوادمه ومناكبه وخوافيه بيضاء اللون، ويعلو خوافيه بقعة كالوذيلة، متوسطة الرحابة، ارجوانية البريق، بيضاء الاطراف. لواحف الجناح الصغرى والكلية الى البني الباهت. اباهره الى الزرقة الارجوانية الموج يحدها خط ابيض. عجزه وزمكاه الى الخضار الاسود. يشرد من زمكاه اربع رياش مستطيلة، مقوسة الطرف، تكتنف اواسط الذنب. ذنبه ابيض اللون يعلوه توشيم بني يتمركز عند اطراف الرفال. صدره كستني اللون. بطنه الى الريدة الغبراء يعلوها توشيم دقيق متعرج الخطوط، اغيس اللون، ايطلاه الى الطحلة الداكنة السوية. ابطاه الى البياض الناصع. افنيكه الى الخضار الاسود يحده من جهة البطن خط معترض ابيض. رسغاه واصابعه الى الحمرة الباهتة. اصابعه كاملة الحظاب، قوية المخالب القصيرة السوداء اللون.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وثوبها يختلف عن ثوبه وهو الى البني الفاتح الباهت يعلوه توشيم مزواني الشكل كستني اللون. رأسها من الجبهة الى القفن كستني اللون. عينها

يدئن افحوصه على ضفاف البحيرات والاهوار والمناقع بين الاعشاب الرفيعة القريبة من الماء. افحوصه حوض مستطيل الشكل بالغ الارتفاع لا يقل طوله عن ٢٥٠ سم. ولا يقل ارتفاع جوانبه عن ٧٠ سم. الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات. بيضتها كبيرة القد، مستطيلة الشكل، مدببة الطرفين، بيضاء اللون صفراء الموج. طولها نحو ٩٥ مم. وقطرها نحو ٥٨ مم. الحضن يستمر نحو ٦ اسابيع تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. يألف حياة الاسر ويعيش برفقة غيره من الطير.



N.S. Tyto alba alba.

Fr. Effraie commune,
Chouette effraie.

Eng. Barn-Owl, White-Owl.

بَعْفَة مَبْدُولَة ،
هَامَة ، أُم الصَّخْر

طائر من البوميات وعمارة البعفيات . تدعى في مصر « مَصَاصَة » موطنها بلاد حوض البحر الابيض المتوسط . وهي من رومس لبنان الآبدة .

جسمها متوسط القد . طولها نحو ٣٦ سم . وبسطنها نحو ٨٠ سم . ثوبها الى البياض المنمَّش بالاسود تعلقه زركشة لولبية الخطوط سمراء اللون ورمادية . نقابها قلبي الشكل ، عاجي اللون ، تعلقه رقشة صناعية خفيفة . منسرها اغبر اللون ، اصفر الموج ، جالس الانتشاب ، محجن البهرة . عيناها مكحلتان ، صغيرتان ، مستديرتان ، لونها الى السمرة السوداء . سقطاها مستطيلان ذلقان . ذنبها قصير القد ، مستعرض الشكل ، اصفر اللون ، يعلوه توشيم حنطي داكن . ساقاها كاسيتان . اصابعها حملية الرغب . مخالبا محججة ذرية سوداء اللون .

تألف الخرائب والاطلال والبيوت المهجورة والمقالع والاحراج القريبة من الاماكن الآهلة . تلتمس قوتها في الليل فتصيد الجرذ والفأر والعكابر والمناجد وجميع انواع الدويبات والحشرات .

الانثى تحضن مرة واحدة في العام ، غالباً في شهر نيسان ، ولا تبالى بأمر العش ولا تعتني بتحضيره لانها تضع بيضها في تجاويف الاشجار او في اوقاب الصخور او تحت الانقاض الخشبية وفي كل موضع مظلم . وهي تضع من ٤ الى ٦ رفنات مستديرة الشكل ، صغيرة القد ، بيضاء اللون . تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٣٢ يوماً .

تعتبر من الكواسر الروامس الجزيلة النفع الواجب حمايتها .

مكحلتان . زورها الى البني الاصفر الموج . قوادم جناحيها ومناكبها وخوافيها لا تختلف عما في الذكر . صدرها وبطنها الى البني الاصفر تعلقه رقشة كستنية .

اليافع يتحلّى بثوب الانثى حتى السنة الثالثة من عمره .

يألف المياه العذبة من المناقع الى الاهوار ومجاري الماء ووضفاف الانهر والبحيرات . يرغب في المياه الضحلة وفي المواقع الكثيرة النبات اخصها الاسل . يعيش جماعات كثيرة العدد باستثناء زمن التسافد والحضانة . وهو من الطيور البطيئة الحركة . عدوه على الارض ميح . طيرانه نشيط وسريع . يحط على الارض او على سطح الماء بخط عمودي مستقيم لا التواء فيه ولا تعريج ويطير كذلك كالنشاب . يعوم ويسبح بدون كلل ويعوض بخفة ولكنه لا يمكث كثيراً تحت سطح الماء .


قوته البلاعيط والديدان والرخويات والنباتات المائية وبعض الاعشاب البرية والحبوب . يبدن عادة بين اعشاب المناقع والاهوار وقلما يبتعد عن الماء الى الرياض الدغلة . عشه مجموعة من العيدان والقش تضع فيه الانثى من ١٢ الى ١٦ بيضة لونها الى الصفار الاخضر الموج . الحضن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن الحراسة على البيض في اثناء غياب الانثى للاكل مرة واحدة في الليل .

يعتبر من الطرائد الجيدة الصنف المرغوب فيها .



N.S. Pycnonotus xanthopyga.
Fr. Pycnonote du Liban, Turdoïde libanais.
Eng. Turdoid (Lebanon form).

بُلبُل لُبْنَانِي ،
كُعَيْت لُبْنَانِي ، نُغْر لُبْنَانِي



N.S. Butalis grisola,
Muscicapa striata.
Fr. Butalis gris, Gobe-mouche gris.
Eng. Spotted Fly-catcher.

بُوبَانَة الطَيُون

عصفور حاشر سكوت ، قليل التغريد والزقزقة ، من فصيلة المذبذبات . اعطانه الشرق الاوسط واروبة الجنوبية وبعض الغريبة . يستوطن السواحل اللبنانية في الشتاء ويجوب الوسط والجرود في الربيع والصيف .

جسمه صغير القد ، منسوب القوام ، طوله نحو ١٥ سم . وبسطه نحو ١٧ سم . ثوبه الى الطحلة الرمادية . رأسه موشم بالاسود وهو صغير القد يقصر المنقار بعض الشيء . رداؤه اسفع الموج . اطار قوادمه موشح بالابيض . زوره وصدرة وايطلاه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمراء . بطنه اغبر اللون عادم الرقشة . حدقة عينه ومنقاره وقائمته الى السواد . ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر الا باعدام التوشيح الابيض في القوادم وبقلة زهاء الالوان . اما اليافع فيكون قبل الانحسار الثاني كثير الرقشة والتنميش .

يسرح في النهار . يألف الاحراج والحدائق والبساتين ويتدرد باستمرار على المواقع التي يكثر فيها الطيون لالتهام ما يحوم بقربها او يلمصق بها من ذباب وهوام .

وهو سريع الحركة والانتقال ، دائب في العمل والقنص لا يقعد عن السعي طوال النهار . قوته الحشرات المختلفة واخصها الذباب والبعوض والهوام واليعاسيب والفراس . وعندما تكون فريسته كبيرة القد يضرب بها فند الشجرة ليحطمها ثم يتلعتها جزءاً جزءاً .

يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يدتن عشه في اي موضع كان في تجاوير الاشجار وفي اوقاب الصخور وبين افناد الشجيرات الداسية وفي اباط اغصان المغث وبين قضبان الصمصاف . عشه مزيج من الالياف والحشائش الناعمة لكنه غليظ الحبك يطنه بالزغب والصوف والسيب . زمن الترخيم يراوح من اواسط ايار الى اواسط حزيران والانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الزرقة الخضراء الموج تعلوها رقشة صناعية وبقجة حمراء تتمركز عند العقب . مدة الحضانة لا تتجاوز ١٤ يوماً . والصغار تكتسي وتطير بعد التفقيس بثلاثة اسابيع ولكنها لا تهجر العش الا بعد ستة اسابيع .

يعتبر من العصفير الكثيرة النفع الواجب حمايتها .

عصفور غريد يحسن التوقيع من فصيلة الكعيتيات ورتبة الجواثم سنيات المناقير . اعطانه الاصقاع اللبنانية والبلاد المجاورة غير انه يتحاشى الجرود العالية .


جسمه رشيق القوام ، حسن الهندام . طوله لا يقل عن ٢٠ سم . وبسطه نحو ٢٢ سم . ثوبه الى السمرة يعلوها موج اسود اسفع . رأسه وزوره وصدرة سود . رداؤه وظهره الى السمرة الكستنية الداكنة . رأسه مستطيل الريش . عيناه الى السواد الجوي الموج . منقاده اسود اللون ، مستعرض القاعدة ، ذلق الطرف ، اقصر طولاً من الرأس . رسغاه واصابعه الى السمرة القاتمة الداكنة . مخالبه محججة سوداء اللون .

يسرح في النهار . يألف الاحراج والغابات والحدائق والبساتين . وهو يقظ جريء ، جم النشاط ، لا يكف عن الحركة طوال النهار ولا ينقطع عن الشدو والتغريد الا نادراً . ينتقل بين افنان الاشجار وافنادها كما ينط ويقفز على الارض بسرعة ورشاقة .

قوته الحشرات الصغيرة واخصها الفراش والديدان ثم الثمار العنبية والسكريّة المختلفة وبعض البزور البرية والنوامي النباتية .

يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يدتن عشه في الاشجار الفناء الظليلة المتوسطة الارتفاع . عشه قدحي الشكل ، جيد الحبك يطنه الانثى بمختلف الالياف الناعمة والصوف والزغب . زمن الترخيم يراوح من اواسط نيسان الى اواسط ايار . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى البياض الاغبر تعلوه رقشة متضاربة الالوان فيها الاطحل والاحمر الداكن والوردي . الحضانة يستمر نحو ١٤ يوماً والصغار تهجر العش بعد التفقيس باربعة اسابيع .

يعتبر من العصفير المتوسطة النفع لان المنافع التي يسديها بالتهام الحشرات تفوق بقيمتها الاضرار التي يلحقها بالثمار السكريّة .



بُوقِيَّةُ سُلْطَانِيَّةٌ ،
بُقُوقَةُ سُلْطَانِيَّةٌ

N.S. Limosa limosa.
Fr. Barge commune, Barge à queue noire, Barge égocéphale.
Eng. Black-tailed Godwit.

الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب . اما اليافع فقريب الشبه بالبالغ في ثوبه الشتوي الا ان شقحة حمراء تسود اطراف ريش الصفحة العليا . وعلى المنكبين مجموعة من الخطوط السود والصنائية .

يعيش ، في تجواله ، بالقرب من الماء ويخوض فيه حتى الصدر . ويألف في الباده جميع المواقع الرطبة وخصّها المراعي الطبيعية والمستنقعات .

قوته الديدان والحشرات الكبيرة ويرقاتها والقشريات والرخويات والبلاغيط والدعبل . يدنّ عشّه في افحوص يحتفره في المواقع التي تطفو سطح المناقع او في بعض الرياض الرطبة ويبطنه بالاعشاب اليابسة والحشائش الناعمة . الانثى تضع نحو ٤ بيضات لونها الى الخضار الزيتوني الباهت تعلوه رقشة خفيفة سمراء . الحضان يستمرّ نحو ٢٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر الذي يتعهد ايضاً ، فيما بعد ، العناية بالقراخ حتى زمن استقلالها .

طائر من البوقيات ينتمي الى فصيلة دجاجيات الارض ورتبة طوال الساق . موطنه يشمل معظم البلاد الاسيوية والاروية والافريقية يجوبها عادة بحذاء الشواطىء البحرية عند قطاعه ورجاعه . يعرّج على لبنان في طريق عودته الى حوض البحر الاحمر والهند . اقامته في الربوع اللبنانية لا تتجاوز ثمانية ايام .

جسمه متوسط القدّ يطول من ٤٠ الى ٤٢ سم . وبسطه تراوح من ٥٢ الى ٥٥ سم . يتميز بمنقاده المخدّد المستطيل الذي يبلغ طوله ثلاثة اضعاف طول الرأس . جناحه ذلق لاحف ، اطول قوادمه الاولى . ذنبه مخروطي الشكل . ساقه دقيقة ، رفيعة ، رباعية الاصابع العادمة الحظاب . مخالبه صغيرة مستغلظة .


ثوبه متراكب الالوان التي تختلف بين حلتي الصيف والشتاء . في الشتاء ، ثوبه العلوي من الرداء الى الظهر والعجز يكتسي بالبني الداكن تتخلله رقشة عابقة تعود الى واسط نصال الريش واخرى باهتة تعود الى الحواشي والاطراف . رأسه ، من الجبهة الى القفن والعنق ، شديد الشقحة السفعاء تخالطها نمشة خيطية مستدقة سوداء . محسراه الى الشقحة الباهتة . عيناه صغيرتان مكحلتان بالبني العابق الذي يمتد من الشدق الى طرف المحسر . وبعلو حاجب العين بقعة بيضاء مستطيلة . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده احمر القاعدة والقسم الاول ، اسمر القسم الثاني الذي ينتهي بالاسود . رسغه حجفي الصفحة الامامية ، سردي الخلفية وهما مع اصابعه الى السمرة الرصاصية . لواحف جناحه الى الريدة المتماوجة . اباهره الى السمرة السوداء يتخللها تجذيع ابيض . ذنبه اسمر اللون العابق يطوّقه حنار ابيض . زوره وعنقه الى الشقحة الزاهية السوية . صدره وايطلاه الى الشقحة الحنطية المعصبة بالاسود . بطنه ابيض اللون وافنيكه كذلك .

وفي الصيف رأسه وعنقه واعلى صدره الى الشقحة العابقة الحمراء الموج يعلوها في الرأس تعصيب اسود . رداؤه وظهره وعجزه الى البني الداكن يتخلله توشيم اسود ورقشة صنائية . الوان جناحيه وصدره وبطنه وافنيكه لا تختلف عن الوان الثوب الشتوي .

N.S. Asio flammeus,
Otus brachyotus.

Fr. Hibou brachyote,
Hibou à huppes courtes.

Eng. Short-eared Owl.



بُومَة صَمْعَاء

نوع من البوم ينتمي الى عمارة البوهيات. يعتبر من القواطع التي تجوب معظم اصقاع بلاد العالم القديم. تقيم في لبنان عند عبورها في رحلتها الربيع والخريف نحو ١٢ او ١٥ يوماً. جسمها متوسط القد. طولها نحو ٣٥ سم. وبسطتها نحو ٧٢ سم. رأسها مثدون القنارح ولذا سميت بالصمعاء.

ثوبها متراكب الالوان رأسها وريائها وظهرها وسقطاها وعجزها وذنبها الى الصفرة الذهبية تعلوها رقشة وخطوط بنية داكنة. نقابها ابيض اللون، اسود القرص الداخلي الذي يطوق العين. عيناها الى الصفرة المذهبة الموج. منسرها صغير القد، اسمر اللون، احجن ومدبب. منسحقها وسبع الفجوة. سقطها مستطيل القد يجاري الذنب ويتجاوزه. ذنبها معتدل القصير، مجدع بخطوط معترضة سمراء اللون. زورها صنائي باهت. عنقها الى الصفرة الصنائية يعلوها توشيم اسمر عابق. صدرها وبطنها وخوابيها الى الصفرة الباهتة يعلوها وشم اسمر داكن. رسغاها قصيرتان. اصابعها كاسية. مخالبيها مدببة حادة سوداء اللون.

الذكر اميز قدماً من الانثى الا انها تتحلى بذات الثوب. تألف المناقع والمقاصب والخيس. تلتمس قوتها في الليل من الغسق الى الفجر. تصيد العرذ والفأر والعكابر والضفادع والدويبات المختلفة والحشرات. تعتبر من الطيور الروامس الجزيلة النفع.

N.S. Asio otus, Otus vulgaris.

Fr. Hibou commun,
Hibou vulgaire, Moyen-duc.

Eng. Long-eared Owl.



بُومَة أُذْنَاء

طائر من الكواسر الروامس ينتمي الى فصيلة البوميّات. موطنها فسيح الارحاء يشمل معظم اقطار العالم باستثناء استراليا. وهي من اوابد الاحراج اللبانية.

جسمها ربع القامة، متوسط القد، طوله نحو ٣٥ سم. وبسطته نحو ٦٠ سم. ثوب رداؤها وصفحتها العليا الى الصهبة الصفراء الموج تعلوها رقشة سمراء ونمشة حنطية داكنة وتشيز اسود يطوقه حنار ابيض. صدرها وبطنها الى الصهبة الصفراء الفاتحة تعلوها رقشة حنطية سمراء معترضة ومستطيلة. جبهتها وذقنها الى البياض العاجي. نقابها الى الصفرة الصنائية الطحلاء الموج. حدقة عينها الى الصفار البرتقالي اللامع. منسرها ومخالبيها الى السمرة السوداء. اغزناها فارقتان، كبيرتا القد، يخالهما الناظر اذنين، ولذا دعيت بالبومة الاذناء. ساقاها مسرولتان. اصابعها كاسية، ريشها خيطي الشكل يشبه الشعر.

نظامها الحياتي جماعي. سربها في الزمن العادي يراوح من ٦ الى ١٠ انفار يتبدد في زمن السفاد والترخيم والعناية بالصغار، حيث يثابر كل ذكر على الفة اثناءه. وقد تدوم هذه الالفة العائلية نحو ٣ اشهر. من اواسط اذار الى اواسط حزيران، ثم تعاودها غريزة الالفة الجماعية فتتضم الى غيرها.

تألف الغابات والاحراج وتقترب من الاماكن الآهلة وتجوب ضواحي مساكنها وتتفقدتها دون ان تقيم فيها.

تسرح في الليل وتلتمس قوتها من الغروب الى الفجر. تصيد جميع انواع الحشرات والدويبات واخصها العرذ والفأر والعكابر والضفادع.

تدثن في وكن الغراب والزراغ والزرباب والسنجاب او في تجاويف الاشجار وصدوع الصخور. حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ رفنات لونها الى البياض العاجي. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. الفراخ تكتسي وتطير بعد التفقيس بخمسة اسابيع ولكنها لا تهجر العش وابويها وتنضم الى سربها قبل بلوغها سبعة اسابيع. تعتبر من الكواسر الروامس الجزيلة النفع الواجب حمايتها.



بوهة

N.S. Bubo maximus, Bubo bubo.
Fr. Grand-Duc.
Eng. Eagle-Owl, Great-horned Owl.

طائر من كواسر الليل وهي نوع من البوه تنتمي الى فصيلة البوميّات . موطنها يشمل معظم البلاد المعتدلة الحرارة باستثناء استرالية . اعطانها اللبناية تشمل بعض احراج الوسط ومعظم احراج وغابات الجرود .


جسمها كبير القدّ ، طولها نحو ٦٥ سم . وبسظتها نحو ٨٢ سم . ثوبها يختلف باختلاف الشقّ . وهو عند الذكر الى الصهبة الصفراء تعلوها مشحة طحلاء ومواج أسمر . رداؤه العلويّ اعيق لوناً واشدّ لمة من السفلي الذي يتميز بسيادة الاصفر يعلوه تجذيع معترض دقيق الخطوط ، صنائيّ اللون ، ورقشة حنطيّة عابقة السمرة تخفّ ويضيق جرمها مع ابتعادها عن الصدر باتجاه البطن والافنيك . اغرته فارشة افقيّة الارتكاز ، ريشها اسود الوسط ، اصهب الحنار والاطراف . نقابه الى الصهبة الغبراء يحوقه طوق داكن . عيناه كبيرتان ، مستديرتان . حدقة عينه برتقاليّة اللون ياقوتيّة الماجسة . زوره ابيض . منسره احجن البهرة الحادّة ، اطحل اللون تعلوه مشحة فحميّة . زوره ابيض . ساقاه مسرولتان ، لونهما الى الصهبة المنمشة بالاسود . اصابعه كاسية . مخالفه سود .

الانثى اكبر قدماً من الذكر وافتح ثوباً منه واقلّ رقشة واصغر اغرة واكثر زقاءً .

نظامها الحياتيّ فرديّ لا جماعيّ . يختار الذكر انثاه عند حلول زمن التسافد في غضون شهر آذار فيلازمها ويعاونها ويتعهد معها رعاية الفراخ الى ان تستغني هذه عن عناية ابويها ويكون ذلك في خلال شهر آب . عند ذلك تهجر الفراخ بعضها والذكر انثاه حتى اوائل اذار . تألف الغابات والاحراج والاطلال ولا تقرب الاماكن الآهله الآ عند الحاجة الماسّة وضيق الرزق .

تسرح في الليل وتلتمس قوتها من الغروب الى الفجر في فصلي الربيع والصيف . امّا في فصلي الخريف والشتاء فانها تسرح من العصر الى فحمة الليل ومن الفجر العميق الى شروق الشمس . تصيد جميع انواع الحشرات والدويبات والقواضم والزواحف من الجندب الى

العقرب والرتبلاء والفأرة والجرذ والعكبر والخلد والسنجاب الى العظاية والموزغة والشعبان والافعى . وتبتطش بالبط والاوز والدجاج والغربان والزيبان والعصافير والارانب والقواع ... تدنّ عشها في تجاويف وصدوع الاشجار الصوجانة او في اوقاب الصخور . عشها كناية عن بعض الاوراق اليابسة يحوقها اطار من القضبان هذا اذا كان في اوقاب الصخور امّا اذا كان في تجويف شجرة فلا داع للاطار . الانثى تضع من رفتين الى ثلاث رفنات كرويّة الشكل ، خشنة الخشل ، غبراء اللون تحضنها وحدها نحو ٥ اسابيع بينما الذكر يؤمّن لها الغذاء . تعتبر من كواسر الليل المتوسّطة النفع .



N.S. Turtur turtur.
Fr. Tourterelle commune.
Eng. Turtle-Dove.


تُرْعَلَّة شَائِعَة ، أُطْرُعَلَّة شَائِعَة

طائر من الترغل وفصيلة الحماميات . يدعى في مصر «قمري اروبي» . موطنه يمتد من الهند الى الشرق الاوسط واروية وافريقية الشمالية حتى خط الاستواء . وهو آبد في بعض هذه البلاد وقاطع في البعض الآخر . يقيم في لبنان من الربيع الى الخريف ويقال انه من الاوابد . جسمه متوسط القد ، طوله نحو ٢٨ سم . ووسطه نحو ٤٠ سم . ثوبه متراكب الالوان الموشمة والمنمقة . رأسه حتى القفص واعلى العنق الى الريدة الزرقاء يخالطها الصنابي . علاطا عنقه مجدعان بالابيض والاسود . رداؤه الى البني الاصفر المواج . ظهره وعجزه الى الريدة الصهباء يعلوها مواج ازرق . جناحه ذلق مستطيل . كلاه واباهره سود السيقان ، صهب الحواشي . قوادمه الى البني الداكن . ذنبه مستطيل القد اكهب اللون يطوقه حنار اسود ضيق الخط ثم حافة بيضاء لا قياسية العرض . زوره وصدرة وابطلاه الى الحمرة الخمرية . بطنه وافنيكه الى البياض الاغبر . طوق عينه عادم الريش ، احمر اللون . حدقة عينه الى الحمرة الصفراء المواج . منقاده جالس الشكل ، دقيق الجرم ، اسود اللون . ساقه عرياطة . رسغه واصابعه الى الجؤرة . مخالفه الى الريدة السمراء .

الانثى اصغر قدًا من الذكر وتتحلّى بذات الثوب الآ انه ادكن ماجة واقفل زهأء . وقلادة عنقها في علاطيتها اصغر حجماً . اما اليافع فادكن ثوباً من البالغ ورأسه وعنقه وظهره الى البني العابق ، واطراف جناحه الى الحنطي الاصفر .

يألف الهضاب والاحراج المبعثرة الاشجار واخصها القريبة من الحقول الزراعية والزرور . يعيش ذكراً وانثى لا يفرقهما سوى الموت . طيرانه خفيف ، يسير وسريع . ينتقل على الارض بخفة ولباقة تفوق اناقة الحمامة . قوته بزور وجيوب النجيليات والقرنيات البرية والحنطة . يدنن عشه في الاشجار والشجيرات الظليلة . الانثى تبيض وتحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام ولا تحضن في كل مرة اكثر من بيضتين لونها الى البياض العاجي . الحضن يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

يعتبر من الطيور القليلة النفع والاذى ومن الطرائد المرغوب فيها .



N.S. Sitta syriaca.
Fr. Sittelle syriaque. Eng. Syriac Sitta.

تُس سِرْيَانِي ،
كأسير الجوز السِرْيَانِي

طائر من التيس الجواثم ، المتسلقات ، الرقيقات المناقير . يدعى كاسر الجوز وهو لا يكسر الجوز بتاتاً ولكنه يلتقط الحشرات والديدان التي تنخر قشور ثمار الجوز . موطنه الشرق الادنى . اعطانه اللبناية تمتد من الوسط الى الجرود والبقاع .

جسمه ربع القامة ، مستضخم الشكل ، يطول نحو ١٦ سم . وتبلغ بسطته نحو ١٨ سم . رأسه ورداؤه وظهره وعجزه وذنبه الى الريدة الزرقاء المواج . ويمتد من كل منشق من منشقيه خط اسود يعبر العين ويستهي عند الظهر . جناحه الى السمرة الحنطية وهما معتدلا القد . اطول قوادمها الثلاث الاولى . اباهره بيض الاطراف . محسراه وزوره وصدرة والقسم الاكبر من بطنه الى البياض الناصع . ابطلاه والقسم الاخير من بطنه وافنيكه الى الصهبة الخفيفة . ذنبه قصير القد ، مقطوم الطرف . عيناه مطوقتان باطار حنطي . حدقة عينه كستية اللون . منقاده مخروطي الشكل ، قوي البنية ، مستدق الطرف الرقيق . رسغاه واصابعه الى السمرة الحنطية . مخالفه صغيرة غليظة سمراء اللون .


الانثى اصغر قدًا من الذكر وتتحلّى بذات الثوب ولكنه ابهت ماجة واخف لمعة .

يألف الهضاب والمناطق الجبلية الكثيرة الصخور . يسرح من الشروق الى الغروب . يتسلق الصخور وجذوع الاشجار صعوداً ونزولاً بنفس الرشاقة وبذات الطريقة . طيرانه قصير الشوط متتابع التموجات والتعاريج . يتميز بالحذر والوجل وبسرعة الهرب والاختفاء .

يدنن عشه في تجاويرف الاشجار وفي اوقاب الصخور وهو يشيده بالقش والطين اللزب على غرار ما يفعل الخطاف . ويبطنه بالقش الناعم والرغب .


الانثى تحضن خلال شهر ايار ، مرة واحدة في العام ، من ٦ الى ٩ بيضات . بيضها عاجي اللون يعلوه تنقيط احمر واسود واكهب يكثر تجميعه عند العقب . الترخيم يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها القوت والطمانينة ثم العناية بالصغار . قوته الحشرات والاساربع والديدان وبزور النباتات البرية والزراعية .

يعتبر من الطيور النافعة القليلة الاذى .



N.S. Rallus aquaticus.
Fr. Râle d'eau.
Eng. Brook Ouzel.

تفلق الماء



N.S. Turtur risorius.
Fr. Tourterelle à collier,
Streptopélie rieuse.
Eng. Barbary Dove.

تُرغلة مُطوّقة،
أطرُغلة مُطوّقة

طائر من التفلق ينتمي الى فصيلة التفلقيات ورتبة طوال الساق. يدعى في مصر «مرعة الماء وعصفور كلب البحر». موطنه يمتد من اقاصي آسية الغربية الى الشرق الادنى واروبة وافريقية الشمالية والشمالية الغربية، يجوب اصقاعها في طلب الرزق والمصيف والمشتى. وهو من الضوارب التي تمكث في لبنان بعض الوقت.

جسمه متوسط القد، طوله نحو ٢٧ سم. وبسطته نحو ٢٦ سم. ثوبه العلوي الى الشقحة الزرنية المشيطة بالاسود. جانبا رأسه وعنقه وكامل زوره وصدرة الى الرعدة الزرقاء المواج. ابطاه الى البياض المجذع بالاسود. بطنه وافنيكه الى الشقحة الصنابية. حدقة عينه الى الحمرة البرتقالية. منقاده جالس الشكل، مستطيل القد، لونه الى الحمرة يعقب عند القاعدة ويهت عند الطرف. جناحه مستعرض السقط، رجب الانفراج، اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبه مخروطي الشكل، صغير القد، مرتفع الارتكاز خاصة عند الذكر. ساقه نحيلة. رسغه واصابعه معتدلة الطول لونها الى الجؤوة الباهتة.

ثوبه الخريفي يتميز بدكائة الالوان واختفاء المواج الازرق الذي كان يعلو رعدة الزور والصدر، وباستبدال الاسود بالاشفق الاكدر في تجذيع الايطلين.

الانثى اصغر قدًا من الذكر ولكنها تتحلى بذات الثوب.
يألف المستنقعات والرياض الرطبة والآجام المختلفة. قوته الحشرات على اختلاف انواعها والديدان والرخويات وبعض بزور النباتات المائية وحبوب النجيليات. يسرح من الفجر الى الشروق ومن الغروب الى فحمة الليل وفي الليالي القمرية والوضيئة. وهو كثير الحذر والوجل وعندما يشعر بخطر يندس ويختفي في اقرب دغلة اليه او بين النباتات المائية او يغوص في الماء كما تفعل الشكبة وهو يجيد السباحة والغوص. طيرانه، في مضاربه، سفيف قصير الشوط. اما عدوه على الارض فأخرق أرقل.

يدئن عشه بين القصب والغزار والاعشاب المستطيلة الكثيفة التجميع. عشه قدحي الشكل، معتدل الاتساع والعمق. يحوكه بالحشائش الدقيقة ويبطنه بعصف بعض النجيليات

طائر من الترغل وفصيلة الحماميات. يدعى في مصر «قمرى صيفي باهت». موطنه يمتد من الشرق الاقصى الى الادنى وافريقية الشرقية والشرقية الشمالية. يجوب معظم مناطقها طلبًا للمصيف والمشتى. وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان من اواسط نيسان الى اواخر ايار ومن اواسط ايلول الى اواخر تشرين الاول.

جسمه ربع القامة، طوله نحو ٢٦ سم. وبسطته نحو ٣٨ سم. ثوبه متداخل الالوان يغلب فيه الاغبس. رأسه حنطي اللون، اصهب المواج. جناحاه الى السمرة السوداء. زوره وصدرة الى الحمرة الخمرية الصفراء المواج. بطنه الى البياض الاغبر. عنقه مطوق بقلادة هلالية الشكل، مجدعة ومنمّشة بالاسود والابيض، تنتهي عند القن. حدقة عينه ياقوتية زاهية. منقاده جالس الشكل، حنطي اللون، تعلوه مشحة سمراء قاتمة. ساقه عرياطة رسغاه واصابعه الى الجؤوة الباهتة. مخالبه قصيرة محبّنة طحلاء اللون.

الانثى اصغر قدًا من الذكر ولكنها تتحلى بذات الثوب وكذلك اليافع.
يألف البراري والاحراج المبعثرة الاشجار. سربه لاقياسي العدد الذي يراوح من اربعة ازواج الى عشرين زوجًا. يعيش ذكراً وانثى لا يفرقهما سوى الموت. اخلاقه اخلاق الترغلة الشائعة وطيرانه وانتقاله على الارض كذلك. الفارق بين الاثنين هو الهديل لان هديل المطوقة يشبه القهقهة.

قوته المواد النباتية المختلفة وخصّها بزور النجيليات وحبوبها.
يدئن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع عن سطح الارض. الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنتها تتألف من بيضتين ترخمهما بناوية الذكر نحو ١٥ يوماً. والترغلة المطوقة كالترغلة الشائعة تألف حياة الاسر وتكاثر في المداجن الخاصة وتهجينها مع الحمام واليمام يعطي انغالا عاقرة لا تتكاثر مع اصولها وفروعها.
يعتبر من الطيور القليلة النفع والاذى ومن الطرائد المرغوب فيها.



N.S. *Cannabina linota*,
Carduelis cannabina.

Fr. *Linotte vulgaire*, *Linotte mélodieuse*.

Eng. *Common Linnet*, *Common Redpoll*.

تُفَيِّحِي مَبْدُول

نوع من التفيفيحي وهو عصفور غريد، جميل الالوان المتداخلة، من فصيلة الشرشوريات. موطنه بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. اعطانه اللبانية تمتد من الساحل الى الجرد والبقاع.

جسمه صغير القد قريب الشبه بالدوري والحسون. طوله نحو ١٤ سم. وبسطه نحو ١٧ سم. منقاده اسمر اللون، مخروطي الشكل، مدب الطرف الرقيق. عيناه صغيرتان كستيتان. جناحه ذلق مستطيل. ذنبه مقعر فارق. رسغاه الى السمرة الحنطية الموج.

ثوبه يختلف باختلاف الشق والعمر وفصول السنة. فالذكر البالغ يكون في فصل الربيع احمر الجبهة ومقدم الرأس، اريد القفن والمحسر والعتق، كستني الرداء ولحاف الجناح. قوادمه ومناكبه واباهره سمر النصال، بيض الحواشي. زوره ومقدم صدره وافنيكه الى الشبهة الغبراء المرقوشة بالاسود. صدره الى الحمرة الارجوانية. بطنه الى البياض العاجي. وهو في فصل الخريف يستبدل الاحمر والارجواني بالاصهب والاشهب.

الثوب الربيعي، عند الانثى، لا حمرة فيه وهو الى الصهبة الموشمة والمنمشة بالاسمر تعلوها ماجة بنية خفيفة تلحف العنق والرداء والظهر والعجز حتى الزمكاء. اما الثوب الخريفي فلا فارق بينه وبين كساء الذكر.

يألف الهضاب والتهام والاحراج المبعثرة الاشجار والحدائق والجنائن وحواشي الاراضي المزدرعة. يجوب البلاد في طلب المصيف والمشتى لانه يخشى انقطاع الرزق في الجرد اكثر مما يخشى البرد.

وهو كثير المرح، رشيق الحركة، سريع الانتقال، شديد الحذر، يعيش في القفص ويتميز باقتداء شذو غيره ويستألف النغر والكنار وتصالبه معها ينتج هجنا نشيطة تفوق بتغريدها شذو امها وايها.

يسرح من الشروق الى الغروب وقد يخف انتقاله قرب الظهر في الايام الحارة الكثيرة الاشماس. قوته البزور البرية المختلفة واخصها الكتان والخس والنفل وبعض الهوام والحشرات.

البرية. الانثى تضع من ٦ الى ١٢ بيضة مستطيلة الشكل لونها الى البياض الاغبر تعلوه مشحة صفراء او خضراء ورقشة جزوية او بنفسجية الموج يكتف تجميعها عند العقب. الحضان يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. اما الفراخ وهي تنقف كاسية فانها تسرح وتسيح بعد نقفها بنحو ٤٨ ساعة. يعتبر من الطيور النافعة ولكنه من الطرائد المرغوب فيها.



N.S. *Carpodacus erythrinus*,
Erythrina erythrina.

Fr. Roselin cramoisii. Eng. Scarlet Grosbeak.

تنجى قَرْمِزِيّ


طائر من التنجى ينتمي الى فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير. يدعى في مصر «عصفور وردى» موطنه يمتد من الهند الى الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية. يعتبر من الضواري التي تألف الاحراج اللبنانية والآجام ومجاري الماء منذ اوائل الربيع حتى اواخر الصيف ثم ترحل باتجاه الجنوب وحوض البحر الاحمر. جسمه صغير القد. طوله نحو ١٤ سم. وبسطه نحو ٢٠ سم. ثوبه الى الحمرة القرمزية السفعاء الموج، يعبق في الرأس والرداء والظهر والزور والصدر وتعلوه ماجات وتمشيجات مختلفة في الجناح والذنب تراوح من الكلسة الى الشبهة. جناحه متوسط الانفراج، ذلق الطرف. اطول قوادمه الثانية والثالثة والرابعة اما الاولى والخامسة فمتساويتان. ذنبه معتدل الطول، فارق الطرف. محسراه الى الجؤوة. بطنه الى الحمرة الصنابية تخف باقترابها من الافنيك الابيض. عيناه صغيرتان مكحلتان. حدقة عينه عسليّة اللون. منقاده مخروطي الشكل، ضليع التكوين، اسمر اللون. رسغاه واصابعه الى السمرة. مخالفه صغيرة محجّنة سمراء اللون.

الانثى اصغر قدًا من الذكر وابهت ثوبًا منه.

يألف الآجام ومجاري الماء والحدائق والجنائن والاحراج. سره لا يتجاوز عشرة ازواج. يسرح من الشروق الى الغروب ضمن حماه ويبست الليل في مجاثم مشتركة لا يهجرها الا عند الرحيل.

قوته البزور البرية المختلفة وبعض الحشرات الصغيرة القد والاساربع والديدان. يدتن عشه في الاشجار الظليلة واخصها الصفصاف والمغث. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات مرة واحدة في العام. بيضها صغير القد سمانجوني اللون يعلوه توشيح اخضر ورقشة سمراء تكثر عند العقب. الحضن يستمر نحو ١٢ يومًا تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الحماية والغذاء. يألف القفص ويقتبس التأديب ويردد الالحان بدون عناء. يعتبر من الطيور النافعة التي تجدر المحافظة عليها.

يدتن عشه في الادغال والاشجار المثلثة الداسية. الانثى تحضن من ٤ الى ٦ بيضات اهليلجية الشكل سمانجونية اللون مرقوشة بالاحمر والاسمر. الحضن يستمر نحو ١٣ يومًا تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية. يعتبر من العصافير المتوسطة النفع لانه لا يعف عن البزور الزراعية عندما تسنح له الفرصة.



N.S. Perdix rubra, Alectoris rufa.
Fr. Perdrix rouge. Eng. Red-legged Partridge.

حَجَل أَحْمَر

طائر من الحجل وفصيلة الطيهوجيات. موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية. اعطانه اللبنانية تمتد من الوسط الى الجرد.

جسمه معتدل القد ربع القامة، طوله يراوح من ٢٨ الى ٣٠ سم. وبسطه من ٣٠ الى ٣٢ سم. ثوبه الى الجؤوة الربداء يعلوها موج اصفر وتأزير جانبي. عنقه وزوره الى البياض تطوقهما قلادة من الدر الاسود تنتهي عند طرف المحسر الابيض حيث تلتقي بكحلة العين التي تمتد حتى المنقاد. رداؤه وظهريه وعجزه ومنكبا وكلاه واباهره الى الشفحة الغبراء السوية. سقطه مستعرض الشكل يلحف اواسط الذنب. ذنبه صغير القمد مخروطي الشكل، مستعرض الافنك، ضيق الطرف. صدره وبطنه الى الصفار الحنطي البرتقالي الموج. ابطاه الى الريدة الزرقاء يعلوها توشيم زردى الشكل احمر اللون، حنطي الاطار. جانب صدره الى الريدة الزرقاء الرصاصية يعلوها زرد مقوس الشكل، احمر اللون، ابيض الحنط الداخلي، اسود الخارجي. حاجب العين وجفناها الى الحمرة الارجوانية. حدقة عينه الى السواد اللامع. منقاده ورسغاه واصابعه الى الجؤوة الصهباء. مخالبه حادة الاطراف سوداء اللون.


الانثى اصغر قدماً من الذكر واخف لمعة في الثوب واضيق تسنجاً في جانبي الصدر وفي الابطلين.

وهذا النوع من الحجل يتعرض للاحساب اي الى زوال شقاح الالوان المختلفة والبقاء على الابيض دون سواه. غير ان هذا العارض لا ينتقل بالوراثة.

يألف الحياة الجماعية ويعيش رفوقاً صغيرة لا قياسية العدد الذي يراوح من خمسة او ستة ازواج الى عشرين زوجاً.

مراته المفضلة التي يأوى اليها غالباً هي الهضاب والنهام والادوية والاعقة والبراري الكثيرة الامات والصخور وادغال السنديان الازعب والخلنج.

وهو حاد البصر، مرهف السمع، شديد اليقظة والاحتراس يتميز بالنزاقة والحزم والنشاط. يعدو بسرعة لا مثيل لها بين الصخور والاعشاب. طيرانه معتدل السرعة والخفة، متوسط



N.S. Agrodroma campestris,
Anthus campestris.
Fr. Agrodrome champêtre,
Pipit rousseline, Rousseline.
Eng. Tawny Pipit.

جُشَنَةُ الحَجَل، طُرْسُوم

طائر من الجشنة وفصيلة الذعريات. يدعى في مصر «ابو فضية الحصراء». اعطانه حقول سهول وفيافي العالم القديم يجوبها طلباً للرزق والمصيف والمشتى. يقيم في لبنان من ١٥ الى ٢٥ يوماً عند عبوره في رحلة الخريف ونحو ثمانية ايام عند عبوره في رحلة الربيع.

جسمه صغير القد، رشيق القوام. طوله نحو ١٨ سم. وبسطه نحو ٢٤ سم. ثوبه متراكب الالوان. رأسه ورفاهه وظهريه الى السمرة الزيتية المنمشة بالقرقي. جناحه عشاري القوادم، الاولى منها ضامرة واطولها الثالثة. جناحه مستطيلان، مديبان، رتاجياً الريش الاسمر العابق. كلاه مطوقة بالابيض. عنقه وصدره الى البياض الاغبر الموشم بالاسمر. بطنه الى الصهبة الرملية الموج. ذنبه مستطيل القد، مقعر الطرف يتألف من اثني عشرة رفة حواشيا الوحشية واطرافها الانسية الى البياض الاغبر. عيناه كبيرتان، مستديرتان، مكحلتان بالاسود. حدقة عينه بيضاء. منقاره مخرزي الشكل، حنطي اللون، اسمر الموج. رسغاه واصابعه الى السمرة الحنطية العابقة. الشقان لا يختلفان قدماً وثوباً والياغ يتحلّى بثوب البالغ.

يألف الحقول المزروعة والبور والسهول على السواء. طيرانه سفيف وحم وهو قريب الشبه بطيران القبر. شوطه قصير المدى متتابع التعاريج. يحلق ويحوم فوق موقع هبوطه ثم يندفع نحو المكان المعين مطبق الجناحين. يعدو على الارض بخفة ورشاقة ولا يشاهد على الاشجار الا نادراً. يقظته وحذره يجعلانه جم الوجل.

قوته الحشرات والديدان على اختلاف اجناسهما. يلتقط فريسته الممتحة على الارض وقلماً يتبعها في الجؤ.

يدثر عشه في افحوص يحفره بين الدغل والاعشاب الكثيفة. يحكه بالقش والالياف والحشيش الناعم ويبطنه بالصفوف والسيب والرغب. الانثى تبيض، عادة، مرتين في الحول وتضع في كل مرة من ٤ الى ٥ بيضات. لونها الى البياض الاغبر تعلوه رقة حنطية يتخللها توشيم بنفسجي. الحضن يستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء ويتعهد العناية بها وبالصغار فيما بعد.



N.S. Perdix graeca,
Alectoris graeca saxatilis.
Fr. Perdrix grecque, Bartavelle.
Eng. Greater Red-legs.

حَجَل رُومِيّ،
شُنَّار، يَعْقُوب

طائر من الحجل وفصيلة الطيهوجيات. اعطانه تمتد من ايران الى سورية ولبنان وتركيا واليونان وايطالبا وصقلية وبعض المناطق الفرنسية واسبانية وافريقية الشمالية. جسمه ربع القامة كبير القد. طوله يراوح من ٣٢ الى ٣٥ سم. وبسطته من ٣٤ الى ٣٨ سم. ثوبه العلوي الى الرعدة الرصاصية يعلوها موج ازرق في الرأس والعجز ومواج احمر في الرداء والظهر. محسراه وعنقه ومقدم صدره الاعلى الى البياض المطوق بالاسود. ذنبه صغير القد، ارمده الصفحة العليا، اشقق السفلى. صدره وبطنه الى الكهبة يعلوها موج اشقق يصفر عند البطن. ابطلاه مجدعان بالاشقق والاصفر والاسود. عيناه مطوقتان بالاحمر. حدقة عينه خزنوية اللون. متفاده اسمر اللون. جوي الموج، شارف الافك الاعلى. رسغاه واصابعه الى الحمرة الفاتحة. مخالبه حادة الاطراف سوداء اللون. الانثى اصغر قدًا من الذكر واخف لمعة في الثوب واقل بياضًا في العنق واصغر تجديعًا في الايظلين.

وهو عرضة للاحساب كالحجل الاحمر. يعيش رفوقًا متفاوتة العدد الذي يراوح من ستة ازواج الى ١٢ زوجًا. ويقال ان الذكر لا يفتقر عن انثاه طوال الحياة وان عدد الذكور يفوق عدد الاناث وان الذكور عندما لا تتوفق باقتناء الاناث تعيش جماعات صغيرة رفقها يراوح من زوجين الى اربعة ازواج.

يألف الاماكن الرفيعة والاراضي المدحاة والهضاب الصخرية واكنافها ومنحدراتها واوديتها والاحراج الدغلة واخصها احراج السديان. وهو نشيط، نرقي، حذر وشجاع. يعدو بسرعة ورشاقة على الارض المنبسطة وبين الصخور والحجارة والاعشاب. طيرانه معتدل السرعة والخفة. شوطه متوسط القاب يسير غالبًا بموازة الارض وعند الهبوط يحط بسرعة ولا يحوم ولا يصف. وهو حاد البصر شديد اليقظة والحذر والاحتراس حسن الادراك يميز بين الصياد والراعي. صوته فقططة عالية مرتفعة النبرة المتتالية، مأنوسة الوقع يردها بعض المرات. صوت الانثى اضعف نبرة واقصر مدى.

الشوط، عادم التحليق والحوم، سريع الهبوط العمودي الخط. صوته فقططة عالية معتدلة النبرة والمدى، مأنوسة الوقع، يردها بعض المرات. صوت الانثى اضعف نبرة واقصر مدى. يدئن عشه في الارض بين الادغال والاعشاب الكثيفة. عشه افحوص تحتفده الانثى بموازة الذكر وتبطنه بالحشيش الناعم والصوف والسبيب. الانثى تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها نحو ١٨ يومًا بينما الذكر يؤمن لها الغذاء والحماية. بيضها صغير القد، اصهب اللون يعلوه كلف بني لا قياسي الحجم والتجميع. قوته نوامي الاعشاب والعصل وبعض اوراق النبات واخصها التفاف (السيزيك) وثمار العرعر وغيرها من الثمار العنبية واهداب الشربين وجوب التجليات والحشرات المختلفة واخصها الجنادب والقبايط والعناكب والنمل والمازن. يألف الاسر ويتكاثر في المداجن شرط ان يؤمن له المجال الحيوي اللازم والسكنية والتراب وبعض الظل.



N.S. *Milvus milvus*,
Milvus icinus.

Fr. Milan royal.

Eng. Red Kite, Gled.

جدأة حمرء ، جدأة شائعة ، آصي

طائر من الحداء وفصيلة الصقريات . موطنه معظم مناطق العالم القديم . يعتبر من اوابد الشرق الادنى ومن قواطع اروبة وافريقية . وهو قليل الوجود في لبنان لكنه من اوابده المشهورة . جسمه رشيق القوام ، كبير القد ، طوله نحو ٦٥ سم . وبسطه نحو ١٥٧ سم . ثوبه الى الريدة السفعاء يعلوها توشيم وتمشيق وحباك . رأسه وعنقه الى البياض الاغبر تعلوه نمشة سمراء . عينه كبيرة مطوقة بالاسود . حدقة عينه الى الصفار العابق الزاهي . منسره قصير القد ، قوي البنية ، اسمر اللون ، مسنن المخطم العلوي ، اصفر الزفد ، مدبب البهرة الذرية السوداء . سقطه كبير ، ذلق ، مستطيل . ذنبه مستطيل القد ، فارق الشكل ، لونه الى الشقحة العابقة الموج يعلوها تجذيع معترض اسمر . رسغه قصيرة كاسية في القسم الاعلى ، الذي لا يفوق الزام الواحد ، مرطاء في القسم الباقي وهي مع الاصابع حنطية اللون صفراء الموج . مخالفه ضعيفة متوسطة التحجين ، سوداء اللون .

الانثى اكبر قدماً من الذكر وقد يبلغ طولها ٧٥ سم .


يألف الاحراج والحياة الجماعية ولا ينفرد الذكر مع انثاه الا في زمن السفاد والحضانة والتربية . وهو شرس الاخلاق ، ثقل الحركة ، بطيء الطيران ولكنه يثابر عليه وقتاً طويلاً . يتميز بحدّة البصر وكثرة الحذر وقوة الذاكرة لانه يتعد عن الاماكن التي اصابه فيها ضرر سابق . قوته القواضم وصغير الطير والافاعي والضفادع والجراد والحشرات الكبيرة والديدان . يدتن وكنه في الاشجار الباسقة اخصها السنديان والملول والشوح . انثاه تبيض من رفتين الى ثلاث رفنات لونها الى البياض الاخضر الموج يعلوه تبقيح اسمر داكن . الحضن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

يعتبر من الكواسر القليلة الضرر لان ما يقتنصه من الطيور النافعة لا يوازي ربع ما يقضي عليه من الحيوانات والحشرات المؤذية الضارة .

يدتن عشه في الأرض ويخفيه بين الاعشاب او الادغال او في ظل الصخور الشارقة . عشه افحوص يحترفه الذكر بمعونة الانثى التي تبطنه بالحشيش الناعم والصوف والسبيب . الانثى تبيض من ١٢ الى ١٨ بيضة صغيرة القد عاجية اللون يعلوها موج اصفر وكلف اسمر لا قياسي الحجم والدكانة . الحضن يستمر نحو ١٨ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية . والانثى والذكر يعتنيان سوياً بتربية الصغار ورعايتها والعناية بها الى حين تمكّنها اجنحتها من الانتقال شوطاً بعيداً لا يقل عن ٢٠٠ متر . عند ذلك تنضم الاسرة بكامل افرادها الى السرب القديم الذي ابتعدت عنه منذ زمن التسافد والحضن .

قوته لا يختلف عن قوت الحجل الاحمر ولكنه يفضل الحشرات على النبات في اي وقت كان .

يألف الاسر ويتكاثر في المداجن كالحجل الاحمر .



N.S. *Anas crecca*,
Querquedula crecca.

Fr. *Sarcelle d'hiver*, *Sarcelle sarcelline*. Eng. *Teal*.

حَدَف شَتَوِيّ ،
شَرَشِير شَتَوِيّ



N.S. *Milvus niger*,
Milvus migrans.

Fr. *Milan noir*.

Eng. *Black Kite*.

حَدَاة سَوْدَاء

طائر من الحدف ينتمي الى فصيلة البطيات ورتبة كفيّات القدم صفيحيّات المناقير. يستوطن معظم مناطق اوروبية وبعض مناطق الشمال من البلاد الاسوية، ويقطع في الشتاء نحو الجنوب لكنه قلّمَا يعبر المناطق الاستوائية، ومنه اسراب تشتوي في بعض الاصقاع المصرية. يقيم في لبنان عند عبوره نحو القطر المصري من يوم الى يومين.

جسمه متوسط القد. طوله نحو ٣٢ سم. وبسطه نحو ٤٦ سم. رأسه وعنقه وزوره الى الصهبة الكستنية. يمتد من عينه الى فقهه جدّة خضراء يطوّقها حنار اصفر باهت. عيناه صغيرتان، مستديرتان. حدقة عينه بيّنة. منقاده كبير القد، مفلطح الشكل، اكهب اللون، تعلوه ماجة سبورية عابقة داكنة. رداؤه وظهره وعجزه الى الربرة الداكنة المشمّقة والمؤدّرة. لواحف الجناح بيّنة واطراف الكبرى منها كستنية باهتة. جناحه الى الربرة السمراء يعلوها توشيم اخضر وتمشيق اسود ورقشة بيضاء. وهو كبير القد. مدبّب الطرف. اطول قوادمه الاولى والثانية. وعلى اطراف خوافيه تقيح اخضر عابق اسفح الموج. لواحف ذنبه بيّنة اللون. صدره الى البياض تعلوه مشحة جؤوية خفيفة وتوشيم اسود. بطنه ابيض اللون تعلوه ماجة صفراء. ايتلاه الى البياض الاطحل يعقب مع اقترابه من الابط. افيكه اصفر زاهي يحوقه اطار ضيق اسود. ساقه ربداء اللون حجفية الصفحة الامامية. سرديّة الخلفية، اصابعه كاملة الحظاب. مخالبه صغيرة مستغلظة.

الانثى اصغر قدًا من الذكر وثوبها يختلف عن ثوبه وهو يتميّز باللون البيّني الداكن يخالطه البيّني الجؤوي الذي يكتنف اطراف الريش. قوادم الجناح الوحشية ولواحفه الخارجية الى الربرة الغبراء يعلوها تجذيع اخضر.

يألف المناقع والاهوار وضفاف الانهر والبحيرات، يجيد العدو والسباحة والطيران. قوته الاسماك الصغيرة والبلاغيط والديدان والرخويات والنباتات المائية والاعشاب البرية وبعض الحبوب.


طائر من الحداء وفصيلة الصقريات. موطنه الشرق الادنى والمناطق الاوروبية الدافئة وشمالى افريقية. يعتبر من الضواري التي تقيم في ربوع لبنان بعض الوقت.

جسمه اصغر قدًا من الحداء الحمراء واعقب ثوبًا منها وابهم توشيمًا وتمشيقًا. طوله نحو ٥٥ سم. وبسطه نحو ١٣٠ سم. رأسه الى الربرة الباهتة يعلوها توشيم ابيض ويكتنف ساق كل ريشة خط عريض اسود. رداؤه وظهره الى البيّني الداكن. سقطه ذلق مستطيل، هوامش كلاه واباهره الى البيّني الباهت، قوادمه سود. ذنبه مستطيل فارق، لونه الى البيّني الداكن تعلوه خطوط سود معترضة. افيكه الى الحنطي الاحمر الموج. صدره وبطنه الى البيّني العابق يعلوه موج احمر. معظم ريش الرأس والصدر مدبّب الطرف. عينه متوسطة القد. حدقة عينه عنائية اللون كستنية الموج. منسره ضعيف البنية والتسنين، اسود اللون، اصفر الزفد، ذرب البهرة. رسغه صفراء اللون، قصيرة القد، كاسية في الزام الاعلى، مرطاء في القسم الباقي. اصابعه متوسطة الحجم، صفراء اللون. مخالبه ضعيفة، متوسطة التحجين، عابقة السمرة. ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر ولكنها تكبره قدًا اذ يبلغ طولها نحو ٦٠ سم. يألف الجبال والسهول والشواطى. اخلاقه شرسة لا تختلف عن اخلاق الحداء الحمراء وهو مثلها ثقيل الحركة، بطيء الطيران، قليل النخوة، حادّ البصر وشديد الحذر.

قوته القواضم وصغير الطير والافاعي والضفادع والحشرات والاسماك التي يتترعها من مناقيد النوارس وغيرها من طيور البحر الضعيفة.

يدنّن وكنه في الاشجار الكبيرة العاتية. اثناء تبيض ثلاث رفات. الحصن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء.

يعتبر من الكواسر القليلة الضرر لان ما يؤديه من نفع يفوق الاذى الذي يلحقه ببعض العصافير والطير.



N.S. *Anas querquedula*, *Querquedula ciria*.
 Fr. Sarcelle commune, Sarcelle d'été.
 Eng. Garganey. حَذْف صَيْفِيّ، كَرْكَجْ، شَرْشِير صَيْفِيّ،


طائر من الحذف ينتمي الى فصيلة البطيات ورتبة كفيّات القدم صفيحيّات المناقير. يستوطن في الربيع والصيف المناطق القطبيّة الشماليّة ويقطع في الشتاء الى المناطق الاستوائيّة اخصّها المناطق الافريقيّة. يقيم في لبنان من يومين الى ستة ايام قبل ان يتابع رحلته الى البلاد الاستوائية عبر القطر المصري.

جسمه متوسط القدّ. طوله نحو ٣٨ سم. وبسطته نحو ٥٦ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية. رأسه من الجبهة الى القفص اصهب اللون اسمر الموج وعلوه من جانبه جدّة بيضاء تمتدّ من طرف الجبهة الى مؤخر القفص. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنيّة اللون. منقاده كبير القدّ، مفلطح الشكل، سيّويّ اللون، اسود الموج. محسراه وزوره وعنقه الى الحنطي الصنابي تعلوه رقشة دقيقة بيضاء. رداؤه وظهره الى البني المتفاوت الموج لان نصال الريش اعقب من اطرافه وحواشيه. لواحف الجناح الى الزرقة الرماديّة الباهتة يتخللها تاذير ابيض. منكباها الى الطحلة يعلوها تجديع ابيض واسود وازرق. خوافيه مجذّعة بالابيض والاخضر. قوادمه بيّنة عابقة. صدره الى البني الباهت يعلوه وشم دقيق مستطيل كستنيّ اللون. بطنه الى البياض الاغبر يعلوه في مؤخره وفي الافنيك والعجز تجديع معترض اسود. ذنبه صغير القدّ، مدبّب الطرف، بنيّ اللون. ساقه واصابعه الى الربدة الرصاصيّة. مخالفه الى السمرة القاتمة. الانثى اصغر قدّا من الذكر واقلّ تدويقاً منه. ثوبها العلويّ الى البني الداكن يتخلله توشيم باهت يعود الى حنار اطراف الريش. رأسها كستنيّ اللون من الجبهة الى القفص. محسراها الى الغبرة المنمّشة بالبنيّ. عينها صغيرتان مستديرتان مكحلّتان. حدقة عينها كستنيّة اللون. منقادها الى الربدة الخضراء الموج. جناحها عادم التزيق الاخضر ولواحفه الكبرى الى البني تعلوه مشحة طحلاء خفيفة. ثوبها السفليّ يتميّز ببياض النحر والزور وفيما عدا ذلك فهو شبيه بثوب الذكر اليافع يتحلّى بثوب الانثى ويقلّ فيه التوشيم.

يألف المناقع والاهوار ومجاري الماء وضايف الانهر والبحيرات. يعدو بلباقة ويسبح برشاقة ويطيّر بسرعة ويحطّ على الارض بخفة لا يعترضها حوم ويأخذ الجو كالسهم. وهو

يبدّن عشّه في المناقع بين الاعشاب الكثيفة الرفيعة. الانثى تضع نحو ١٢ بيضة مستطيلة الشكل، ملساء الخشل، لونها الى الخضار الزيتي الفاتح. الحضان يستمرّ نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر.

وهو من الطيور التي تدجن بسهولة فيما لو اخذ صغيراً وعاش مع البط الاهلي الذي يسافده ويتج انغلاً خصبة.



N.S. Falco lanarius.
Fr. Faucon lanier, Laneret.
Eng. Lanner, Falcon Lanner.

حُرّ، صَقْر حُرّ

طائر من الصقور موطنه الشرق الأدنى من البحر الأبيض المتوسط الى الخليج العربي وحوض البحر الاحمر. يكثر في المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة ويقل في غيرها. يعتبر من اوابد لبنان غير انه قليل الوجود.

جسمه اصغر من جسم الشرق. طوله نحو ٤٠ سم. وبسطه نحو ٩٤ سم. وهو اصقع الرأس، مكحل العين، ابيض المحسر، اسفع الظهر، انمر الريش، اغبر البطن، عظيم المنكبين. ثوبه العلوي الى الزرقة السبورية تعلوها ماجة بنية داكنة يتخللها ريش مخطط. رأسه ابيض المقدم، حنطي القنة والقفن. منكباه وسقطاه اعين لونا من ظهره واقل سفة ولعانا. سقطه يكاد يلحف الذنب. قواده موشمة في نصالها الانسية. ذنبه مجذع بخطوط معترضة عريضة. زوره وصدوره وبطنه وابطلاه الى البياض الاغبر تعلوه مشحة بنفسجية باهتة تتخللها رقشة سمراء ووشم لا قياسي الحجم يستطيل طارة ويتسع اخرى. حدقة عينه كستنية اللون. منسره الى الزرقة البحرية القاتمة، زفده الى الصفار الباهت، بهرته محججة ذرية حادة. ساقه مرطاء. رسغه واصابعه الى الصفار الحنطي. مخالفه قوية، حادة، سوداء اللون.

الانثى لا تختلف عن الذكر الا بقدها الذي يفوق الذكر كبراً. اما اليافع فانه اكثر بياضاً من البالغ وادكن ثوباً وابهت ماجة ولعانا. يألف الجبال والهضاب والبراري. اخلاقه ومزاجه كاخلاق الصقر ومزاجه وربما كان اخف منه انتقالاً وارشق حركة.


قوته كل ما استطاع اليه سبيلاً من الطير لانه يقتنص صيده في الجو كما يفعل الصقر. يدئن وكنه في صدوع الصخور المنبعة. اثناء تضع اربع رفنات تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع بينما الذكر يؤمن لها الغذاء. رفنها حنطي اللون تعلوه رقشة سمراء خفيفة تتمركز عند العقب.

يعتبر من الكواسر المؤذية الضارة.

مرهف الحواس، حاد البصر، جسم الحذر لا يخدع اكثر من مرة. قوته الاسماك الصغيرة والبلاغيط والديدان والرخويات والنباتات المائية والاعشاب البرية وبعض الجيوب.

يدئن عشه في المناقع وعلى ضفاف الانهر والبحيرات بين الاعشاب الرفيعة الكثيفة القريبة من الماء. الانثى تضع من ٧ الى ٩ بيضات مستطيلة الشكل، ملساء الخشل، لونها الى الصفار التبيني. الحضن يستمر نحو ٢٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر.

يعتبر من الطرائد المرغوب فيها وهو يدجن بسهولة فيما لو اخذ صغيراً وعاش برفقة البط الاهلي الذي يسافده وينتج انغالا خصبة.



حَسُون ، شُوَيْكِي ،
نَقَّار الشُّوك

N.S. Fringilla carduelis, Carduelis carduelis.
Fr. Chardonneret, Chardonneret élégant.
Eng. Gold-finch.

زمن السفاد والترخيم يستمر من اواسط نيسان الى اواخر ايار. يدتن عشه في الاشجار الشامخة الكثيفة الافنان والورق. عشه قذحي الشكل، قليل العمق، جيد الحبك، يغلفه بالحزاز والشبا والطحلب ويبطنه بالسيب والصوف وقطن الصفصاف وعفرة الازهار الزغبية التركيب. الانثى تحضن وحدها نحو ٥ بيضات من ١٣ الى ١٤ يوماً. بيضها عاجي اللون يعلوه تمشيح اخضر وبعض النقط الجوية يتخللها الازرق والاسمر. الذكر يؤمن غذاء الانثى في زمن الحضن ويعتني بالصغار ويقدم لها القوت برفقة الام. وهو من العصافير التي تألف القفص وحياة الاسر ويمكن تنغيله مع الكنار والنغر والكعتر والتففيحي.

يعتبر من العصافير النافعة لانه لا يؤذي النباتات الزراعية وقد يقضي على الكثير من الحشرات الصغيرة والديدان في زمن الحضن وتغذية الجلايط.

عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات يجيد الزقزقة والتوقيع ولا ينقطع عنهما الا في زمن التحسير. موطنه شاسع الاطراف يشمل معظم البلاد الاسيوية والاروية المعتدلة الحرارة وحوض البحر الابيض المتوسط وافريقية الشمالية. اعطانه اللبنانية تشمل الساحل والوسط والجرود والبقاع وهو يجوبها سنوياً طلباً للرزق والمصيف والمشتى.

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٥ سم. وبسطته نحو ١٨ سم. ثوبه جميل الالوان الزاهية المتراكبة. متقاره مخروطي الشكل، مستدق الطرف، ازرق اللون، اسود الموج. عيناه مطوقتان بالاسود. حدقة عينه كستنية اللون. جبهته وذقنه الى الحمرة القرمزية. محسراه وعنقه بيض. رأسه اسود اللون من القمة الى القفن. رداء ظهره الى الصهبة السمراء. زوره وصدره وبطنه الى البياض يعلوه من الميمنة والميسرة تشكيل اصحر يزيد وضوحاً مع ابتعاده باتجاه الايطلين. جناحاه الى السواد الخمي اللامع يعلوهما تجذيع معترض مستعرض اصفر وتبقيح طرفي ابيض. وجناحه مستطيل القد يلحف اكثر من نصف الذنب. ذنبه مقعر الطرف، اسود اللون، تعلوه رقشة بيضاء مستديرة طرفية الارتكاز. رسغاه الى السمرة الداكنة. مخالبه دقيقة، مستطيلة، محجّنة، سمراء اللون.

الانثى تحمل ثوب الذكر لكنها لا تتحلى بمواجه ولعته فالاحمر في جبهتها وذقنها اقل اتساعاً وزهاءً مما هو عليه عند الذكر والاسود في رأسها وجناحها داكن الموج، وصدرها وبطنها اكثر تشكياً وصحرة.

وثوب الحسون عرضة لبعض التغييرات الناجمة عن عوارض جسمورية ذاتية لا وراثية كالاخصاب والاسداف (Albinisme et Mélanisme).

يسرح في النهار. يألف البراري والاراضي المذحاة والاحراج المبعثرة الاشجار. طيرانه خفيف ورشيق وسريع غير انه قصير الشوط المتمايل الخط. ويتميز بالارتكاز والتردد عند الوقوع على النبات وغيره من مطلق الاشياء.

قوته بزور النباتات البرية واخصها الشوك والضياء والحشرف.



حَنَمَة

N.S. Carine passerina, *Glaucidium passerinum*.
Fr. Chevêchette, Chevêchette naine, Chouette chevêchette.
Eng. Pygmy Owl.

والحنمة تدجن بسهولة، خاصة إذا أخذت فتيّة، ولا تفارق البيت الذي آوت إليه والحديقة التي الفت اشجارها وتعودت ارتيادها.
تعتبر من الكواسر النافعة لان اذاها لا يتعدى بعض صغار العصافير.


طائر من الفداديات وفصيلة البوميّات. وهي اصغر انواع الفصيلة قدًا واكملها شكلاً وقالبًا. خلقها وطباعها تجعلها قريبة الشبه بالصدى. موطنها يشمل معظم البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. تألف في لبنان احراج الصنوبر والتنوب واللزاب والعرعر والسنديان. تقضي الصيف في الجبال العالية وتقضي الشتاء في احراج السواحل والوديان ولا تقترب من الاماكن الآهلة الا مع صقيع الشتاء وزمهريره.

الذكر اصغر قدًا من الانثى، طوله نحو ١٨ سم. وبسطته نحو ٤٠ سم. طول الانثى نحو ٢٠ سم. وبسطتها نحو ٤٥ سم. ثوب الذكر الى الطحلة الرمادية تعلوها رقشة بيضاء يحوقها اطار اصفر تمتد من الجبهة الى الرأس والرداء والظهر والجنح والعجز. بطنه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة مستطيلة الشكل، حنطية اللون، عابقة. نقابه الى الصهبة الحنطية الغبراء تعلوها نمشة دقيقة سمراء. منسره اصفر اللون. عيناه مستديرتان كبيرتان. حدقة عينه الى الصفرة الصنابية. ذنبه رباعي الخطوط البيض المعترضة. ساقاه مسرولتان. اصابعه كاسية. مخالفه فحمية اللون مستدقة الاطراف المحدودة الحادة.
ثوب الانثى اعقب لونًا من ثوب الذكر واقلّ بياضاً منه.

تلتمس قوتها من العصر الى الدغوش ومن الفجر العميق الى الشروق. وهي نزقة الطباع، نشيطة، خفيفة الحركة تتسلق الاغصان كالبيغاء. طيرانها متوسط الشوط متمایل العيفة. تصيد الفأر والعكابر وجميع انواع الحشرات وبعض العصافير الصغيرة. ومن عاداتها تخزين بعض ما تقتنصه من الحشرات اخصها غمديات الجناح. مخازنها صدوع الاشجار وتجاويفها.

تدئن عشها في ارفع تجاويف او صدوع الاشجار الصنوبرية. الانثى تبيض في اواخر شهر نيسان من ٣ الى ٥ رفنات تحضنها وحدها نحو ٢٨ يوماً بينما الذكر يؤمّن لها القوت. اما رفنتها فصغيرة القد، كروية الشكل، غبراء اللون، عادمة الرقشة، تعلوها مشحة حنطية لا نظامية الارتكاز.

N.S. Columba livia.
Fr. Colombe biset, Pigeon de roche.
Eng. Rock Dove.



حَيْدَوَان

قوته البزور والحبوب المختلفة وبعض الحشرات والقشريات والرخويات.
يدتّن عشّه في صدوع الصخور الحريزة المنبوعة. اثنائه تحضن من مرتين الى ثلاث مرات
في العام. ولا تحضن في كل مرة أكثر من بيضتين لونهما الى البياض العاجيّ تعلوه مشحة
خفيفة لا متساوية من الزرقة الباهتة. الحضن يستمر من ١٥ الى ١٦ يوماً تقوم به الانثى
بمناوبة الذكر. الجوازل تترك العش بعد النقف باربعة اسابيع.
يعتبر من الطرائد المرغوب فيها المتوسطة الصنف.

نوع من الحمام البرّي يدعى في مصر «حمام جبلي». يقال انه رأس ذرية الحمام الداجن
السذي تحدرّ منه. ضرابه المعروفة لا تقل عن سبعة اشهرها: الحيدوان العراقي
(Col. liv. gaddi) والحيدوان العربي او الفلسطيني (Col. liv. palastinae)
والحيدوان المصري (Col. liv. schimperi) والحيدوان الداخلي او الباهت
(Col. liv. dakhlae) مواطن هذه الضروب تمتد من الشرق الاوسط الى مناطق
حوض البحر الابيض المتوسط كافة. فوارقها المميّزة قليلة ترتكز بنوع خاص على زهاء الثوب
او قتامته وعلى انفعال الماجات وعلى عرض التجذيع الاسود.

يعتبر من ضواري لبنان لانه يقيم في ربوعه بعض الايام في فصلي الربيع والخريف.
جسمه متوسط القد. طوله نحو ٣٢ سم. وبسطته نحو ٤٥ سم. ثوبه بوجه عام الى
الرمادي الرصاصيّ الموج يعلوه توشيح ابيض واخضر وبنفسجيّ. رأسه الى الرمادي الازرق.
قفنه ومحسراه وزوره الى الخضار الاسفع. رداؤه متراكب الماجات التي تراوح من الارجواني الى
البنفسجي. ظهره ولواحف جناحيه الى الربدة الطحلاء. قوادم الجناح وخوافيه مجذعة
بالاسود. عجزه الى البياض الاغبر. ذنبه معتدل الطول، مقطوم الطرف، يتكوّن من ١٢
رفلة، لونه الى الربدة الداكنة يزداد اسمراراً مع اقترابه من الطرف. صدره وبطنه وابطلاه الى
الغبرة الرمادية يعلوها موج ازرق. عيناه كبيرتان، حدقة عينه الى الحمرة البرتقالية. مفقاده
متوسط القد، حنطيّ اللون يعلوه موج رصاصي. ساقه عرياطة حمراء اللون. اصابعه الاربع
معتدلة الطول نشيطة المخالب المتوسطة التحجّين.

الانثى اصغر قدّاً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب واليافع كالبالغ.
يألف البراري والفيافي والاراضي المدحاة. يبيت في الكهوف والمغاور وتحت الصخور
الناثئة التي تؤمن له بعض الظل في النهار والحماية من الوضاء في الليل.
يعيشان ذكراً وانثى. سربه في تجواله ورحيله متوسط العدد يراوح من ٢٠ الى ٤٠ زوجاً.
طيرانه خفيف الحركة يجاري الدلم في السرعة وينقل على الارض برشاقة ولباقة.

N.S. Strix aluco, Syrnium aluco.
Fr. Hulotte chat-huant, Chouette hulotte.
Eng. Tawny Owl.

يعتبر من الكواسر الروامس العظيمة النفع لانه يقضي على الكثير من القواضم والزحافات وعلى جميع الحشرات الكبيرة والصغيرة. يقال ان الخبل الواحد يفترس في الليلة الواحدة اكثر من اثنتي عشرة فأرة وقد يفترس ايضاً في الليلة الواحدة من ٨٥ الى ١٠٠ سرفة ودودة.



خبل

طائر كاسر رامس من الفداديات وفصيلة البوميّات . موطنه جميع البلاد المعتدلة الحرارة . يعتبر من اوابد لبنان النافعة . يألف الغابات والاحراج ويتعد عن الاماكن الآهلة وهو كثير الزقاء لا يتقطع عنه من الغسق الى الفجر .


جسمه متوسط القدّ . طوله نحو ٤٠ سم . وبسطة سقطيه نحو ٥٦ سم . رأسه غليظ الشكل . نقابه مستدير القرص . منسره قصير القدّ ، منعطف الطرف ، اسمر اللون . سقطه منفرج مستطيل يكاد يشرف على الذنب . ذنبه قصير الافنيك مستدير الطرف . ساقاه قصيرتان قويتان مسرولتان . اصابعه كاسية . مخالبه مدببة الاطراف الحادة .

ثوبه يختلف باختلاف الشق والعمر . الذكر البالغ الذي اكمل ثلاث سنوات من عمره يتحلّى برداء علويّ قوامه الصهبة السمرء يعلوها تمشيج مستطيل قاتم وتحزيز معترض عابق ورقشة بيضاء وصنابية . بطنه ابيض اللون اصفر المواج تعلوه رقشة مستطيلة كستنية تتخللها خطوط دقيقة معترضة صنابية . نقابه الى الصهبة الزرقاء المواج تعلوها خطوط دائرية حنطية اللون تنتهي بحتار مستعرض اسمر . سقطاه وذنبه مجدعة بالاسمر والاصهب والبني . عيناه مستديرتان . حدقة عينه الى الشبهة الصنابية .

الانثى اجسم من الذكر ويسود ثوبها شقحة سفعاء تجعل تخفيتها بين اغصان الاشجار ايسر من تخفية الذكر .

يلتمس قوته في الليل ولا يعفّ عن حيوان يستطيع اقتناصه من الحشرة الى الحية وبنوع خاصّ الجرذ والفأر والعكابر وهو قليل النزق بطيء الحركة . طيرانه سفيف يكاد يلامس سطح الارض او يعلوه بعض الاقدام .

زمن سفاده وترخيمه يراوح من اوائل نيسان الى اواخر ايار . بدئن عشّه في صدوع الاشجار القديمة الباسقة او في وكن غيره من الطير . الانثى تضع من ٣ الى ٦ رفنات اهليلجية الشكل ، خشنة الخشل ، عاجية اللون تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع بينما الذكر يؤمّن لها الغذاء .



N.S. Merops apiaster.

Fr. Guêpier commun, Guêpier vulgaire.

Eng. Common Bee-eater.

خُصَّارٌ مَبْدُولٌ ،

وَرَّوَارٌ مَبْدُولٌ ، وَرَّوَرٌ مَبْدُولٌ

طائر من الخُصَّارِ وفصيلة الخُصَّاريَّاتِ الجوائمِ ملتصقاتِ الاصابعِ . موطنه فسيح الارحاءِ يشمل جميع البلادِ الحارَّةَ والمعتدلةَ الحرارةَ من العالمِ القديمِ . يعتبر من ضوَّاربِ لبنانِ لانه يقيم فيه من سبعةِ الى تسعةِ اسابيعِ في كل عامِ .


جسمه رشيق القوامِ . طوله نحو ٢٦ سم . وبسطته نحو ٣٢ سم . ثوبه الى السمرةِ الكستنائيةِ يعلوها موج اخضر . جبهته الى البياضِ الاخضرِ الماجة . نحره الى الصفارِ المذهبِ يحوق به اطار اسود . صدره وبطنه الى الزرقةِ الخضراءِ . جناحه الى الصهبةِ الزيتونيةِ . كلاه وابهاره كستنية اللون . ذنبه الى الخضارِ البني . عينه كبيرة مكحلة . حدقة عينه قمرية . مناقده اسود . ساقه واصابعه بنية . مخالبه كبيرة ، مقوسة ، حادة ، سوداء اللون .

يتميز برشاقة الجسم ، وبزهاء الالوانِ الجميلةِ المتراكمةِ ، وباستطالةِ المنقادِ الغليظِ القاعدةِ ، المدببِ الطرفِ المقوسِ ، وبطولِ الجناحِ الذليقِ الطرفِ ، وباستطالةِ الذنبِ الرتاجيِّ الريشِ الذي يعلوه ويخرج عنه ريشتانِ فارقتانِ ، وبقصرِ الرسغِ ، وبالتحامِ الاصابعِ على الشكلِ التالي: الاصابعِ الخارجيةِ ملتحمةِ بالوسطىِ حتى المفصلِ الثانيِ والوسطىِ ملتحمةِ بالداخليةِ حتى المفصلِ الاولِ .

الشقان لا يختلفان واليافع كالبالغ باستثناء زهاء الالوانِ .

يألف الحياةَ الجماعيةَ ويعيش اسراباً متفاوتةِ القدرِ يراوح عدد افرادها من ٢٠ الى ٦٠ قوته الحشرات على اختلافِ انواعها واجناسها واخصها الخشرم والنحل والزنابير .

يدفن افحوصه في التراب بين الصخورِ الشامخةِ الشارفةِ . افحوصه نفق مستطيل قطره نحو ٧ سم . وطوله لا يقل عن ١٠٠ سم . ولا يتجاوز ٢٠٠ سم . ينتهي بحجرةِ اولى تليها حجرة ثانية على بعد ٢٥ او ٣٠ سم . الحجرةِ الاولىِ وهي المحضنِ يبلغ طولها ٢٨ سم . وعرضها ١٨ سم . وارتفاعها ١٢ سم . اما الحجرةِ الثانيةِ وهي متساويةِ الطولِ والعرضِ الذي لا يقل عن ٢٦ سم . بينما ارتفاعها لا يفوق ١٠ سم . فانها تستعمل كمستودع للنفايات واخصها اجنحة الحشرات .



N.S. Aedon.

Fr. Aédon, Agrobate.

Eng. Aedon.

خُرْقَةٌ

الخُرْقَةُ ج خُرَّقَ . طائر من الدخخلِ وفصيلةِ الدخليَّاتِ . اعطانه فسيحة الارحاءِ تمتد من الشرقِ الاوسطِ الى اروبةِ الشرقيةِ والجنوبيةِ ثم الى افريقيةِ الشماليةِ من الجزائرِ الى المغربِ . يقيم في الوسطِ والجرودِ اللبنانيةِ من الربيعِ الى الخريفِ .


جسمه صغير القدِّ . طوله نحو ١٧ سم . وبسطته نحو ٢٤ سم . ثوبه العلويِّ من الرأسِ الى الرداءِ والظهرِ ، اطحل اللونِ صنائيِّ الموجِ . جناحاه الى السمرةِ ، رفالها مهدبةٌ بالحنطيِّ الاشقرِ . عجزه حنطيِّ اللونِ تعلوه مسحة سمرء . ذنبه مستعرض الشكلِ ، محدب الطرفِ ، لونه الى الشقرةِ الزاهية تحوق به من جانبيه اربعةِ رفالِ مجدعةِ الاطرافِ بالاسودِ والابيضِ . عنقه وصدره وبطنه الى البياضِ الاغبرِ . عيناه مستديرتانِ معتدلتانِ القدِّ . حدقة عينه عسلية اللونِ ، سمرء الموجِ ، منقاره الى الجؤوةِ الباهتةِ . رسغاه نشيطانِ . اصابعه قصيرة . مخالبه نحيلة . ساقاه واصابعه الى الجؤوةِ الحنطيةِ الباهتةِ .

الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلَّى بذات الثوبِ .

يألف المواقعِ الرطبةِ والزواتينِ والكرومِ والحدائقِ . طيرانه سفيف خفيف الحركةِ ، قصير الشوطِ ، قليل الحومِ والتحليقِ . تغريده مستحب الانغامِ لكنه دون العندليبِ والحسونِ حسناً .

يعيش باستثناء زمن السفادِ بكل الفة مع غيره من عصافيرِ القطاعِ والمنطقةِ . اما في زمن السفادِ فلا ينفك عن منزلة اترابه من الذكورِ ويعتزلها عندما يقع اختيار الانثى عليه . قوته الحشرات والديدانِ يقتنصها على الارضِ وعلى الاشجارِ . يتربص بفرسته جائماً على طرفِ غصنِ او فندٍ وعندما يشاهدها يحط على الارضِ ويتقضَّ عليها كالسهمِ رافعاً ذيله كالطاووسِ .

يدفن عشه في الادغالِ وفي الشجيراتِ والاشجارِ الداسيةِ القليلةِ الارتفاعِ . عشه قذحي الشكلِ يحبكه بالقشِ والاليافِ والاوراقِ وبطنه بالزغبِ والريشِ والصفوفِ . الانثى تضع نحو ٥ بيضاتِ لونها الى الريدةِ البيضاءِ تعلوها رقشة سمرء تتمركز عند العقبِ . المحضنِ يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبةِ الذكرِ . يعتبر من العصافيرِ الجزيلةِ النفعِ .



N.S. Chloris chloris,
Fringilla chloris,
Ligurinus chloris.


Fr. Verdier, Verdier ordinaire.

Eng. Green Finch, Green Linnet.

خُصِير ، خُصِيرِي

طائر من فصيلة الشرشوريّات ورتبة الجوائم مخروطيّات المناقير. موطنه آسية الوسطى والشرق الادنى وبعض الاقطار الارويّة. اعطانه اللبنانيه تشمل جميع مناطق البلاد. جسمه صغير القدّ، طوله نحو ١٥ سم. وبسطته نحو ١٨ سم. ثوبه الصيفي ازهى من الشتوي. رأسه ورداؤه وظهره ومنكباة وعجزه الى الخضار الزيتوني الزيتي. زوره وصدره وبطنه الى الخضار الاصفر. جناحه الى الربدة، قوادمه صفر، اباهره سود. ذنبه متوسط القدّ، فارق الطرف، اصفر اللون يعلوه تمشيش اسود. عيناه مطوّقتان مكحلّتان. حدقة عينه خرنوبية اللون. منقاده مخروطي الشكل، غليظ الجرم، قصير القد، حنطيّ اللون، اسمر المواج. رسغاه واصابعه الى السمرة الحنطيّة. مخالبه الى الطحلة الخضراء المواج. الانثى اصغر قدّا من الذكر وثوبها الى الخضار الاشهب يعلوه توشيح اصفر. اما اليافع فثوبه ثوب الانثى تعلوه رقشة حنطيّة لا متساوية التخضب. يألف الغابات والحدائق والجنانن وضياف الانهر والاراضي المزدرعة. قوته الحبوب واليزور. يرغب في القنيز وبزر الكتان والسلجم وبزر العنب والحشرات المختلفة اخصّها الفراش. وهو سريع الحركة ينتقل على الارض برشاقة ويطير بخفّة ويتوغّل في الحدائق بلباقة. تغريده زرققة عالية متقطّعة التبرات لا ذوق فيها ولا تلحين. يدثن عشّه في الاشجار والجنبات الظليلة. عشّه رفيع الحاقّة، جيد الحبك، يحوكه بالقش والحشيش الناعم ويبطنه بالطحلب والصوف والسبيب. اناثه تحضن من مرتين الى ثلاث مرّات بالسنة، المرّة الاولى في اواسط نيسان والثانية في اوائل حزيران والثالثة في اوائل آب وتضع في كل مرّة من ٤ الى ٦ بيضات ترخمها وحدها من ١٣ الى ١٤ يوماً بينما الذكر يؤمّن لها الغذاء. يعتبر من العصافير المتوسطة النفع.

الانثى تبيض خلال شهر حزيران من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع بينما الذكر يؤمّن لها الغذاء. يعتبر من الطيور المؤذية لانه يلتهم النحل بشراهة.




N.S. Hirundo urbica,
Chelidon urbica.

Fr. Hirondelle de fenêtre,
Hirondelle à cul blanc, Chélidon.

Eng. House Martin.

حُطَّافِ النَّوَّافِذِ ،
سُونُو النَّبُوتِ ، حُجْبِجَة



N.S. Hirundo rustica.

Fr. Hirondelle rustique,
Hirondelle de cheminée.

Eng. Swallow.

حُطَّافِ الْمَدَاحِنِ ،
حُطَّافِ مَبْدُولِ ، سُونُو الْعُمَرَانِ

طائر من الحطّاف وهو موطنه يمتد من الشرق الأقصى الى الاوسط فاروية ومن افريقية الشرقية والجنوبية الى الشمالية والغربية. يقم في لبنان من اوائل ايار الى مطلع تشرين الاول. جسمه صغير القد طوله نحو ١٤ سم. وبسطه نحو ٢٢ سم. منقاره صغير، قصير، مستقيم، مدبب. جناحه ذلق مستطيل، يكاد يلحف كامل الذنب وهو عشاري القوادم اطولها الثانية وضميرها الاولى. ذنبه معتدل الطول مقعر الطرف يتألف من اثني عشرة رفة. رسغاه قصيرتان نحيلتان كاسيتان. اصابعه لا متساوية الطول ضيقة التفاريج لا تخلو من الزغب والريش الوبر.

ثوبه متراكب الالوان. رأسه ورداؤه وظهره وجناحاه الى السواد اللامع الازرق المواج. قوادم جناحه والقسم الاخير من ذنبه الى السمرة الكستنية السوداء المواج. نحرة وصدرة وبطنه وايطلاه وافنيكه الى الشقحة الصفراء الباهتة. ذنبه اسود الصفحة العليا، غير السفلى المتمشّة بالابيض. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه سوداء اللون. منقاره الى السواد الازرق. رسغاه واصابعه حنطية اللون كاسية. مخالفه صغيرة دقيقة سمراء اللون. يألف الاماكن الاهلة ويسرح طوال النهار. قوته الذباب والبعوض ومختلف الهوام والحشرات الصغيرة ما عدا الخشرم وجميع اصحاب الحمة. يتميز بطيرانه السريع الخاطف وبقنصه وشربه واغتساله وهو طائر.

يشيد عشه بالتراب اللزج مع بعض القش والصوف. الانثى تحضن مرتين في العام وتضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى البياض التبيي يعلوه تقيط اسمر. الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. يعتبر من الطيور الجزيلة النفع التي لا تظالها اساءة الناس.

نوع من الحطّاف وهو طائر من فصيلة الحطّافيات. موطنه شاسع الاطراف يمتد من الهند الى الشرق الاوسط واروية ومن افريقية الشرقية والجنوبية الى الشمالية والغربية. يجوب بعض اصقاعها طلباً للمصيف والمشتى. يقم في لبنان من اوائل ايار الى اواخر ايلول.

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٩ سم. وبسطه نحو ٣٠ سم. منقاره صغير، قصير، مستقيم، مدبب. جناحه ذلق مستطيل، يلحف القسم الاكبر من الذنب. ذنبه مستطيل الشكل، فارق الطرف، واسع البين. رسغاه قصيرتان نحيلتان. اصابعه لا متساوية الطول، عارية التفاريج الضيقة. مخالفه صغيرة نحيلة سمراء اللون.

ثوبه متراكب الالوان. رأسه وظهره وجناحاه الى السواد الازرق الاسفع المواج. جبهته ونحوه الى السمرة الكستنية الحمراء المواج. عنقه مستعرض القلادة السوداء. صدره وبطنه وايطلاه وافنيكه الى الشقحة الصفراء الباهتة. ذنبه اسود الصفحة العليا، غير السفلى المتمشّة بالابيض. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره الى السواد الازرق. رسغاه واصابعه الى السمرة الحنطية العابقة.

يألف الاماكن الآهله. يسرح طوال النهار. قوته الذباب والبعوض ومختلف الهوام والحشرات المجنحة الصغيرة باستثناء ذوات الحمة كالنحل والزنابير.


يتميز بطيرانه السريع الخاطف وبقنصه وشربه واغتساله وسائر اعماله التي يقوم بها وهو طائر.

يشيد عشه بالتراب اللزج الممزوج بالقش. الانثى تحضن مرتين في العام وتضع في كل مرة من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى البياض الوردى نعلوه نقط سمر يكثر تجميعها عند العقب. الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. يعتبر من الطيور الجزيلة النفع التي لا تمتد اليها يد معتصب.

N.S. Monticola saxatilis,
Petrocincla saxatilis.

Fr. Merle de roche,
Pétrocincle de roche.

Eng. Ring Ouzel.



دُج الصُّخُور ، سَكَلَّة

طائر من الدجّ وفصيلة الشحروريّات. موطنه يمتد من اواسط البلاد الاسيويّة الى الشرق الاذني واروّة الجنوبية والوسطى والغربيّة وافريقيّة الشماليّة من الجزائر الى مراكش وهو من اوايد لبنان يجوب اصقاعه كل عام طلباً للمصيف والمشتى.

جسمه رشيق القوام ، يطول نحو ٢٢ سم. وبسطته نحو ٢٨ سم. ثوبه يختلف باختلاف الشق. رأسه متوسط القد. عيناه كبيرتان مستديرتان مكحلّتان. حدقة عينه كستنيّة اللون. منقاده قويّ البنية مدبّب الطرف، اسود اللون، جناحه متوسط القد، ذلق الطرف اطول قوادمه الثالثة. ذنبه معتدل الطول. ساقه دقيقة متوسطة الطول تمكّنه من سرعة الانتقال على الارض. رسغه الى السمرة الحنطيّة العابقة. اصابعه قوية مجهّزة بمخالب حادة سمراء اللون. ثوب الذكر متباين الالوان المتراكبة الجميلة. رأسه وعنقه ورداؤه وزوره الى الزرقة الطحلاء. ظهره اسود اللون تعلوه رقشة بيضاء. جناحاه الى البني الداكن باستثناء حافات الريش واطرافها التي تبدو باهتة تعلوها موج اربد. عجزه ابيض اللون. ذنبه الى الشقحة العابقة ما عدا الزوج الاوسط من الرفال الذي يبدو كستنيّ اللون زيتيّ الموج. صدره وبطنه وافنيكه الى الشقحة الصنائيّة.

ثوب الانثى اقلّ تزويقاً من ثوب الذكر واخفّ زهاءً منه. صفحتها العليا الى البني الكامد تعلوه رقشة طحلاء ونمشة سوداء. صفحتها السفلى الى الشقحة الصنائيّة. عنقها وزورها الى البياض.


يألف الجبال والهضاب والتهام الجرداء الكثيرة الصخور، المبعثرة الشجيرات والجنبات. وهو نزق الطبع، شديد النشاط والفظنة والحذر، كثير الحركة والمرح. يتنقل على الارض برشاقة ويطير بخفة ويسرع في طيرانه المتقطع الشوط.

يحسن التغريد ويقبل التهذيب ويقلّد الاصوات والانغام بسهولة لا نظير لها. يجتنب مصاحبة غيره من الطير ولا يتودّد الذكر الى الانثى ولا يعيش برفقتها الا في زمن السفاد والترخيم والعناية بالفراخ.

N.S. Monticola solitaris,
Turdus cyaneus.

Fr. Pétrocincle bleu, Merle bleu.

Eng. Blue Fieldfare.



دُج أزرق ، سَكَلَّة زرقاء


طائر من الدجّ وفصيلة الشحروريّات. اعطانه فسيحة الارعاء تشمل بلاد حوض البحر الابيض المتوسط وحوض البحر الاحمر والقسم الاكبر من افريقيّة الشرقيّة يجوبها طلباً للرزق والمصيف والمشتى. يقيم في لبنان بعض الوقت في اثناء قطاعه ورجاعه.

جسمه ربع القامة ، يطول نحو ٢٥ سم. وبسطته نحو ٣٠ سم. ثوبه يختلف باختلاف الشقّ يتميّز بمنقاده الضليع المدبّب الطرف وبساقه الدقيقة المتوسطة الطول التي تمكّنه من سرعة الانتقال على الارض. عيناه كبيرتان مستديرتان. حدقة عينه بيّنة اللون. منقاده الى السمرة السوداء. رسغاه الى الزرقة الجميلة تعلوها ماجات مختلفة تراوح من الربدة الى السمرة السفعاء. جناحاه الى السواد الفحمي اللامع تعلوه ماجة زرقاء خفيفة. اطول قوادمه الثالثة واطراف قوادمه ابهت لواناً من سائر ريش الجناح. زوره واعلى صدره الى الزرقة الطحلاء الموج. اسفل صدره وبطنه الى الزرقة البنيّة الموج. ذنبه الى السواد الفحمي اللامع.

ثوب الانثى الى الطحلة السبوريّة تعلوها موج بنيّ يعبق في الرأس والرداء والظهر والجناح والصدر ويهت في الزور والبطن والافنيك.

يألف الاراضي المذحاة الكثيرة الصخور وقلما يشاهد جائماً على غصن شجرة. وهو شديد الحذر، نزق الطبع، كثير الحركة والمرح، يحسن التغريد ويقبل التهذيب واقتباس الانغام. يجتنب مصاحبة غيره من الطير ولا يتودّد الذكر الى الانثى التي يعيش برفقتها الا في زمن السفاد والترخيم والعناية بالفراخ.

قوته الحشرات والهوام ومعظم الثمار العنبيّة البريّة وبعض ثمار الفاكهة. يدنّ عشّه في صدوع الصخور. عشّه قدحيّ الشكل جيّد الحبك يغلفه بالطحلب ويبطنه بالحشيش الناعم والسيب والصوف. الانثى تضع في اوائل شهر ايار من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الزرقة الخضراء المنمّشة بالشبهة والشقحة. الحضن يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. يعتبر من العصافير المتوسطة النفع.



N.S. Scolopax rusticola.

Fr. Bécasse commune,
Bécasse des bois.

Eng. Woodcock

دَجَاجَةُ الْأَرْضِ الْمَبْدُولَةُ

طائر من دجاج الارض . يدعى في مصر « ديك الغابة وحمار الحجل » . موطنها يمتد من جنوب الصين الى بورمه والهند والشرق الاوسط والادنى واروثة وافريقية الشرقية والشمالية . وهي من الضوارب التي تفتد الى لبنان في اوائل الخريف ويستمر ورود اسرابها في طريق مشتائها نحو عشرة اسابيع .

جسمها كبير القد . طولها نحو ٣٧ سم . وبسطتها نحو ٤٢ سم . ثوبها الى الصهبة الطحلاء تعلوها رقشة بيضاء وتوشيم اسود . وثوبها هذا يمانن البيئة التي تعيش فيها لذلك يختلف من بلاد الى بلاد . رأسها مبضع بخطوط معترضة سوداء اللون يخف اسودادها ويتلاشى مع الاقتراب من القفن . جناحها كبير القد ، ذلق الطرف ، اطول قوادمه الاولى والثانية . ذنبها صغير اقطم ، يتألف من ١٢ رفة ، سطحه العلوي اسود اللون اطحل الموج ، سطحه السفلي الى البياض اللؤلؤي . زورها وصدرها وبطنها وابطالها وافنيكها الى البياض الاغبر تعلوه ماجة صفراء وخطوط متتابعة من الوشم الاسود . عيناها كبيرتان جاحظتان . حدقة عينها كستنية اللون . منقادها الى الجؤوة الباهتة وهو بالغ الطول يحمل اخدوداً وسطياً واحداً . رسغاها قصيرتان وهما مع اصابعها الى الحمرة الرمادية يعلوها موج اصفر .


الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها اطول منقاداً وتتحلّى بذات الثوب ما عدا الذنب الذي تبته الوانه وتخف ماجاته .

تألف الاماكن الرطبة واخصها الغابات التي تسمح لها بالاختفاء عند الحاجة . وهي جمّة الوجل ، شديدة الحذر والخوف ، مرهفة الحواس والغرائز التي تمكّنها من التخريب بالصيادين . طيرانها معتدل السرعة والشوط يكثر فيه التعرّيج والتصعيد والانخفاض . عدوها على الارض متوسط الخفة لا مستقيم الخط .

قوتها الحشرات ويرقاتها واسارها والديدان والرخويات وبعض نوامي الاعشاب الطوعية والثمار البرية .

قوته الحشرات والهوام والديدان والحلزونات والشاميل والمصع والكبات وبعض الثمار الجؤوة .

يدتّن عشّه في صدوع الصخور وفي المواقع المنيعه الصعبة المنال . عشّه قدحي الشكل . جيد الحبك . يغلفه بالحشيش والطحلب ويبطنه بالسيب والصوف والقش الناعم . الانثى تضع في اوائل شهر ايار من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى البياض الاخضر الموج . الحضن يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر . يعتبر من العصافير المتوسطة النفع .



N.S. Gallinula chloropus.

Fr. Gallinule commun,
Poule d'eau ordinaire.

Eng. Common Moorhen, Vulgar Water Hen.

دَجَاجَةُ الْمَاءِ الْمَبْدُولَةِ

نوع من دجاج الماء وفصيلة التفلقيات. موطنها فسيح الأرجاء. تعتبر من اوابد المناطق الحارة ومن قواطع المناطق الاستوائية والمعتدلة. تقيم في لبنان في اثناء رحلتها الربيعية والخريفية نحو خمسة اسابيع.

جسمها ربع القامة، متوسط القد. طولها نحو ٣٥ سم. وبسطها نحو ٣٨ سم. تتميز باعتدال الرأس والمنقاد اللذين يتساويان بالطول. جبهتها حمراء اللون مدرعة بزائدة قرنية تتصل بقاعدة المنقاد العليا. منقادها قوي البنية، احمر اللون، اصفر الطرف. عينها مستديرتان صغيرتان. حدقة عينها ياقوتية اللون. جناحها معتدل القد، ذلق الطرف. قوادمها عريضة. ذنبها مخروطي الشكل، قصير القد، مرتفع الارتكاز. رسغاها حجفتا الصفحة الامامية، سرديتا الصفحة الخلفية. اصابعها كبيرة مفلطحة عادمة الحظاب مخالباها قوية مستغلظة.

ثوبها الى السمرة المتراكبة الالوان. رأسها وعنقها وصدرها الى السمرة السبورية الزرقاء الموج. رداؤها وظهرا وعجزها الى السمرة الزيتية الخضراء الموج. لواحف الجناح والذنب الى الخضار السبوري. قوادم الجناح بيضاء اللون. بطنها الى الريدة تعلوها لطة بيضاء مشوبة. ايطاليا وافنيكها بيض. ساقها فوق مفصل القصبه مطوقة بشريط مستعرض برتقالي اللون. رسغاها واصابعها الى الخضار الزيتي.

الانثى اصغر قدًا من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب.


تألف الغياض والمناقع الظليلة وضايف الأنهر والبحيرات حيث يوجد الاسل وتكثر المقاصب والنباتات الرقيقة. وهي اقدر وارشق على السباحة والغوص منها على العدو. طيرانها قصير الشوط، ثقيل ومترنح.

تتميز بالغيرة والجرأة والاقدام وحب العزلة باستثناء زمن السفاد والحضن والعناية بالفراخ.

قوتها الحشرات المختلفة والديدان والبلاعيط.

مسرحتها يستمر من الفجر الى الشروق ومن الغروب الى فحمة الليل وطوال الليالي القمرية الوضيئة.

تدتن افحوصها بين العوسج والنباتات الشائكة وتبطنه بالحشيش الناعم. الانثى تحضن مرة واحدة في العام من ٤ الى ٦ بيضات يرمية الشكل لونها الى الحنطي الاصفر الموج تعلوه رقشة متباينة الالوان فيها الاحمر والاطحل والاصفر والبي. الترخيم يستمر نحو ٣ اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. تعتبر من الطيور النافعة ولكنها من الطرائد الجيدة الصنف المرغوب فيها.



N.S. Sylvia hortensis, Sylvia borin.
Fr. Fauvette des jardins.
Eng. Garden Warbler.

دُحَلَّة البَسَاتِين

طائر من الدخخل وفصيلة الدخليات. تدعى في مصر «زريقَة البساتين». مصيفها يمتدّ من آسية الغربية الى الشرق الاوسط واروثة. مشتاها يمتدّ من افريقية الشماليّة الى الشرقيّة والجنوبيّة. وهي من الضوارب التي تقيم في لبنان نحو خمسة اشهر.

جسمها صغير القدّ. طولها نحو ١٢ سم. وبسطنها نحو ١٦ سم. منقارها صغير الجرم مدبّب الطرف. جناحها معتدل الانفراج والطول. اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبها مخدوش الطرف اميل الى الاعتدال من الطول يتألف من اثنتي عشرة رقلة.

ثوبها متوسط الزهاء واللمعة. رأسها ومحسراها ورداؤها وظهرها الى الربدة الزيتيّة العابقة تعلوها مسحة صفراء في العجز. علاطا عنقها الى الربدة الباهتة. جناحها وذنبها اعقب لوناً من رأسها وقوادمها. وطرف ذنبها اشدّ سمرة من المناكب والاباهر. زورها وصدرها وبطنها وافنيكها الى الربدة البيضاء المواج تصفرّ بعض الشيء في الصدر وفي الايطلين. عيناها صغيرتان مستديرتان. حدقة عيناها بنية اللون. منقارها حنطيّ اسمر المواج. رسغاها واصابعها الى الزرقة الرصاصيّة.

الانثى كالذكر قدماً وثوباً.

تسرح طوال النهار. طيرانها خفيف الحركة قصير الشوط. مرتعها الاشجار والادغال لكنّها تبتعد عن الاماكن الآهله.


قوتها الحشرات والهوام وبعض الثمار الناضجة اخصّها التين.

تدثّن عشها في الاشجار الفناء. الانثى تبيض مرّة واحدة خلال شهر حزيران من ٥ الى ٦ بيضات لونها الى البياض الحنطيّ المشحة. الحضن يستمر من ١٢ الى ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

تعتبر من العصافير الضوارب المتوسطة النفع.

تدثّن عشها في الاسل وبين القصب فوق سطح الماء. تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام ابتداءً من اواسط نيسان. حضنتها تراوح من ٧ الى ١٠ بيضات لونها الى الشبهة الصفراء تعلوها رقشة جئويّة يخالطها الازرق. الحضن يستمر من ١٤ الى ١٨ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

تعتبر من الطرائد المرغوب فيها.



N.S. Sylvia cinerea, Sylvia communis.
Fr. Fauvette grisette, Grisette.
Eng. Whitethroat.


دُخْلَة شَائِعَة ، جَمَلَانَة

طائر من الدخخل وفصيلة الدخليات. تدعى في مصر «زريقة فيراني» موطنها فسيح الارحاء يمتد من غربي الهند الى الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية والشرقية. وهي من العصافير المبذولة في لبنان.

جسمها صغير القد. طولها نحو ١٥ سم. وبسطنتها نحو ٢٠ سم. منقارها صغير الجرم مدبب الطرف. جناحها معتدل الانفراج والطول. اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبها متوسط القد، مقطوم الطرف يتألف من اثنتي عشرة رفة. ساقها نحيلتان واصابعها كذلك. ثوبها مركب الالوان الجميلة المتداخلة. رأسها الى الصهبة الرمادية. محسراها ورداؤها وظهرا وعجزها وكلاهما وقوادمها وذنبها الى الكهبة الحنطية السمراء. مناكبها واباها موشحة بالصنابي الاحمر. زورها وعنقها الى البياض الاغبر. صدرها وبطنها وافنيكها وابطلاها الى الطحلة الفاتحة يعلوها موج اصفر صنابي يخالطه الوردي. عينها صغيرتان مستديرتان مطوقتان بالاصفر. حدقة عينها عسلية اللون. منقارها ورسغاها واصابعها الى السمرة الحنطية. مخالباها الى الربدة السمراء.

الانثى تتحلّى بثوب الذكر إلا ان الصهبة في رأسها تغطي على الرمادي. تسرح من الفجر الى الغسق. مرتعا الحدائق والغابات والسيجات والمراعي الطبيعية. طيرانها قصير الشوط متماوج الخط المتقطع. تجوالها بين الاشجار سريع ورشيق. انتقالها على الارض سعي نشيط خفيف الحركة. قوتها الحشرات والهوام والعناكب وبعض الثمار العنبية. تدنّ عشها في الادغال والعوسج. لها موسمان في السنة. تحضن في كل مرة من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى الكلسة تعلوها رقشة سمراء تكثر عند العقب. الحضن يستمر نحو ١٢ يوما تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

تعتبر من العصافير النافعة لان اضرارها زهيدة جدا.



N.S. Sylvia garrula, Sylvia curruca.
Fr. Fauvette babilarde, Babilarde.
Eng. Prattling Warbler, Lesser Whitethroat.

دُخْلَة ثُرْتَارَة

طائر من الدخخل وفصيلة الدخليات. تدعى في مصر «زريقة فيراني صغيرة» موطنها الصفيي يشمل معظم بلاد اروبة ويمتد عبر الشرق الاوسط الى ايران وباكستان. موطنها الشتوي يمتد من السودان الى الحبشة واوغندا وكينية وهي من الضوارب التي تقيم في لبنان نحو ستة اشهر.

جسمها صغير القد. طولها نحو ١٣ سم. وبسطنتها نحو ١٧ سم. منقارها صغير الجرم مدبب الطرف. جناحها معتدل الانفراج والطول. اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبها متوسط القد مقطوم الطرف يتألف من اثنتي عشرة رفة.

ثوبها الى الرمكة المتداخلة الماجات. رأسها رمادي اللون. رداؤها وظهرا وجناحها وعجزها الى الرمكة يعلوها موج اصهب حنطي يعقب وتزداد سمرة في مؤخر المحسرين وقوادم الجناح والذنب. زورها وبطنها وافنيكها الى الرمكة الخفيفة البياض الموج تعلوها مسحة صناعية في الصدر والايطلين. عينها صغيرتان مستديرتان. حدقة عينها كستنية اللون. منقارها حنطي اسود الموج. رسغاها واصابعها الى الربدة الرصاصية. مخالباها دقيقة سمراء اللون.

الانثى تتحلّى بثوب الذكر إلا ان لون الرأس ينحرف الى الرمكة الصناعية بدلا من الرمادي. تسرح من الشروق الى الغروب. مرتعا الحدائق والسيجات والادغال والاحراج المبعثرة الاشجار. تتميز بكثرة الصداح تلقية جائمة وطائرة وخائفة ومقاتلة ومتوددة. طيرانها قصير الشوط متماوج الخط. تنتقل بين الاشجار بسرعة ورشاقة وتسير على الارض بخفة ولباقة. قوتها الحشرات الصغيرة والهوام وبعض الثمار السكرية الناضجة.

تدنّ في الشجيرات الفناء والسيجات. لها موسمان في السنة. تحضن في كل مرة من ٤ الى ٥ بيضات عاجية اللون تعلوها رقشة طحلاء زرقاء. الحضن يستمر نحو ١٢ يوما تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

تعتبر من الضوارب المتوسطة النفع.


الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاويح ودراسات القطع العام



N.S. Sylvia orphea.
Fr. Fauvette orphée, Orphée.
Eng. Orphean Warbler.

دُخْلَة غَرِيْدَة ،
قُرْفَنَّة ، كُحَيْجِيْلَة



N.S. Sylvia undata.
Fr. Fauvette pitchou, Pitchou. Eng. Desert Warbler. شَوَالَة ، شَوَالَة

طائر من الدخلة وفصيلة الدخليات. موطنها يشمل معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. وهي من الصوارب المذبذبة التي تقيم في لبنان نحو ستة اشهر او سبعة.

جسمها صغير القد. طولها نحو ١٥ سم. ويسطنتها نحو ١٨ سم. منقارها صغير الجرم، جالس الارتكاز، مدبب الطرف. جناحها معتدل الطول يلحف الزمام الاول من الذنب. اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبها معتدل الطول، مقطوم الطرف يتألف من اثني عشرة رفة.

ثوبها الى الطحلة الرمادية يعلوها موج ازرق يعبق في الرأس والظهر وقوادم الجناح والذنب ويزهو في الرداء والعجز. ثوبها السفلي الى الطحلة الغبراء الحنطية تزهو في الزور والبطن وتعبق في الصدر وتشح ببياض خفيف في الايظلين والافنيك. عينها صغيرتان مستديرتان. حدقة عينها عنائية اللون. منقارها ورسغاها واصابعها الى السمرة الحنطية. مخالبيها دقيقة سمراء اللون. الانثى تتخلى بثوب الذكر الا انها ابهت منه لونا واكثر بياضا في زورها وبطنها.

تسرح من شروق الشمس الى غروبها. تتميز بكثرة التغريد وحسنه. مرتعا لا قياسي لانها تألف المراعي والحقول المزدرعة والحدائق والغابات والاحراج المختلفة واخصها احراج الصنوبر.

قوتها الحشرات والهوام والعناكب والذباب واكثر الثمار العنبية البرية وبعض الثمار الجوية السكرية كالتين.

تدئن عشها في الاشجار الرفيعة الكثيفة الافنان. الانثى وحيدة الموسم تبيض نحو ٥ بيضات لونها الى البياض التني يعلوه تمشيع اغبر وتنقيط اسمر. الحضن يدوم نحو ١٣ يوما تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية والتسلية لانه لا ينقطع عن التغريد بقرىها.

تعتبر من الصوارب التي تفوق منافعها اضرارها.

طائر من الدخلة وفصيلة الدخليات. تدعى في مصر «زريقة شواله». موطنها يمتد من حوض البحر الاحمر الى اروبة الجنوبية والغربية حتى اسبانية ثم افريقية الشمالية. وهي من الصوارب التي تقيم في لبنان نحو سبعة اشهر ثم ترحل نحو بعض مناطق حوض البحر الاحمر. جسمها صغير القد، قصير الجناح، طويل الذنب. قال فيها ابن سيده: «الشواله دخلة كدراء اذا وقفت على شجرة او حجر خطرت بزمكاها خطران الفحل وسميت شواله لانها تشول بذنبها وفي بطنها وسفلتها شيء من حمرة.»

طولها نحو ١٦ سم. ويسطنتها نحو ١٧ سم. ثوبها الى الطحلة الكدراء تعلوها مشحة حنطية تعبق في الرأس والرداء والظهر والجناح وتشند سمرتها في القوادم والذنب. زورها وصدرها وبطنها وافنيكها الى الطحلة الخفيفة يعلوها موج صنابي يعبق في الصدر. عينها مستديرتان صغيرتان. حدقة عينها عنائية اللون. منقارها صغير القد، جالس الارتكاز، مدبب الطرف، حنطي اللون، اسمر الموج. رسغاها واصابعها الى السمرة الحنطية. الانثى تتخلى بثوب الذكر الا انها ابهت منه لونا واقل حمرة في صدرها.

تسرح من شروق الشمس الى غروبها. مرتعا البراري والمواقع الدغلة والاراضي المذحاة التي يكثر فيها وعلى اطرافها العوسج فتتنقل بين قضبانه المتراكبة واشواكه المنعقدة الحادة بخفة لا مثيل لها ورشاقة لا تضاهي.


قوتها الحشرات الصغيرة المختلفة واخصها الذباب والاراق والهوام ثم الثمار العنبية البرية. تدئن عشها في العوسج وفي الادغال على ارتفاع ثلاثة او اربعة اقدام عن سطح الارض. لها ثلاثة مواسم في الحول. تحضن في كل مرة ثلاث بيضات لونها الى الصهبة الحنطية تعلوها رقشة كستنية يكثر تجميعها عند العقب. الحضن يستمر نحو ١٣ يوما تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

تعتبر من العصافير الصوارب النافعة الواجب حمايتها.



N.S. Francolinus vulgaris.
Fr. Francolin vulgaire.
Eng. Common Francolin.

دُرَّاج شَائِع ،
دُرْجُوج شَائِع ، ثَبِت



N.S. Calamoherpe arundinacea,
Acrocephalus scirpaceus.

Fr. Rousserolle effarvate,
Rossignol d'eau.


Eng. Reed-Warbler, Reed-Babbler.

دُخْنَاء ، دُخْنَان ،
أَبُو دُخْنَة ، بُلْبُل المَاء

كنيته أَبُو الحَجَّاج وَأَبُو خَطَّار وَأَبُو ضِبَّة .
طائر من عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات . اعطانه فسيحة الارحاء تمتد من الهند
الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية . كان ولا يزال قليل الوجود في لبنان مرتعه ضفاف مجرى
الليطاني ومجرى نهر ابراهيم .
جسمه متوسط القد قريب الشبه بالحجل ولكنه اطول مقادماً منه وارفح ساقاً . طوله نحو
٣٠ سم . وبسطته نحو ٣٤ سم . رأسه صغير القد . عيناه اهليلجيتان . حدقة عينه ياقوتية .
نوبه متراكب الالوان . قمة رأسه وزوره وجوشنه الى السواد العابق . قفنه منمق بالاسود
والايض . عنقه كستني الطوق . بطنه وجناحاه الى السمرة المؤذرة والمرقطة بالصهبة . مقاده
اطحل اسود . رسغاه واصابعه الى الجؤوة . مخاليه محجّنة حادة الاطراف .
الانثى اصغر قدماً من الذكر وازهى نوباً . يكثر فيها البني الاصفر المواج .
يألف المراعي ومجاري الماء . قوته الاعشاب والحبوب والجذامير يتميز بقوة المقاد الذي
يمكنه من احتفار التربة والوصول الى اراميل النبات .
يدثن في افحوص يحفنه في التربة بين الادغال ويرصعه بالعليل والحشيش الناعم .
انثاه تبيض من ١٢ الى ١٤ بيضة لونها الى الشهبة الصفراء . الحضن يستمر نحو ثلاثة اسابيع
تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الحماية والغذاء .
يعتبر من الطرائد الفاخرة .

عصفور من فصيلة الدخليات . اعطانه تمتد من الشرق الادنى الى جميع مناطق اروبة
المعتدلة الحرارة . وهو مبذول في لبنان يوجد في معظم المناطق باستثناء الجرود العالية .
جسمه صغير القد . طوله نحو ١٥ سم . وبسطته نحو ١٧ سم . رأسه ورداؤه وظهره وعجزه
الى الشهبة الغبراء يعلوها مواج زيتي . محسراه وزوره والقسم الاعلى من صدره الى الشهبة
الحنطية تكتنفها مشحة بيضاء . بطنه والقسم الاسفل من صدره الى الغبرة يعلوها تمشيح احمر
تخالطه حمرة تعقب مع اقترابها من الايطلين . جناحاه وذنبه الى الصهبة الحنطية يخف
اسمرارها مع اقترابها من الاطراف . عيناه مستديرتان مكحلتان . حدقة عينه خرنوبية اللون .
منقاره جالس ودقيق ، حنطي اللون العابق . شدقاه من الداخل ومقدم حلقه برتقالية اللون .
رسغاه واصابعه الى السمرة السبورية ومخالبه كذلك .
الانثى اصغر قدماً من الذكر ونوبها لا يختلف عن نوبه . واليافع كالبالغ الا انه اميل الى
الحمرة من الشهبة .
يألف الآجام والادغال والمناقع والمقاصب وضايف الانهار . يتميز بالحذر والوجل والخفة
والرشاقة وسرعة الهرب والاختفاء . طيرانه قصير الشوط متتابع التصعيد والانخفاض . تغريده
زقزقة لطيفة مستحبة .
قوته الحشرات الصغيرة المختلفة الاجناس والانواع واخصها الذباب والهوام ولا يتمتع
عن بعض الثمار العنبيّة البرية .
يدثن عشه على ارتفاع ٤٠ او ٥٠ سم . عن سطح الارض او الماء في النباتات المنعّية
واخصها الاسل والغزار والقصب . يجمع ثلاث اسلات الى بعضها البعض ويحلك عشه القمعي
الشكل فوق مركز اجتماعها ويبطنه بالصوف والسيبب والرغب . الانثى تحضن مرتان في
العام ، المرّة الاولى في اوائل ايار والمرّة الثانية في اواخر حزيران . حضنتها تراوح من ٤ الى ٥
بيضات لونها الى الغبرة الخضراء المواج تعلوها رقشة سمراء زرقاء . الترخيم يستمر ١٢ يوماً تقوم
به الانثى بمناوبة الذكر . يعتبر من العصافير النافعة الواجب حمايتها .

N.S. *Emberiza melanocephala*,
Passerina melanocephala.
 Fr. Embérize à capuchon,
 Bruant mélanocéphale,
 Passérine mélanocéphale,
 Roi des ortolans, Crocote.
 Eng. Black-headed Bunting.



دُرْسَة سَوْدَاءَ الرَّأْسِ ،
 صُفْرَايَةِ الشَّعِيرِ سَوْدَاءَ الرَّأْسِ

نوع من الدرّس وفصيلة الشرشوريات. يدعى في مصر «بلبل الشعير أسود الرأس». موطنه فسيح الارحاء يمتد من الهند الى اطراف اروبة. يجوب معظم مناطق هذه البلاد طلباً للرزق والمصيف والمشتى. وهو من ضوارب لبنان يقيم فيه بعض الوقت ولكنه لا يدثن في ربوعه. جسمه ربع القامة، منسجم التقاطيع، يطول نحو ١٨ سم. وتبلغ بسطته نحو ٢٢ سم. ثوبه الى الصفرة تعلوها الوان ثانوية تعبقها او تبهتها. رأسه اسود، قفنه وردائه وظهره وعجزه الى الكستني الاحمر الموج. جناحاه الى البني الاحمر العابق يبهت ويغبر عند الاطراف. ذنبه الى البني الفاتح تلحفه ماجة كستنية. صدره وبطنه وايطلاه وافنيكه الى الصفار الباهت يعلوه في الصدر فقط موج كستني لامع. عيناه مطوّقتان بالاصفر. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره مخروطي الشكل، مستغلظ الجرم، حنطي اللون، اسمر الموج. رسغاه الى السمرة الحنطية يعلوها موج اصفر.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وادكن ثوباً منه. رأسها رمادي اللون. رداؤها وجميع الاجزاء العلوية حتى الذنب الى الصفرة الرمضاء يعلوها موج بني. جناحها مجدعان بالكستني الباهت. صدرها الى الصفار الكبريتي تعلوه مسحة بيبة خفيفة. بطنها وايطلاها وافنيكها الى الصفار الاغبر الفاتح.

يألف السهول والهضاب والجبال والحدائق وكروم العنب. يتميز بالحذر وبخفة الانتقال وسرعة الطيران وقصر قاب الشوط والتردد قبل الوقوع. تغريده زرقعة لطيفة لكنها لا تجاري زرقعة الارطلان.


يدثن عشه في الادغال والسيجات على ارتفاع ذراع عن سطح الارض. الانثى تحضن مرة واحدة في العام وقد يتم ذلك في خلال شهر حزيران. حضنتها تراوح من ٥ الى ٧ بيضات ترخمها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً. البيض اغبر اللون تعلوه مشحة خضراء زرقاء ورقشة كهباء. قوته الحشرات المختلفة والاساريع والديدان والبرور البرية.

يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى.

N.S. *Emberiza cineracea*.

Fr. Bruant cendré, Bruant de Syrie,
 Bruant de Perse.

Eng. Cinereous Bunting.



دُرْسَة رَمْدَاءَ ،
 صُفْرَايَةِ الشَّعِيرِ السُّورِيَّةِ


نوع من الدرّس ينتمي الى فصيلة الشرشوريات. يدعى في مصر «بلبل الشعير الشامي» اعطانه بلاد الشرق الادنى واخصها ايران وسورية ولبنان.

جسمه منسجم التقاطيع، ممشوق القد. طوله نحو ١٧ سم. وبسطته نحو ٢٠ سم. ثوبه الى الصفار الارمد الموج. رأسه وعنقه الى الصفرة الخضراء تعلوها مشحة بيبة تكتنف اواسط الريش. رداؤه وظهره وعجزه الى الخضار الاصفر الحنطي الموج. جناحاه الى الربدة الطحلاء الحنطية. ذنبه الى الخضار الاسمر يحوقه وشم ابيض. زوره وصدره وبطنه وايطلاه الى الصفار الارمد يعلوه في الصدر تريقط اسمر. عيناه مطوّقتان بالاصفر. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره مخروطي الشكل، قصير القد، اسمر اللون. رسغاه الى السمرة الحنطية. مخالبه صغيرة دقيقة رمضاء اللون.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وادكن ثوباً منه. رأسها الى الربدة، زورها الى السمرة الصفراء الموج.

يألف السهول والجبال والادغال والمراعي والحدائق والرياض. يتميز بالحذر والوجل وبخفة الانتقال وسرعة الطيران وقصر قاب الشوط وانحراف الخط ميمنة ومبسرة. تغريده زرقعة لا حسن فيها ولا توقع.

قوته الحشرات المختلفة واسارعها وبقاناتها والديدان والبرور البرية. يدثن عشه في الادغال والسيجات على ارتفاع ٤٠ او ٦٠ سم. عن سطح الارض. الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام. حضنتها نحو ٤ بيضات ترخمها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً. بيضها عاجي اللون تعلوه رقشة مبعثرة سمراء، يكثر تجميعها عند العقب. يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى.



N.S. Pyrrhula vulgaris.
Fr. Bouvreuil commun. Eng. Common Bullfinch. دَغْنَاش مَبْدُول، أَبُو بَرَأَش.

طائر غرّيد من فصيلة الشرشوريات. اعطانه تمتد من الهند الى الشرق الادنى واروية. يقيم في لبنان نحو ستة اشهر من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول. جسمه ربع القامة، مليء الرأس والصدر. طوله نحو ١٦ سم. وبسطته نحو ٢٠ سم. رأسه مكور مستغلظ. عيناه كبيرتان، مستديرتان، جاحظتان. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده مخروطي الشكل، ضليع البنية، قصير القد، محدب التركيب، مدبب الملقط. جناحه مستعرض القاعدة، ذلق الطرف. ذنبه متوسط الطول. رسغاه واصابعه قصيرة. مخالفه قوية، معتدلة التحجيز.

ثوبه يختلف باختلاف الشق وهو متداخل الالوان الزاهية قال فيه الشاعر: «كأبي براقش كل لون لونه يتخيل».

الذكر اكبر قدماً من الانثى. رأسه ومحسراه ورداؤه وذنبه الى السواد القاتم يعلوه موج بنفسجي. جناحاه الى السواد اللامع يعلوهما تجذيع معترض ابيض. ظهره رمادي اللون، ازرق الموج. عجزه ابيض اغبر. صدره وبطنه الى الجؤوة الزاهية. مؤخر بطنه وافنيكه الى البياض. ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر الا بقلة الزهاء والرونق وباحلال الشهية الحمراء في الصدر والبطن بدلاً من الجؤوة الزاهية.

يألف الاحراج المختلفة الاشجار ولا يقرب الحدائق والجنانن الا عند الحاجة الماسة الى الغذاء. وهو من العصافير الشاجرة التي تقضي معظم اوقاتها بالانتقال من شجرة الى شجرة ومن غصن الى غصن، الذكر برفقة اناثه، منذ زمن التساقد في اوائل ايار الى أواخر ايلول. وهو لا يحط على الارض وان حط فسعيه أخرق عادم الخفة.

يعتبر من العصافير الغريزة التي تألف القفص وحياة الاسر وقد يساقد بعض عصافير فصيلته اخصها النعار والنغر.

قوته الحشرات والديدان والدعاميص والنحل وبعض الثمار العينية البرية والبراعم والنوامي ان دعت الحاجة.



N.S. Emberiza citrinella.
Fr. Bruant jaune, Verdrière.
Eng. Yellow Hammer, Yellow Bunting.

دُرْسَه صَفْرَاء،
صُفْرَايَة الشَّعِير، صَفْنَج

نوع من الدرس ينتمي الى فصيلة الشرشوريات. موطنه حوض البحر الابيض المتوسط. اعطانه اللبناية تشمل جميع مناطق البلاد يجوبها صيفاً وشتاءً.

جسمه ممشوق حسن الهندام. طوله نحو ١٧ سم. وبسطته نحو ٢٠ سم. ثوبه الى الصفرة الخضراء الموج. رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى الصفرة المرقوشة بالحنطي. رداؤه وظهره وعجزه وجناحاه وذنبه الى الصهبة الصنابية الموشحة بالاسمر الحنطي. ذنبه متوسط الطول، فارق الطرف. ابطاه موشحان بالجووي. عيناه مطوقتان. حدقة عينه عسليّة اللون. منقاره مخروطي الشكل، قصير القد، سبوري اللون، ازرق الموج. رسغاه الى الصفرة الوردية.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وابته ثوباً منه واقل تزويقاً.

يألف الادغال والكروم والحدائق والسيجات والسهول والجبال. يتميز بقلة الحذر وبعدم الوجل وبخفة الحركة والانتقال وبسرعة الطيران والجثوم وبقصر الشوط وكثرة التعاريج والتموجات. تغريده زقزة مملّة قليلة الانغام يرسلها ويرددها حينما يطيب له وفي كل مناسبة. قوته الحشرات والاساريع والديدان والبزور البرية.

يدثر في افحوص على الارض او في عش يقيمه على بعض النباتات الدغلة الكثيفة الافناد والافنان على ارتفاع قليل عن سطح الارض. عشه بالغ التعجير جيد الحبك يبطنه بالقش الناعم والسبيب والزغب. الانثى تحضن ثلاث مرات في العام. حضنتها تراوح من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى الغبرة الباهتة او الصهبة تعلوها رقشة حنطية او سمراء وخطوط متعرجة نحيلة كالنواس. الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى.

N.S. Columba cenas.
Fr. Colombe colombin.
Eng. Stock Dove.



دلم

الواحدة دلمة. نوع من الحمام البري يدعى في مصر «ورقاء». موطنه حوض البحر الابيض المتوسط يجوب اصقاعه طلباً للرزق والمصيف والمشتى. يعتبر من ضواري لبنان لانه يعرج على بعض مناطق سهل البقاع في اوقات مختلفة غير انه لا يمكث في كل مرة الا قليلاً من الوقت. جسمه متوسط القد. طوله نحو ٣٥ سم. وبسطته نحو ٤٧ سم. ثوبه الريعي متراكب اللون. رأسه حتى القفص الى الرمادي الازرق يعلوه موج اسفع. عنقه قصيرة القد، خضراء اللون، زرقاء الموج. رداؤه وظهره الى البني الاطحل تعلوه مشحة صناعية. جناحه الى الرمادي الازرق تعلوه بعض الخطوط السود وهو مستطيل الشكل ذلق الطرف. قوادمه احدى عشرة، اطولها الاولى. عجزه الى الزرق الطحلاء الباهتة. ذنبه متوسط القد، مقطوم الطرف، يشتمل على اثنتي عشرة رفة؛ لونه الى الرمادي الازرق يعبق ويسود عند الطرف. زوره الى الطحلة الزرقاء. صدره الى الجؤزة الباهتة. ابطلاه الى الخضار البنفسجي. بطنه الى الكهبة يعلوها موج صناعي تتخلله بعض الزرقه. عيناه كبيرتان. حدقة عينه خمريّة عابقة. منقاده متوسط القد، جالس الشكل، احمر القاعدة والجسم، اصفر اللواقط والطرف. ساقه عرياطة، حمراء اللون، رباعية الاصابع المعتدلة الطول. رسغه حقيقيّة الصفحة الامامية، سرديّة الخلفيّة. مخالفه قويّة قصيرة معتدلة الاحديداب.

ثوبه الخريفي ابهت لوناً واقلّ سفةً واكثر اخضراراً في العنق. الانثى اصغر قدماً من الذكر وتتخلّى بذات الثوب الا انه ادكن ماجة واقلّ زهاءً. واليافع كالبالغ.

يألف الهضاب والاحراج القريبة من الحقول الزراعية. يعيشان ذكراً وانثى لا يفرقهما سوى الموت. سربه متوسط العدد يراوح من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً. طيرانه في مرتبه مجموعة من الاشكال المختلفة فيها السفيف والحوم والتحليق والتصعيد والتهييط. طيرانه في انتقاله من منطقة الى منطقة سريع الحركة، بعيد الشوط. انتقاله على الارض حميد الخفة والرشاقة.

يدئن في الاشجار الباسقة الكثيفة الافنان. عشّه قدحي الشكل، جيد الحبك المناسب، يغلفه بالقش الناعم والحزاز ويبطنه بالطحلب والصوف والسيب. الانثى تضع في القسم الاول من ايار من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى الخضار الباهت تعلوه رقشة سمراء داكنة يكثر تجميعها عند العقب. الترخيم يستمرّ نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء والحماية. يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى.



N.S. Passer montanus.
Fr. Moineau friquet, Friquet.
Eng. Tree-Sparrow.

دُورِي البِيَادِر ،
دُورِي جَنَلِي

نوع من عصافير الدوري ينتمي الى فصيلة التوطيات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير. موطنه الشرق الاوسط وبعض الاقطار الاروبية وافريقية الشمالية. وهو من اوابد لبنان الكثيرة الوجود في جميع المناطق باستثناء الجرود العالية.

جسمه صغير القد، ربع القامة، طوله نحو ١٣ سم. وبسطته نحو ١٥ سم. رأسه الى الجؤوة السمراء. محسراه الى البياض الاغبر تتوسطهما بقجة كستنية. عنقه ابيض اليمينه والميسرة. رداؤه وظهره الى السمرة الكستنية تعلوها رقشة سوداء. عجزه الى الشقحة العابقة. جناحاه الى الجؤوة الحنطية المواج يعلوها توشيم عابق السمرة وتجذيع ابيض يعترض اطراف الكلي والاباهر. ذنبه الى الكهبة السمراء وهو متوسط القد، فارق الطرف. زوره اسود القلادة القلبية الشكل. صدره وبطنه الى الربيذة الصفراء المواج تخف مع ابتعادها عن الصدر باتجاه الخوش والزمكى. عينه صغيرة مطوقة بالجووي الاسمر. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره مخروطي الشكل، قصير القد عابق السمرة. ساقه نحيلة حنطية اللون واصابعه كذلك. يألف المراعي والسياجات والحقول والاشجار المنفردة. وهو حاشر حابب يقتنص مختلف انواع الحشرات من الذباب والفراس الى الجنادب والديدان. ويلتهم اكثر انواع الحبوب والبرور من الحقول ومن البيادر.

يدتن عشه في تجاويف الاشجار القريبة من مجاري الماء او في صدوع الصخور. عشه قدحي الشكل. جيد الحبك، ينسجه بالقش الناعم وببطنه بالطحلب والزغب والصفوف. الانثى تبيض من مرتين الى ثلاث مرات بالسنة على النمط التالي. تضع في المرة الاولى من ٥ الى ٦ بيضات وفي المرة الثانية من ٤ الى ٥ بيضات وفي المرة الثالثة من ٣ الى ٤ بيضات. الحضن يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. البيض يكون غالباً اغبر اللون تعلوه نمشة حنطية لا قياسية التنقيط والتجميع.

يعتبر من العصافير المتوسطة النفع لان ما يلتهمه من حشرات يوازي ما يتلفه من حبوب وثمار.

قوته بزور النجيليات والقربيات البرية والزراعية وبزور القنب المعروفة بالقنيز. يدتن عشه في تجاويف الاشجار ونخاريبيها. الانثى تبيض وتحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام. ولا تحضن في كل مرة اكثر من بيضتين لونهما الى البياض العاجي تعلوه نمشة زرقاء لا متساوية التوزيع. الحضن يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. يعتبر من الطيور القليلة النفع والاذى.



دُورِيَّ البَيْوتِ ، دُورِيَّ مَبْدُول

نوع من الدوري وفصيلة التوتويات. كان موطنه العالم القديم حتى عام ١٨٥٠ حيث ادخل الى امريكا الشمالية ثم الجنوبية ثم الى استراليا فاصبح الطائر العكاظي الاول، اعطانه اللبناية تشمل جميع اقاليم البلاد باستثناء الجرد العالية.

جسمه ربع القامة، طوله نحو ١٥ سم. وبسطه نحو ١٧ سم. رأسه رمادي اللون، ازرق الموج. قفنه والمنطقة الممتدة من العين الى القفن وراؤه وظهره الى السمرة الكستنية الموشمة بالاسود. عنقه مطوق بقلادة مستعرضة بيضاء اللون تنتهي قرب القفن ويعلوها في وسطها ابتداءً من قاعدة المنقار جدة سوداء تنتهي عند اوتل الصدر. زوره واعلى صدره الى الربدة السمراء السوداء الموج. القسم الباقي من صدره مع بطنه وافنيكه وعجزه الى الرمادي الاغبر. جناحه كستني اللون يعلوه تمشيح اسمر وتعرضه جدة بيضاء تكتنف ريش الاباهر. ذنبه متوسط الطول، اسمر اللون. حدقة عينه كستنية. مقاره مخروطي الشكل قصير القد اسمر اللون. ساقه واصابعه الى السمرة الحنطية الحمراء والمواج. هذا هو ثوبه الصيفي اما ثوبه الشتوي فالى الربدة ويقل فيه التمشيح.


اما الانثى فرأسها الى البني الاربد المواج. رداؤها وظهرها الى الربدة الحمراء. جناحها الى البني يعلوه تجذيع معترض اصفر وبقعة بيضاء تتمركز في الحفة الخارجية بمستوى الاباهر. محسراها وزورها وصدرها وبطنها الى الشهية الغبراء. عينها مكحلان بالاسمر يعلوها خط اصفر. اما اليافع من اي شق كان فثوبه ثوب الانثى.

يألف الحقول والسهول والحدائق والجنائن وجميع الاماكن القريبة من العمران ويعيش في المدن والداساكر والقرى ولكنه ينفر من الاحراج والغابات. وهو رشيق الحركة، خفيف الطيران، قصير الشوط المتقطع، سريع التنقل على الارض وعلى الاغصان. لا يخشى الانسان ولكنه شديد الحذر.

وهو حاشر حابب يقتنص مختلف انواع الحشرات من الفراش الى الجنادب والقبايظ والديدان ويلتهم اكثر انواع الحبوب والبرور وبعض الثمار واخصها الكرز.

N.S. Passer domesticus.
Fr. Moineau commun, Moineau domestique, Pierrot.
Eng. House-Sparrow.

يدثن عشه في تجاويف الاشجار وفي صدوع الصخور وتحت سقف البيوت وفي الاشجار الظليلة القريبة من العمران. عشه في الشجرة كروي الشكل مدخله فتحة جانبية علوية. عشه تحت سقف البيوت وفي تجاويف الاشجار وصدوع الصخور قدحي الشكل، عادم الغطاء. الانثى تبيض ثلاث مرات في السنة. بيضها اغبر اللون او ازرق باهت تعلوه رقشة سمراء او بيضاء. الحضن يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. يعتبر من العصافير المتوسطة النفع لان الحشرات التي يلتهمها تكاد توازي الاضرار التي يلحقها بالحبوب والبرور والثمار.



N.S. Motacilla flava, Budytes flava.
Fr. Bergeronnette printanière.
Eng. Blue-headed Wagtail.


ذُعْرَة الرِّبِيع ،
فَتَّاح ، فَتَّاح ، قُوَيْع

نوع من الذعرة وهي طائر حاشر من فصيلة الذعريّات. تدعى في مصر «ابو فصادة ازرق الرأس» موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشماليّة والشرقيّة تجوب بعض اصقاعها كل عام طلباً للمصيف والمشتى. وهي من الضوارب التي تقيم في لبنان نحو سبعة اشهر ومنهم من يقول انها من اوابد لبنان لانهم شاهدوا بعضها على السواحل خلال شهر كانون الاول.

جسمها صغير القد، مشقوق رشيق. طولها نحو ١٧ سم. وبسطتها نحو ١٩ سم. ثوبها متراكب الالوان. رأسها الى الرمادي الازرق الموج. رداؤها وظهرها وعجزها الى الصفرة الخضراء. جناحها الى الربرة الكستنيّة تعلوها سرنجة صفراء مصدرها اطراف الريش البنية الصفراء الموج. ذنبها مستطيل الشكل، مستدير الطرف، عابق اللون الكستني الاسمر، ابيض الحثار الخارجي. محسراها الى الكهبة الزرقاء يعلوها خط ابيض يمتد، فوق العين، من قاعدة المقار الى مستوى القفن. زورها وصدورها وبطنها وابطلاها وافنيكها الى الصفار الكبريتي. عيناها كبيرتان مكحلّتان. حدقة عينها كستنيّة اللون. مقارها دقيق الجرم، جالس الارتكاز، اسود اللون، حنطيّ الموج. رسغاها واصابعها الى القرقة السمر. مخالباها نجيلة سمر. الانثى ابهت ثوباً من الذكر واقلّ صفرة منه ورأسها ينحرف الى الرماديّ البنيّ بدلاً من الرمادي الازرق. اليافع يتحلّى بثوب الانثى.

تأوي الى الاماكن الرطبة وتألف المراعي والاراضي المزدرعة وضايف مجاري الماء. تسرح من الشروق الى الغروب. طيرانها تحليق يكثر فيه الحوم واقواس متبانية القاب والاتساع. انتقالها على الارض يميّز برشاقة الحركة وبخفة العدو والضرب بالرأس والذنب إثر كل خطوة تخطوها.

قوتها الحشرات والذباب والهوام والبرقات والديدان، تقتنصها طائرة وجائمة وتحت الجثالة.



N.S. Passer petronia,
Petronia petronia.
Fr. Moineau soulcie,
Soulcie des rochers,
Moineau des bois.
Eng. Hedge-Sparrow.

نُورِي الغَاب ، بُلْقُط ، بُلْقُط

نوع من الدوري وفصيلة التنوطيات. موطنه الشرق الاقصى والادنى واروبّة الجنوبيّة والغربيّة وافريقية الشماليّة. وهو من ضوارب لبنان التي تقيم فيه من الربيع الى الخريف. جسمه ربع القامة. طوله نحو ١٥ سم. وبسطته نحو ١٧ سم. ثوبه الى الرمادي الكهب الاسمر. رأسه موشح بخطين جانبيين لونهما الى السمرة العابقة. ظهره مخطّط بالاسود. زوره اصفر كبريتي. صدره وبطنه الى الكهبة الغبراء. اطراف قوادمه مبقّجة بالابيض. حدقة عينه كستنيّة اللون. مقاره حنطيّ اسمر. ساقه واصابعه الى الصفار الحنطيّ.

ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر الا بتمشيح الظهر الذي يخفّ فيه الاسود وبصفار الزور الذي ينحرف الى الحنطي. وثوب اليافع كثوب الانثى.

يألف الاحراج والغابات ومجاري الماء والحقول الزراعيّة. يفضّل مناطق الوسط والجروود. يعيش اسراباً صغيرة قليلة العدد تنتقل طوال النهار من مكان الى مكان. طيرانه متوسط السرعة. قصر الشوط المتقطع، يكثر فيه السيف وينعدم فيه التحليق. اخلاقه اخلاق الدوري المبدول ولكنه اشدّ حذرًا منه واخفّ حركة واقلّ اذى من الوجهة الزراعيّة.

قوته لا يختلف عن قوت سائر انواع الدوري ولكنه يرتكز في الربيع والصف على الحشرات وفي الخريف والشتاء مع الحبوب والبرور.

يدنّ عشّه في صدوع الصخور وفي تجاويف الاشجار. انثاه لا تبيض في لبنان اكثر من مرتين، الاولى في اواسط ايار والثانية في اواخر حزيران. يبيضها اغبر اللون تعلوه رقشة بيّنة لا قياسيّة التجميع. الحضن يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

يعتبر كغيره من الدوري، عصفور متوسط النفع لا يتطلّب الحماية ولا يستوجب السخط والعقاب.



N.S. Motacilla alba, Budytes alba.

Fr. Bergeronnette grise,
Hochequeue grise, Lavandière grise.

Eng. White Wagtail.

ذُعْرَة بَلْقَاء ،

أُم سَكَمَك ، أُم عَجَلَان

نوع من الذعرة وهي طائر حاشر من فصيلة الذعريات. تدعى في مصر «ابو فصادة ابيض». موطنها يشمل معظم الاقطار الاسيوية والشرق الاوسط واروبية وافريقية الشرقية والشمالية. وهي من قواطع معظم هذه البلاد ومن اوابد بعضها ومنها لبنان.

جسمها صغير القد ممشوق رشيق. طولها نحو ١٩ سم. وبسطتها نحو ٢٢ سم. ثوبها ابلق مستحب. رأسها وعنقها الى اواسط علاطيتها وزورها واعلى صدرها الى السواد الخملي. رداؤها وظهرها وعجزها الى الطحلة الرمداء. جبهتها ومحسراها وسائر صدرها وبطنها وايطلاها وافنيكها الى البياض الجميل تملوه مسحة غبراء عند حدود الرداء وبين طوق العنق ودرج النحر. جناحها الى السمرة السوداء تكتنفها سرنجة بيضاء تتناول جوانب اطراف المناكب والاباهر والكلى. ذنبها مستطيل القد، مقطوم الطرف، اسود اللون، ابيض حواشي الرفال الوحشية. عيناها كبيرتان مكحلتان. حدقة عينها الى البني الاسمر. منقارها دقيق الجرم، جالس الارتكاز، اسود اللون، اطحل الموج. رسغاها واصابعها الى السمرة الفحمية، مخالباها دقيقة سوداء.


الانثى ابهت ثوباً من الذكر واقل سواداً منه وزورها ابيض وتحمل في اعالي صدرها هلال اسود. اليافع كالبالغ الا انه اكهب الرداء والظهر والعجز، اشهب المحسر.

تألف الحقول المزروعة والمراعي والمروج والمناقع وضاغف مجاري الماء. تسرح من الشروق الى الغروب. طيرانها سفيف متوسط الشوط. متماوج الخط المتقطع المتتابع. وهي كثيرة الحركة تنتقل على الارض بسرعة وتعدو بخفة ورشاقة وتضرب برأسها دون ان تشيل بذنبها عند كل خطوة تخطوها.

قوتها الحشرات ويرقاتها والذباب والهوام تقتنصها طائرة وجائمة وتفتش عنها تحت الجثالة وبين اعشاب المناقع وطحالب مجاري الماء.

تدئن عشها في صدوع الصخور واوكافها وفي فلولج الحيطان وفي تجاويف الاشجار وشقوقها. الانثى تحضن مرتين في الحول المرة الاولى في اواسط نيسان وقدرها من ٦ الى ٨

تدئن عشها في مغيل من العشب او في دغلة كثيفة او في اوكاف الصخور وصدوعها او في فلولج الحيطان. الانثى تحضن مرتين في العام، الاولى في اواخر نيسان وقدرها من ٦ الى ٨ بيضات والثانية في اواخر حزيران وقدرها من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الشبهة الصفراء تعلوها نمشة سمراء يخالطها وشم اسود. الحضن يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية. تعتبر من العصافير الضواري الجزيلة النفع الجديرة بالحماية.



N.S. Hypolais olivetorum.

Fr. Hypolais des oliviers. Eng. Olive-tree Warbler.

ذُعْلُوقَةُ الزَّيْتُونِ ،
خَنْشَعُ الزَّيْتُونِ

طائر من الذعاليق اي الخناشع ينتمي الى فصيلة الشحروريّات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الجنوبيّة والغربيّة يجوب بعض اصقاعها ويأبد في البعض الآخر . وهو من ضوارب لبنان التي تقيم في ربوعه وقتاً طويلاً .

جسمه صغير القدّ ، طوله يراوح من ١٣ الى ١٤ سم . وبسطه من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوبه منسجم الالوان القليلة التباين . رأسه ورداؤه وظهره وعجزه الى الطحلة الخضراء الفستقيّة المواج . جناحاه وذنبه وافنيكه الى السمرة الحنطيّة . صدره وبطنه وايطلاه الى الصفار الكبريتيّ الباهت يعبق بعض الشيء في الصدر ويبيض قليلاً في الايظلين . جناحه معتدل الطول والعرض ، مدبّب الطرف . اطول قوادمه الرابعة . عيناه صغيرتان مستديرتان . حدقة عينه عنائيّة اللون . منقاده متوسط القدّ ، حنطيّ اللون ، اسمر المواج . مستعرض القاعدة ، مستقيم الطرف . ساقه قويّة . اصابعه دقيقة . مخالبه محجّنة مستطيلة . ساقاه واصابعه الى الربرة السمرء تعلوها ماجة زرقاء .

يألف الزواتين والهضاب المبعثرة الاشجار . يعتبر من العصافير الشاجرة لانه يقضي معظم اوقاته بالانتقال من شجرة الى شجرة ومن غصن الى غصن . طيرانه سريع الحركة ، قصير الشوط ، عنيف الانعطاف ، كثير التصعيد والتنزيل . عدوه على الارض وثب وطفرة . وهو شديد الحذر والوجل ، كثير المرح ، قريب الغضب ، نشيط في الدفاع عن قطاعه ضدّ غارات بنات جنسه .

قوته الحشرات المبحّنة وخصّصها ذوات الجناحين ومنها الذباب والذناير والتعر على اختلاف اجناسها وانواعها .

يدنّ عشّه في الادغال الكثيفة والشجيرات الفناء . عشّه قدحيّ الشكل يجبكه بالقش الناعم والعصف والجذور الدقيقة النحيلة ويطنه بالزغب والصوف والسيب . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى الحمرة الليلكيّة الباهتة تعلوها رقشة سمرء خفيفة . الحضن يستمرّ نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .


بيضات . والثانية في اواسط حزيران وقدرها من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى البياض الاغبر تعلوه مشحة زرقاء باهتة ورقشة جوويّة . الحضن يستمرّ من ١٣ الى ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء والحماية .

تعتبر من العصافير الجزيلة النفع الجديرة بالحماية .

N.S. Percnopterus,
Percnopterus stercorarius.

Fr. Percnoptère, Alimoche,
Vautour d'Égypte,
Poule des Pharaons.

Eng. Egyptian Vulture, Pharaoh's Hen.



رَحْمَةٌ ، شُوْحَةٌ

طائر من الكواسر وحيد الجنس والنوع ينتمي الى فصيلة النسريات. تدعى في مصر «رَحْمَةٌ مصرية». كنيته أم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كبير. الذكر يدعى يرخومًا. وهي قريبة الشبه بالنسر وتعتبر اصغر النسور قَدًا واوسعها انتشارًا. موطنها اكثر بلاد القارة الافريقية ومعظم المناطق المجاورة للبحر الابيض المتوسط وتنتشر شرقًا حتى التركستان والهند. وهي من ضواري لبنان لكنّها قليلة العدد.

جسمها كبير القدّ، طولها نحو ٦٠ سم. وبسطنها نحو ١٦٠ سم. ثوبها اغبر ابلق. سقطها كبير القدّ يلحف الذنب ويتجاوزه. لواحفه الى الكهبة تعبق وتدكن عند قواعد الريش وتبهت عند الاطراف، قوادمه سود، مناكبه رصاصيّة، اباهره طحل.

رأسها اصلع، قفنها ازغب الريش المستطيل. عنقها اغفر اصفر. عيناها الى الحمرة القرمزيّة. منسرها جالس الجسم، مستطيل الشكل، اربد اللون، احمر الموج، كبير البهرة المتوسّطة الانعفاف الزرقاء اللون السوداء الموج. رسفاها الى الورديّ تعلوه ماجة رمداء. اصابها كبيرة. مخالبا متوسّطة الانعفاف سوداء اللون.

الانثى اكبر قدًا من الذكر الآ انها تتحلّى بذات الثوب. اليافع، حتى ست سنوات، بني الثوب، اصفر الموج.

تألّف الجبال والمواقع النائية. قوتها الجيف والقمامة ولا تصيد القواضم والعصافير الآ عند الجوع.

تدثّن وكرها في صدوع الصخور الناتئة الموحشة. الانثى تبيض ثلاث رفنات لونها الى البياض الأغر تعلوه بقع حمر بنفسجيّة. الحضن يستمرّ نحو ٣٠ يومًا تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء.

تعتبر من الكواسر المفيدة النافعة.

وهو من العصافير التي لا تألف القفص لانه شديد الانفعال بمينخ البيئة الموضعيّة، سريع العطب.
يعتبر من العصافير الجزيلة النفع الواجب حمايتها.



N.S. Sturnus vulgaris.
Fr. Étourneau vulgaire,
Étourneau commun,
Étourneau sansonnet, Sansonnet.
Eng. Starling.

زُرُور مَأْلُوف

طائر من الزرازير يدعى في مصر «خليش». وهو من القواطع يجوب الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشماليه. تحط اسرابه، عند عودتها الى مصر والسودان، في الربوع اللبانية بعض الايام.

جسمه متوسط القد. طوله نحو ٢٣ سم. وبسطه نحو ٢٩ سم. ثوبه الربيعي الى السواد اللامع يعلوه موج ازرق واخضر ورقشة بيضاء شقراء يختلف حجمها بين الظهر والصدر والبطن. اما الرداء والايطلان والعجز فيعلوها بريق ارجواني. عيناه كبيرتان مستديرتان كستينيتان. منقاده مخروطي الشكل، دقيق الطرف، حنطي اللون، يعادل طوله طول الرأس. جناحه مستطيل الشكل عشاري القوادم اصغرهما الاولى واطولها الثالثة. ذنبه قصير القد، مقطوم الطرف، يتألف من اثني عشرة رفة. ساقاه معتدلتا الطول. اصابه قويه لونها الى السمرة الحنطيه العابقه.

ثوبه الشتوي اكثر بياضاً وشقرة في اطراف الريش ولون المنقاد ينحرف الى الحنطي الاسمر العابق.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وتحتل بذات الثوب اما منقارها فيبقى على اللون الحنطي صيفاً وشتاءً.

يسرح من الفجر الى الغروب ويعيش اسراباً تنفرد ازواجها في زمن التسافد والحضن ولكنها لا تنزل عن رفاقها. وهو شديد النشاط. قوي الطيران. لا يستكن طوال النهار. وعندما يتنقل على الارض يعدو بسرعة ولكن بدون خفة ولياقة.

قوته الحشرات والديدان والحلزونات والحبوب والثمار العنبيّة.

يدئن عشه في تجاويف الاشجار وفي صدوع الجدران والصخور. الانثى تحضن مرتين في العام، الاولى في اواخر نيسان والثانية في اواخر حزيران. حضنتها تراوح من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى الزرقة الخفيفة الباهتة. الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية. الفراخ تهجر العش بعد التفقيس بثلاثة اسابيع.

يعتبر من الطيور النافعة لانه يلتهم سنويًا الوف الحشرات.



N.S. Corvus corone.
Fr. Corneille, Corbeau-Corneille. Eng. Carrion Crow.


زَاغ

طائر من الغربان وفصيلة الغرابيات. اعطانه شاسعة الاطراف تشمل معظم المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. وهو من اوابد لبنان ومعظم بلاد الشرق الاوسط.

جسمه متوسط القد طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه نحو ٦٥ سم. ثوبه الى السواد الاسفع البنفسجي الموج يزداد لمعة في قمة الرأس وفي الجناح. جناحه متوسط الطول ذلق الشكل. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده كبير القد، حاد الطرف، اسود اللون. ساقاه واصابعه سود. الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها تحتل بذات الثوب.

يألف المراعي والحقول المزروعة ومجاري الماء والمواقع الرطبة حيث تكثر اشجار الحور التي يرقد على اغصانها العالية في الليل. طيرانه تحليق وحم وسيف. شوطه متوسط القاب متعاقب التجديف والسكون. يحط على الارض كالصفور لأنه لا ينقض عمودياً كما تفعل الكواسر. قوته الحشرات والديدان والفأر والعكابر والزحافات والاسماك والقشريات التي يلفظها البحر وجلايط العصافير والحبوب واليزور والبذار الناتش والثمار. يباشر الصيد مع شروق الشمس وينقطع عنه قرب الظهر ثم يعود اليه حتى الغروب.

يدئن عشه في الاشجار الرفيعة اخصها الحور. انثاه تضع في اواخر نيسان من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الزرقة الخضراء يعلوها توشيم اسمر. الحضن يستمر نحو ١٩ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. والذكر والانثى يؤمنان معاً رعاية الفراخ نحو خمسة اسابيع. يعتبر من الطيور الضارة لانه كثير الاذى.



N.S. Cursorius cursor,
Cursorius isabellinus. ZI
Fr. Courvite isabelle,
Courvite gaulois.
Eng. Cream-coloured Courser.

زُغْرُغُ أَعْبَسُ ،
جَلِيلُ أَعْبَسُ ، خَيْالُ الْبَادِيَةِ الْأَعْبَسُ


طائر من الزغزغ ينتمي الى فصيلة الرقراقيات. يدعى في مصر «كروان جبلي». اعطانه تمتد من صحاري الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والشمالية. وهو من الصوارب التي تجوب الفيافي طلباً للرزق. المناطق التي يرتادها في لبنان محصورة بسهلي البقاع وعكار.

جسمه متوسط القدّ، طوله نحو ٢٥ سم. وبسطه نحو ٣٨ سم. ثوبه اغبس اللون. رأسه ازرق المواج. عيناه صغيرتان مكحلّتان بالاسود الذي يمتد كالخطّ المحدودب من الشدق الى القفن. حدقة عينه عسليّة اللون. منقاده اسمر قائم، متوسط الطول، لا يخلو من بعض الاحديداب. جناحاه مديّبان لاحقان. قوادمه وابهاره حنطيّة الرقشة. كلاه صفر الاطراف، حمر الماجة. ذنبه قصير القدّ، رفاله مرقوشة بالاسود والابيض. قصبه فخذة عرياطة لونها الى الزرقة البحرية. ساقاه مستطيلتان وهما مع اصابعه بلون الرمل. مخالفه دقيقة، قليلة التحجين لونها الى السواد الاطحل.

يألف المناطق القاحلة الرملية والصخرية لان ثوبه يمانن تلك البيئة. يعدو على الارض بسرعة الخيال ويطير بخفة ورشاقة. وهو شديد الحذر يتعد عن كل شيء يجله مما يجعل صيده صعباً مضنياً.

قوته الحشرات على اختلاف انواعها من الجراد الى الفراشة والعطاء والوزغ والحلازين والبراق والديدان.

بدنن افحوصه بين الحجارة التي تكتنفها الاعشاب المترابكة الكثيفة. الانثى تحضن من ٣ الى ٤ بيضات صغيرة القدّ، رافخة الوسط، لونها الى الشبهة الصفراء تعلوها نمشة سمراء وزراکش طحلاء. الترخيم يستمر من ١٧ الى ١٨ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية. الفراخ تنقف كاسية وتهجر العش برفقة الاب والام بعمر يومين. يعتبر من الطيور الجزيلة النفع.



N.S. Elanus melanopterus.
Fr. Elanion mélanoptère.
Eng. Black-winged Kite.

زُرُقُ الشَّرْقِ

طائر من الزراريق ينتمي الى عمارة الحداء وفصيلة الصقريات. يدعى في مصر «زُرُق كوهي» و «صقر الشادوف». موطنه الشرق الاوسط وبعض مناطق اروبة وافريقية. يعتبر من اوابد جبال لبنان.

جسمه متوسط القدّ. طوله نحو ٣٥ سم. وبسطه نحو ٦٢ سم. ثوبه متراكب الالوان اللامعة السفعاء المواج. رأسه وردائه وظهروه وعجزه وذنبه الى الرماديّ الازرق المواج. جبهته وسقطاه سود. زوره وصدرة وبطنه الى البياض الاغبر. عيناه قرمزيتان. زفده الى الصفرة البرتقالية. منسره قصير القدّ، شديد الانعفاف، مسنن الافك العلوي، اسود اللون. سقطه ذلق مستطيل يلحف الذنب ويتجاوزه. ذنبه صغير القدّ مقعر الطرف. ساقه قصيرة، لونها الى الصفار العابق وهي كاسية النصف الامامي العلوي، عرياطة الباقي. اصابعه قوية صفراء اللون. مخالفه متوسطة التحجين، حادة الاطراف، سوداء اللون.

الانثى اكبر قدماً من الذكر الا انها تتحلّى بذات الثوب وريشها رهل كريشه. يألف البراري والمناطق التي تتخللها الاحراج والاراضي المذحاة. يعيش ذكراً وانثى وهو يابس المزاج، شديد الجناح، سريع الطيران، لا يهاب شيئاً. قوته القواضم والجراد ومختلف الحشرات.

مسرحة يستمر طوال النهار لكنه ينشط بنوع خاص قبيل شروق الشمس وقرب غروبها عندما تكون كواصر الطير قد آوت الى اوكارها.


يسافد في اوئل الربيع وبدنن وكره تحت قنن الاشجار الشامخة الرفيعة. الانثى تبيض من ٣ الى ٤ رفنات لونها الى البياض الاشهب تعلوه رقشة سمراء لا نظامية الشكل والترتيب. الحضن يستمر نحو ٤ اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يعولها ويؤمن لها الغذاء. يعتبر من الطيور الجزيلة النفع الواجب حمايتها.

N.S. Charadrius auratus,
Charadrius apricarius, Pluvialis apricaria.

Fr. Pluvier doré.


Eng. Golden Plover.

يُدْتَنُ افحوصه بين الاعشاب الكثيفة في منحدر من الارض معرضه الجنوب ويلحفه
بشئ الحشائش ويبطنه بالناعم منها وبالصوف والزغب. الانثى تحضن من ٣ الى ٥ بيضات.
الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية
عند الاقتضاء.
يعتبر من الطيور المفيدة النافعة وان كان من الطرائد المرغوب فيها.



زَقَزَاقُ مُدْهَبٌ ،
دَمَشَقُ مُدْهَبٌ

طائر من فصيلة الزقزاقيات ورتبة طوال الساق. يدعى في مصر «قطقاط ذهبي». وهو من
النقواطع التي تجوب مناطق وقيعان ومروج ومراعي حوض البحر الابيض المتوسط وافريقية
انشرقية والشمالية واروية والشرق الادنى ومعظم اصقاع البلاد الاسيوية. يعتبر من ضوارب
نبات لانّه يقيم في ريوعه من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع.
جسمه رشيق القوام ، اهيف الشكل . طوله نحو ٢٨ سم . وبسطته نحو ٣٦ سم . متقاده
اقصر من رأسه وهو مركب من جزئين جزء غضروفيّ يمتد من القاعدة حتى ثلثي المنقاد وجزء
قويّ يكون الثلث الاخير حيث الطرف اي الملقط . عيناه ومتقاده الى السمرة السوداء . ساقاه
رفيعتان نحيلتان ، لونهما الى الوردية السمراء يعلوها موج اخضر .
ثوبه الربيعي يختلف عن ثوبه الشتويّ ، صفحته العليا من الرأس الى الرداء فالظهر فالجناح
فالعجز فالذنب الى السواد الفحمي تعلوه نمشة حرشفية الشكل مذهبة اللون . زوره وصدرة
الى السواد اللامع يعلوه توشيم اصفر ويحوقه اطار مستعرض ابيض يمتد من جهتي الجبهة الى
العنق فالصدر فالبطن . بطنه وخوافيه وافنيكه بيض . جناحه ذلق الطرف ، مستطيل القد ،
يلحف الذنب . ذنبه صغير وقصير وموشح بخطوط معترضة .
ثوبه الشتوي يميّز بتقلص السواد من الزور والصدر فيصبح القسم الاعلى من الزور ابيض
اغبر . والقسم الاسفل منه ومن الصدر يصبحان بلون الرمل الاشهب يعلوه توشيم بني مذهب
المواج .
الانثى اصغر قدًا من الذكر وسواد زورها وصدرها ، في ثوبها الربيعي ، اقل اتساعًا ، وبياضها
مهيق خافت الماجة . اما اليافع فهو كالبالغ في حلة الشتاء .
يألف المروج والمراعي والسهول ومجاري الماء . قوته الحشرات على اختلاف انواعها
والديدان والبراق .
يتميّز بسرعة عدوه على الارض وبخفة طيرانه واستطالة شوطه .



N.S. Larus genei.
Fr. Mouette mouchetée.
Eng. Slender-billed Gull.

زُجج الماء الأرقش،
نورس أرقش

طائر آبد من فصيلة النورسيات ورتبة كفيات القدم. يدعى في مصر «نورس قرقطي». موطنه حوض البحر المتوسط وينتشر شرقاً حتى البحر الاسود وبحر قزوين ويمتد جنوباً الى حوض البحر الاحمر.


جسمه متوسط القد، شديد النشاط. طوله نحو ٣٤ سم. وبسطته نحو ٧٤ سم. وهو كبير الرأس، قصير العنق. معتدل المنقاد الجالس، المدب الطرف، الجؤوي اللون. ساقه متوسطة الطول، رباعية الاصابع الكاملة الحظاب، لونها الى الجؤوة. جناحه كبير القد، مستطيل الشكل، ذلق الطرف، عشاري القوادم. اطول قوادمه الاولى. ذنبه مؤلف من اثنتي عشرة رفة متوسطة الطول. ريش جسمه لبد التجميع ناعم كالزغب. عيناه كبيرتان مطوقتان. حدقة عينه عسليّة اللون صفراء الموج.

ثوبه الشتوي ابيض اللون، تعلوه في بعض الاجزاء ماجات وتمشيحات مختلفة. رأسه وعنقه الى البياض الناصع. محسراه موشمان بالبردة. اطار عينيه منمش بالغبرة. رداؤه وظهره ومنكباه ولواحف جناحه الى الكلسة تعلوها ماجة زرقاء باهتة. قوادمه السقطيّة الثلاث بيض النصال، سمر الهوامش الانسيّة، سود الاطراف والهوامش الوحشيّة. ذنبه ابيض اللون، عادم التمشيح والتجذيع. زوره وصدرة وبطنه وابطلاه وابطاه وافنيكه بيض.

ثوبه الصيفي يميّز أولاً باختفاء النمشة الغبراء والوشم الاريد من منطقتي العين والمحسر ثم بظهور ماجة وردية تكتنف الاجزاء السفلى من الزور الى الافنيك.

الانثى اصغر قدماً من الذكر لكنها تتحلّى بذات الثوب. اما اليافع فانه يميّز بلواحف الجناح البنية اللون وبقلة البياض على القوادم ويتجذيع الذنب بالاسود. اما الرأس والرداء والظهر والمعجز فانها تتحلّى بثوب البالغ في الشتاء كذلك الزور والصدر والبطن.

يألف السواحل البحرية واخوار الانهار. يعيش اسراباً كبيرة اللهد. قوته الاسماك الصغيرة وجميع انواع الحشرات والقشريّات والرخويّات. يعدو على الارض بسرعة ويعوم ويسبح برشاقة ويغوص في الماء كالسهم ويطير مسافات شاسعة عدّة ساعات متتابعة بدون انزعاج او كلل.



N.S. Charadrius dubius curonicus,
Aegialites minor.

Fr. Pluvier à collier, Pluvier de rivage,
Gravelot nain.

Eng. Lesser-ringed Plover.

زقزاق مطوّق،
دمشق مطوّق


طائر من فصيلة الزقزاقيات ورتبة طوال الساق. يدعى في مصر «قطقاط ابو الرؤوس» و«مطوّق صغير» وهو من القواطع التي تجوب منافع وغدران واخوار وشطوط معظم البلاد الاسيوية والشرق الادنى واروبية وافريقية الشمالية والشرقية. يعتبر من الصوارب التي لا تقيم في لبنان اكثر من اسبوعين.

جسمه صغير القد، رشيقي القوام، يطول نحو ٢١ سم. وتبلغ بسطته نحو ٢٤ سم. ثوبه متراكب الالوان. رأسه، من القمة الى القفن، حنطي اللون، اشقق الموج. جبهته بيضاء تعلوها جدّة سوداء تمتد نحو العين فتكتنفها وتتقدّم حتى قاعدة المنقاد وتتأخّر حتى مستوى القفن وتشمل القسم الاعلى من المحسر. زوره وعنقه الى البياض العاجي. رداؤه وظهره وجناحاه وعجزه وذنبه الى الحنطيّ الاشقق العابق الموج. قوادمه سود باستثناء الاربعة الخارجة البيض السيقان. صدره وبطنه وخوافيه وافنيكه الى البياض العاجي. اعلى صدره مطوّق بقلادة سوداء تنتهي عند قاعدة المنكب. جناحه ذلق الشكل، مستطيل القد، يلحف الذنب. ذنبه صغير وقصير، اسود اللون. عيناه مستديرتان مطوقتان باطار دقيق اصفر. حدقة عينه خنوية اللون. منقاده الى السمرة السوداء يستثنى منه قاعدة الافك الاسفل لانها صفراء مع الزام الاول الذي يتبعها. قائمته ربيعتان نحيلتان لونهما مع الاصابع الى الجؤوة الباهتة.

الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها ترتدي الثوب نفسه.

يألف المروج ومجاري الماء والمنافع وضياف الغدران والشطوط البحرية. سره متوسط العدد. يميّز بسرعة عدوه على الارض وبخفة طيرانه ورشاقة حركاته وعطفه على صغاره وطول قاب شوطه.

يلتمس قوته في الصباح الباكر وعند الغروب. قوته الحشرات والديدان والقشريّات. يدنّ افحوصه في الرمل على بعد ١٠٠ قدم عن مرمى الموج. الانثى تحضن في اواخر الربيع من ٣ الى ٤ بيضات اجاصية الشكل لونها الى الكلسة الصفراء الموج تعلوها نمشة سوداء ورقشة سمراء داكنة. الترخيم يستمر من ٢٤ الى ٢٦ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر في اثناء الليل. يعتبر من الطيور النافعة المفيدة وان كان من الطرائد المرغوب فيها.



N.S. Larus canus.

Fr. Goéland cendré, Mouette cendrée.

Eng. Common Gull,
Short-billed Gull.

زَمَجُ الْمَاءِ الْأَعْبَرِ ،
نُورَسُ أَعْبَرِ

طائر من فصيلة النورسيات ورتبة كفيات القدم. اعطانه فسيحة الارحاء تمتد من اطراف القارة الاسيوية الى اطراف القارة الارويية. يستوطن المناطق الباردة في الصيف ويقطع الى الدافئة في الشتاء واخصها الخليج الفارسي والعراق ومصر والسودان والبحر الابيض المتوسط. اقامته على الشواطئ اللبنانية في اثناء عبوره نحو البلاد المصرية والسودان والبحر الاحمر تستمر نحو ثمانية ايام ولا تتجاوز الاسبوعين.


جسمه كتلة من العضلات، قويّ البنية، متوسط القد. طوله نحو ٣٨ سم. وبسطه نحو ٨٢ سم. يتميز بكبر الرأس، وقصر العنق، واعتدال المقاد الجالس الجرم، المدبب الطرف العلويّ الشارف المحدودب. ساقه متوسطة الطول، رباعية الاصابع الكاملة الحظاب، لونها الى الخضار الفاتح الاصفر المواج. جناحه وارف الاتساع. مستطيل الشكل، عشاريّ القوادم، اطول قوادمه الاولى. ذنبه مؤلف من اثني عشرة رفة متوسطة الطول. ريش جسده ناعم، لين وغزير. عيناه كبيرتان مطوّقتان بالصنابي العابق. حدقة عينه عسليّة اللون، سمراء المواج. ثوبه الشتويّ يغلب فيه الابيض الازرق المواج. رأسه ابيض اللون يعلوه توشيح اغبر يمتد حتى القفن ويكتنف المحسرين وعلاطي العنق. رداؤه وظهره ومنكباؤه ولواحف جناحيه الى الريدة الزرقاء المواج. اطراف قوادمه مجذعة بالاسود. زوره وصدرة وبطنه وابطلاه وابطاه وافنيكه وذنبه بيض.

ثوبه الصيفي يتميز بنقاء اللون الابيض وبخلو الرأس من التوشيح الاغبر.

الانثى اصغر قدماً من الذكر غير انها تتحلّى بذات الثوب.

اليافع بنيّ اللون في اجزائه العليا وعلى جانبي الصدر. ذنبه ابيض اللون تعلوه، عند طرفه، خطوط معترضة سوداء. اما الاجزاء السفلى، من الزور الى الصدر والبطن والافنيك، فجميعها بيضاء اللون. منقاده الى السمرة السوداء المواج. ساقاه واصابعه الى الصفار الحنطي. وهو لا يكتسي ثوب البالغ الا بعد اكتمال اربع سنوات.

يبدئن عشه بين الصخور في المواقع البحرية الموحشة. عشه افحوص متوسط الحجم والعمق، كثيف البطانة النباتية، تضع فيه الانثى عند واسط ابار من بيضتين الى ثلاث بيضات معتدلة القد، متينة الخشل، لونها الى الغبرة، تعلوها نمشة سمراء ورقشة خضراء يكثر تجميعها عند العقب. الحضان يستمر من ٢٢ الى ٢٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. اما الفراخ فلا تخرج العش للقيام باود نفسها قبل اكتمال نمو قوادمها الذي يتطلب نحو خمسة اسابيع.



سُبْد شَائِع ،
أَبُو عُمَيَّ

N.S. Caprimulgus vulgaris.
Fr. Engoulevent commun.
Eng. Common Nightjar.

طائر من السبد الروامس ينتمي الى فصيلة السبديات ورتبة الجواثم مشقوقات المناقير يدعى في مصر «ابو النوم». موطنه فسيح الارحاء يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية يجوب اصقاعها المختلفة ملاباً الدقيق والمصيف والمشتى. وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان نحو خمسة أشهر، يفد في القسم الامل من نيسان ويرحل في القسم الثاني من آب. جسمه ممشوق الشكل. طوله نحو ٢٨ سم. وبسطته نحو ٨٥ سم. رأسه مستعرض مقلطح. عيناه كبيرتان، كستينتان. رموش عينيه كثيفة ناعمة. سباله اسود اللون. منقاده صغير القد، اسود اللون، واسع الشدق. عنقه بالغ القصير. جناحه ضيق مستطيل. اطول قوادمه الثانية ثم الثالثة. ذنبه مستدير الطرف. عشائيه الرفال.

ريشه شديد النعومة متوسط اللين. ثوبه العامي الى الكهبة الفضية الموج تعلوها سرنجة مختلفة الاشكال وتنميش وتديج وتوشيم تمانن قشور الاشجار التي يأوى اليها. جناحه بني اللون، مجذع القوادم بالابيض والاصفر. سباله اغبر اللون، حنطي الموج يعلوه وشم اسود واكهب. بطنه الى الصهبة الغبراء يعلوها موج اسفر وتوشيم معترض دقيق اسمر اللون. رسغه قصيرة القد، سمر اللون، جؤوية الموج. سرديّة الصفحة الامامية، حنفيّة الصفحة الخلفية، اصابعه بادية القصير باستثناء الوسطى الحنطية القاعدة. مخالفه متوسطة التحجين. الانثى اصغر قدماً من الذكر وتحلى بذات الثوب الا انها خالية من التبقيح الابيض الذي يعلو نصال القوادم الداخلية عند الذكر ويقال الذنب الخارجية.

يألف الاحراج المبعثرة الاشجار. يسرح في الليل ويرقد في النهار. ينشط من الغروب الى فحمة الليل ومن الفجر العميق الى بلوغ الصبح. قوته جميع الحشرات التي تسرح في الليل من الهوام الى الذباب والفراش والخنفس والجنادب.

يدئن افحوصه في الارض بين الاعشاب والادغال. الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تبنية اللون يعلوها تمشيح اسمر. الحضان يستمر نحو ١٨ يوماً. الانثى تحضن في النهار والذكر يحضن في الليل. يعتبر من الضيور الكثيرة النفع التي تستحق الحماية.

يألف السواحل البحرية واهوار الانهر وضاغاف البحيرات. وهو للملاحين الدليل الاكيد بان السفينة تقرب من البر.

يعيش اسراباً متفاوتة العدد تطير فوق الماء فتختلس منه السمك. قوته السمك وجميع انواع الحشرات والقشريات والرخويات ولا يعاف الجيف البحرية الطافية على سطح الماء. وهو من الطيور التي تمانن البيئة التي تعيش فيها. يعدو على الارض بسرعة ويسبح بلباقة وخفة ويغوص في الماء كالسهم ويطيّر مسافات شاسعة دون ان يعتره وهن او كلل.

يدئن عشه على مجادح البلاد الشمالية التي يحط فيها خلال شهر نيسان ولا يهجرها قبل اوسط شهر آب. عشه افحوص كبير القد، متوسط العمق، كثيف البطانة النباتية تضع فيه الانثى عند اواخر ايار من بيضتين الى ثلاث بيضات كبيرة القد. متينة الخشل، سمر اللون او خضراء. الحضان يستمر من ٢٤ الى ٢٦ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. اما الفراخ فلا تبرح العش قبل اكتمال نمو قوادمها الذي يتطلّب نحو خمسة اسابيع.

N.S. Buteo vulgaris.
Fr. Buse commune, Buse vulgaire.
Eng. Common Buzzard.

الناعم يتخلله الصوف والسيب. اثناء تحضن في اواخر نيسان نحو اربع رفنات اهليلجية الشكل، غبراء اللون، يعلوها موج متقطع اخضر وتبيح اشقح. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. والفراخ تهجر الوكن بعد ستة اسابيع. يعتبر من الكواسر الجزيلة النفع الواجب حمايتها لانه يصيد في السنة الواحدة، على حد قول الذين اختبروه، اكثر من عشرة الاف فأرة ودثيمة وجرذون وافعى وثعبان.




سَقَاوَة شَائِعَة ،
صَفْر حَوَّام . صَفْر جَرَّاح

طائر من السقاوات وفصيلة الصقريات. موطنه فسيح الارحاء يمتد من اقاصي الشرق الى اطراف اروبة وافريقية. اعطانه اللبناية تشمل جميع مناطق الوسط والبقاع والجرود. جسمه ممشوق القد، رشيق القوام. طوله نحو ٧٠ سم. وسطته نحو ١٢٠ سم. ثوبه متباين الالوان التي تختلف باختلاف فصول السنة وتقدم العمر انما تغلب فيها السمرة الكستية. سقطه متوسط الطول لا يلحف كامل الذنب وذنبه مستعرض التجذيع دوماً. رأسه ضخم الشكل، مستعرض القفن. عيناه كبيرتان. حدقة عينه جووية اللون. منسره قصير القد، اصفر الزفد. ازرق القاعدة، اسود البهرة المحججة الذريرة. ساقه قصيرة عارية من الريش. رسغاه واصابعه صفرة. مخالبه عفية، قوية، شديدة الانعقاد، سوداء اللون. يألف المرتفعات والغابات المتفرقة والاحراج المعثرة الاشجار. طيرانه خفيف الحركة، بطيء الانسياب، قصي الشوط، واسع الحوم القريب من سطح الارض. ولا يحلق ويرتفع بعيداً في الفضاء الا في زمن السفاد حيث يقوم بضروب من الطيران الاستعراضى ترتاح له الانثى وتهش به.

يتفقد ناحية صيده بدقة وينقض على فريسته كاسر الجناح حتى الاقتراب من الارض فينشر جناحيه ويرفعهما الى العلاء قبل ان يقبض عليها بمخالبه ثم يطير بها الى مستقره او مجثمه المألوف.

وعندما يجثم على شجرة او صخرة فانه يختار المكان الارتفاع الذي يمكنه من الاشراف على المحيط الذي يوجد فيه ولا يتلمس الغصن او الصخرة الا برجل واحدة ويرفع الاخرى ويخفيها تحت السقط. وقد يبقى جاثماً على رجل واحدة اكثر من ساعة. قوته القواضم على اختلاف انواعها من الفأرة الى الدثيمة والعكبر والجرذ ثم الحيات والعطاء والضفادع والحشرات.

يدئن وكنه في الاشجار الدائحة الباسقة الرفيعة عند انتشاب الاغصان وفوق مفترقها. وكنه صاحب الشكل، كبير القد، يشيده بالقضبان المختلفة الغلاظة والدة ويطنه بالحشيش



N.S. Cypselus melba,
Micropus melba,
Apus melba.

Fr. Martinet alpin,
Martinet à ventre blanc.

Eng. Alpine Martin.

سَمَامَة الصُّرُود ، عَوَّار



N.S. Cypselus murinus,
Micropus murinus,
Apus murinus.

Fr. Martinet murin.

Eng. Little Grey.

سَمَامَة رِبْدَاء ،
خُطْفَ أَسْمَر

طائر من السمامم. موطنها سواحل البحر الابيض المتوسط والجزيرة العربية وافريقية الشرقية. تضيف الربوع اللبنانية من اواخر اذار الى اواخر تشرين الاول.

جسمها متوسط القد. طولها نحو ١٧ سم. وبسطةها نحو ٣٨ سم. ثوبها الى الربرة السمراء السوداء المواج. زورها ابيض. صدرها وبطنها الى الربرة تسمّر في الصدر وتعبّر في البطن. جناحها ضيق، خارق الطول، متوسط الاحديداب، عشاري القوادم، سباعي الخوافي. ذنبها معتدل الطول، فارق الطرف، عشاري الرفال. رأسها مجموع الشكل مسطح القمة. مناقرها صغير القد مستعرض الشدق الذي يحمل في وسطه تحت رباط اللسان جيّاً وسيعاً يستوعب الكثير من الحشرات والهوام. عيناها صغيرتان كستيتا اللون. رسغاها كاسيتان. اصابعها دقيقة سوداء اللون. مخالباها متقبضة محدودة حادة الاطراف.

الانثى تتحلّى بثوب الذكر الآ ان يياض الزور فيها ينحرف نحو الاغبر. تألف جميع المناطق واخصّها الوسط. تتميز بخفة الحركة وسرعة الطيران وحدة البصر. قوتها الهوام والبعوض والذباب والحشرات المجنحة تلتهم منها يوماً عدّة مئات. تدنّ عشها في اوقاب الصخور وتحت سقف البيوت المهجورة وفي تجاويف الاشجار. عشها كعش سمامة الصرود الآ انه اتقن صنعاً. الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات مستطيلة الشكل ناصعة البياض. الحضن يستمر نحو ١٨ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء.

تعتبر من الطيور الجزيلة النفع الواجب حمايتها.

طائر من السمامم. موطنها يشمل جبال الشرق الاوسط واروبة الجنوبية وجزر البحر الابيض المتوسط وسلسلة جبال الاطلس وتنتشر شرقاً حتى جبال حملايا وجنوباً حتى افريقية الشرقية. تعتبر من ضوارب لبنان لانها تقيم فيه من اواسط الربيع الى اواخر الصيف.

جسمها مستطيل القد. طولها نحو ٢٣ سم. وبسطةها نحو ٥٠ سم. ثوبها الى السواد الفحمي. زورها ابيض. صدرها موشح بخط اسمر. بطنها وايطلاها وافنيكها ابيض. جناحها قليل العرض، خارق الطول، محدودب الشكل، يحمل عشر قوادم، اطولها الاولى، وسبع خوافي. ذنبها مستطيل القد، فارق الطرف، عشاري الرفال.

رأسها مربع القالب. مقادها صغير القد. مستعرض الشدق الذي يحمل في وسطه تحت رباط اللسان جيّاً وسيعاً يمكنه من استيعاب كمية من الحشرات والهوام. عيناها مستديرتان، صغيرتان، كستيتا اللون. رسغاها قصيرتان كاسيتان. اصابعها صغيرة، سوداء اللون. مخالباها متقبضة. مقوسة حادة الاطراف.

الانثى تتحلّى بثوب الذكر الآ ان يياض الزور فيها خفيف. تألف الوسط والجبال واطراف الاماكن الآهلة. طيرانها فائق السرعة وتستطيع ان تقطع مئات الاميال دون ان تبدو عليها دلائل الوهن.

تتميز بحدة البصر ويقال انها تبصر البعوضة والنملة المجنحة على بعد ١٠٠ متر. قوتها الذباب والهوام والبعوض والنمل المجنح ومعظم الحشرات الصغيرة. يقال انها تلتهم يوماً اكثر من الفين ذبابة وبعوضة.

تدنّ عشها في اوقاب الصخور وتحت سقف البيوت وفي شقوق وصدوع جدران الخرائب والابنية المهجورة. عشها مزيج من المواد النباتية والعضوية المختلفة تلصقها بلعابها وتكون منها محضناً مستديراً متوسط العمق. الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات مستطيلة الشكل عاجية اللون. الحضن يستمر نحو ١٨ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء.

تعتبر من الطيور الجزيلة النفع الواجب حمايتها.



N.S. Pastor roseus.
Fr. Martin roselin, Étourneau rose.
Eng. Rose-coloured Starling.


سَمَرَمَر ، سَمَرَمَد

ومن اسمائه البَاذِنَجَان والسُّلْكُوت والسَّفَرَمَادِي والزُّرُزُور الوَرْدِي. وهو طائر قنبراني وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزرزروريات. موطنه يمتد من الهند الى الشرق الاوسط واروبة الشرقية والجنوبية. وهو من الصوارب التي تختلف مدة اقامتها في لبنان من سنة الى سنة اذ انها تراوح من اسبوع الى خمسة اسابيع.

جسمه مربع الشكل. طوله نحو ٢٤ سم. وبسطه نحو ٣٢ سم. ثوبه متراكب الالوان البراقة الجميلة. رأسه وطرته وعنقه الى السواد البنفسجي الارجواني المواج. جناحاه وذنبه الى السواد الازرق الاخضر المواج. رداؤه وصدره وبطنه وابطلاه الى الحمرة الوردية. جناحاه ذلق مستطيل، يكاد يلحف الذنب، قوادمه عشر اقصرها الاولى واطولها الثالثة. ذنبه قصير القد، مقطوم الطرف يتألف من اثني عشرة رفة. عيناه كبيرتان مستديرتان. حدقة عينه خنوية سمراء. منقاده مخروطي الشكل، قصير القد، حنطي القاعدة والزمام الاول، ووردي الباقي. رسغاه واصابعه الى السمرة الحنطية الصفراء المواج. مخالفه قوية، سمراء اللون.

الانثى اصغر قدًا من الذكر وتتحلى بذات الثوب الا انها عادمة الطرة. يسرح من الشروق الى الغروب. قوته الجراد والجنادب والقبايط والحشرات المختلفة وبعض البزور والحبوب.

حياته جماعية كالزرزور ويدن عشه على ذات النمط. اثناء تحضن مرتين في العام. حضنتها تراوح من ٥ الى ٦ بيضات تقوم بتريخيمها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. يعتبر في مصيفه من الطيور النافعة اما في مشناه فهو من الطيور الضارة لانه يلتهم الكثير من الحبوب الاقتصادية واخصها الارز.




N.S. Cypselus apus,
Micropus apus, Apus apus.
Fr. Martinet noir,
Martinet de murailles.
Eng. Black Martin.

سَمَامَة سَوْدَاء ، عَوْهَق

طائر من السمائم. موطنها يشمل الشرق الاوسط واروبة وافريقية الشرقية والشمالية والاستوائية، تألف بعض اصقاعها فتجوبها كل عام طلبًا للرزق والمصيف والمشتى. مكوثها في لبنان لا يتجاوز ثلاثة اسابيع منها اسبوع في رحلة الربيع التي تنجها فيها نحو تركيا وبلاد البلقان ثم اسبوعين في رحلة الخريف عند عودتها الى افريقية الشرقية والاستوائية.

جسمها مستطيل القد. طولها نحو ٢٢ سم. وبسطها نحو ٤٧ سم. ثوبها الى السواد الاسفع يعلوه مواج أخضر يزداد وضوحًا في الرداء والجناحين. زورها ابيض اطحل. صدرها وبطنها وخوافيها ابهت ثوبًا من ظهرها وجناحيها. جناحها ضيق مستطيل الا انه اقل احديدابًا واعرض قاعدة واذلق طرفًا من جناح سائر السمائم، قوادمه عشر وخوافيه سبع. ذنبها مستطيل القد، فارق الطرف، عشاري الرفال. عيناه صغيرتان خنويتا اللون. منقارها بالغ القصر، مستعرض الشدق الذي يحمل في وسطه تحت رباط اللسان جرابًا وسيعًا يستوعب كمية من الحشرات والهوام. رسغاه واصابعها صغيرة القد، سوداء اللون. مخالفها متقبضة محدودة حادة الاطراف.

الانثى تتحلى بثوب الذكر الا ان بياض الزور فيها اشد غيرةً وأقل اتساعًا. تتميز بسرعة الطيران وكثرة الارتفاع في الجو وحدة البصر وعدم الوجمل حتى من كواسر الطير لانها تحتمي بسرعتها. تعتبر من الطيور النافعة التي تستحق الحماية.



N.S. Turdus mauvis, Turdus musicus.
Fr. Grive mauvis. Eng. Fieldfare.

سُمَّنة مَجْوَالَة ،
سُمَّنة غَرِيدَة

طائر من السَّمَن القواطع وفصيلة الشحروريّات. موطنها يمتدّ من اليابان الى بلاد اسكندنيايا ومن افريقية الشّرقيّة الى الشماليّة تجوب اصقاعها المختلفة طلباً للرزق والمصيف والمشتى. تعتبر من ضوارب لبنان اللامستقرّة لانها لا تحلّ في ربوعه عدّة سنوات متتابعة وعندما تتراده تمكث من يومين الى خمسة ايام.

جسمها منسجم الشكل. طولها نحو ٢٢ سم. وبسطها نحو ٣٠ سم. ثوبها الى الصهبة الصنائية الطحلاء الموج. رأسها اعقب من ظهرها ويحمل على كل جانب من جانبيه خطّ ابيض مستعرض يعلو العين والمحسر ويمتدّ من قاعدة المنقاد الى مستوى القفن. جناحها باهت الاطراف. ذنبها داكن اللون. زورها وصدورها وبطنها الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمراء متتابعة. ابطالها الى الحمرة المغراء. عيناها مطوّقتان بالصهبة الحنطيّة. حدقة عينها كستنيّة داكنة. مقادها جالس الشكل، حنطيّ اللون، اسمر الموج. رسغاها دقيقتان، عاربتان، بنيّتا اللون. اصابعها معتدلة القد حنطيّة اللون. مخالبيها معتدلة القدّ والتحجين. الشقّان لا يختلفان الا قليلاً، الذكر اميز قدماً من الانثى والانثى ابهت ثوباً من الذكر الذي يتميّر ايضاً بكثرة الزرققة البعيدة عن التفريد المألوف المستحب.

تألف الغابات والحدائق والزواتين والمروج وضفاف الانهر. سربها كبير العدد يفوق السبعين زوجاً. طيرانها سيف وانسياب. شوطها مستطيل القاب، مستقيم الخطّ لا يداخله تصعيد وتخفيض وتعرج الا عند الاقتراب من الهدف والجنوم. تدنّ عشها في الاشجار الظليلة المعتدلة الارتفاع. الانثى تحضن من ٥ الى ٧ بيضات مرّة واحدة في العام، خلال شهر ايار. الترخيم يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء والحماية.

قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والانواع والاساريع والديدان والثمار العنبيّة. تعتبر من الطيور المتوسطة النفع ولكنها من الطرائد المرغوب فيها.



N.S. Turdus viscivorus.

Fr. Grive draine, Grive du gui,
Grive de brou.

Eng. Mistle-Thrush.

سُمَّنة الدَّبِق ، سُمَّنة الهدال

طائر من السَّمَن ينتمي الى فصيلة الشحروريّات. موطنها يمتدّ من اواسط القارة الاسيويّة الى الشرق الاوسط وكامل الاصقاع الارويّة وبعض مناطق افريقية الشماليّة. وهي مبدئيّاً من الطيور الضوارب التي تجوب البلاد طلباً للرزق والمصيف والمشتى دون ان يأخذ تجوالها طابع الهجرة كما تفعل القواطع لان سربها مهما كثر عدده لا يتجاوز خمسة أزواج. تعتبر من الضوارب التي تقيم في لبنان نحو اربعة اشهر وذلك من اوائل تشرين الثاني الى اواخر شباط.


جسمها مستطيل الشكل لا يخلو من بعض الكياسة والرشاقة. طولها براوح من ٢٨ الى ٢٩ سم. وبسطها من ٤٠ الى ٤٢ سم. ظاهر ثوبها الى الصهبة السمراء يعلوها موج جويّ. رأسها منمشّ بالأسمر. محسراها وزورها وصدورها وبطنها وافنيكها الى البياض الأصفر تعلوه رقشة سمراء. جناحها عاقب اللون الداكن، اطراف الكلى والاباهر والخوافي الى البياض الاغبر. ذنبها ينحرف نحو البنيّ الداكن اما اطراف رقاله الوحشيّة فالى البياض الاغبر. عيناها مطوّقتان بالأسمر. حدقة عينها بنيّة اللون. مقادها جالس الارتكاز، حنطيّ اللون، اسمر الموج. رسغاها واصابعها الى السمرة الجويّة. مخالبيها نشيطة، معتدلة القدّ والتحجين سمراء اللون.

الشقّان لا يختلفان الا قليلاً. الذكر اميز قدماً من الانثى والانثى ابهت ثوباً من الذكر. تألف الأجرح والغابات والزواتين والحدائق والجنائن ومنحدرات الاودية والاعقة. طيرانها قليل السيف كثير الانسياب لا قياسي الشوط. انتقالها بين الأشجار وعليها لا يخلو من الخفة ولكنه عادم الرشاقة. قوتها الحشرات المختلفة واساربعها ويرقاتها وبعض الثار العنبيّة.

الانثى تحضن مرتين في العام. حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات ترخمها وحدها من ١٣ الى ١٤ يوماً بينما الذكر يؤمّن لها الحماية والغذاء. تعتبر من الطيور المتوسطة النفع ولكنها من الطرائد المطلوبة.

N.S. Turdus philomelos, Turdus ericetorum.
Fr. Grive musicienne, Grive commune, Merle-Grive.
Eng. Song-Thrush, Thorstle.

تدتن عشها في الاشجار الوارفة الظل. الانثى تحضن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في العام، المرة الاولى في اواخر نيسان والثانية في اواخر حزيران. الترخيم يستمر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية. تعتبر من الطيور المتوسطة النفع ولكنها من الطرائد المرغوب فيها.



سُمَّنَةٌ مُطْرِبَةٌ ، سُمَّنَةٌ شَائِعَةٌ

طائر من السمن القواطع وفصيلة الشحوريات. موطنها فسيح الارحاء يمتد من الشرق الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية. تعتبر من الضواري التي تقيم في الربوع اللبنانية نحو اربعة اشهر. ترد في تشرين الثاني وترحل في اوائل اذار.

جسمها مشوق مستطيل. طولها نحو ٢٣ سم. وبسطنها نحو ٣٢ سم. رأسها صغير القد. عيناها مطوّقتان ومكحلّتان. حدقة عينها كستنية اللون. منقادها جالس الشكل، حنطيّ اللون، اسمر الموج. رسغاها دقيقتان عاريتان. اصابعها قوية، معتدلة القد. مخالبيها مستدقة. ساقاها واصابعها الى الحنطيّ الاسمر تعلوه ماجة حمراء.

ثوبها متراكب الالوان المتقاربة. رأسها وعنقها ورداؤها وظهرها وجناحها وذنبها الى الصهبة السمراء يعلوها موج زيتي. حنار جناحها الى الصفرة الذهبية. زورها وجوشنها وبطنها وافنيكها الى البياض الاغبر الحنطيّ الموج يعلوه توشيم اسمر عابق، نظامي الرقشة والارتكاز، يمتد من علاطي العنق الى الزور والصدر والبطن.

الشقان لا يختلفان الا قليلاً. الذكر اميز قدماً من الانثى والانثى ابهت ثوباً من الذكر. وقد يكثر الاحساب في هذا النوع من السمن وقد تختلف فيه الالوان فتتحول الصهبة السمراء الزيتية الموج الى صهبة جووية وتتسع رقشة التوشيم في الصدر وتستطيل في البطن. ويتميز الذكر بالتفريد المستحب الوقع، القوي النبرة، الذي يردده مئات المرات من الشروق الى فحمة الليل.

تألف الزواتين والاحراج المبعثرة الاشجار والحدائق والجنائن. قوتها الحشرات واساريها ويرقاتها وبعض الثمار العنينة.

طيرانها لا قياسي الشوط والشكل يكثر فيه السيف والانسباب والتصعيد والانخفاض وانكسار الخط عن اليمين وعن اليسار. انتقالها بين الاشجار وعليها لا يخلو من التزقة المقرونة ببعض الخفة.



N.S. Turdus merula.
Fr. Merle noir, Merle vulgaire.
Eng. Common Blackbird.

شُخْرُورٌ أَسْوَدٌ

طائر غرّيد من فصيلة الشحروريّات ورتبة الجواثم مشرومات المناقير. اعطانه تمتد من الشرق الأدنى الى اروبة وافريقية الشمالية.

جسمه متناسب التقاطيع طوله نحو ٢٦ سم. وبسطته نحو ٢٨ سم. ثوبه يختلف باختلاف الشقّ واليافع من اي شق كان يرتدي ثوب الانثى.


الذكر اسود الثوب، جُويّ المنقاد والحاجب، برتقاليّ الاجفان. الانثى فحمية اللون، حنطية الموج في الرأس والرداء والظهر والجناح والعجز والذنب. أما زورها وصدرها وبطنها وخوافيها فالى الطحلة الغبراء الموشمة بالأسود والأصهب. متقادها حنطيّ اللون اسمر الموج. والعين عند الذكر والانثى مستديرة الشكل، كستنية الحدقة. أما السيقان والأصابع فالى السمرة العابقة الداكنة.

يألف الحدائق والجنان والسباحات والغابات. يستقبل غرة الفجر بالتغريد ويودّع النهار بالصداح المستحب. تغريده عديد النبرات المستحسنة الوقع. يميّز بالنشاط والمرح والنزاق والحذر. يألف حياة الاسر ويقتبس ادب التغريد والشدو بسهولة. طيرانه افقيّ الخطّ، لا نظاميّ الشوط القصير المتقطع المتتابع.

يدنّ عشّه في الأدغال والأشجار القليلة الارتفاع عن سطح الأرض. عشّه كوبيّ الشكل يحوكه بالألياف والأوراق والجذور الدقيقة المغموسة بالطين فيبدو جامداً كالكرتون ويبطنه بانعم الحشائش وارضها.

الانثى تبيض مرتين في العام. المرّة الأولى في اوائل آذار والثانية في اواخر ايار. الذكر يناوب الانثى في حضن البيض الذي يستمرّ نحو ١٥ يوماً. الحضنة تراوح من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الشبهة الخضراء الموج تلوها رقشة مختلفة الألوان فيها الأشفق الاسفع والأزرق الحنطيّ والارمد.

قوته الحشرات ويرقاتها والديدان والحلزونات والثمار المختلفة واخصّها العنبيّة. يعتبر من الطيور المتوسطة النفع.



N.S. Falco peregrinus.
Fr. Faucon commun, Faucon pèlerin, Faucon voyageur.
Eng. Peregrine Falcon, Royal Falcon, Shahin

شَاهِين

طائر كاسر من فصيلة الصقريات. موطنه بعض مناطق الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والوسطى والشمالية. يعتبر من ضواريب لبنان اللانظامية لانه يقيم فيه، خلال رحلة الخريف، من يومين الى اربعة او خمسة ايام اذا خطر له ذلك.

وهو كبير الهامة والسقط، مستطيل القوادم، واسع العينين، رجب الصدر، قصير العنق، ممتلئ الزور، جليد الفخذين، قصير الساقين، كبير الاصابع، نشيط المخالب، جسمه يطول نحو ٦٥ سم. وبسطته نحو ١٤٠ سم. رأسه الى السمرة السبورية الذكاء. رداؤه وظهره وعجزه الى الزرقة السبورية الباهتة. منكباه وسقطاه الى الزرقة السمراء الموشمة والمطوّقة بالاغبر. زوره ابيض والبياض يمتد الى علاطي العنق. صدره وبطنه الى الزرقة البنفسجية الصفراء الموج يعلوها توشيم اسود. ذنبه اسمر اللون، متتابع الخطوط المعترضة السبورية الزرقاء الموج. حدقة عينه الى الجؤوة. منسره متوسط القد، اخضر الزفد، ازرق اللون، اسود البهرة المنعقدة الحادة. رسغاه واصابعه الى الصفار الليموني. مخالفه قوية. حادة، سوداء اللون.

الانثى اكبر قدماً من الذكر واللون الاصفر في قواعد ريشها اجلى مما هو عليه عند الذكر. والشاهين ابرد من الصقر وايس مزاجاً ولاجل ذلك تكون حركته الانقضاضية اشدّ وقعاً. قوته كل ما استطاع اليه سبيلاً من الطير، لذلك يعتبر من الكواسر الضاربة المؤذية.

N.S. Fringilla cœlebs
Fr. Pinson commun,
Pinson des arbres.
Eng. Chaffinch.




شُرشور مَبْدُول ،
بَرَقَش مَبْدُول

طائر غريد من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجوائم مخروطيات المناقير. يدعى في مصر «عصفور ظالم» موطنه يمتد من الشرق الأوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية. جسمه قريب الشبه بجسم الدوري. طوله يراوح من ١٦ الى ١٧ سم. بسطته من ٢٢ الى ٢٤ سم. ثوبه متداخل الالوان. جبهته سوداء الريش. رأسه وقفنه وقلادتا عنقه الى الزرقة الرمادية الموج. رداؤه كستني اللون. ظهره الى الحنطي الاسمر تعلقه ماجة زيتية. جناحه متوسط الانفراج، ذلق الطرف، اسود اللون، ابيض الكلى والخوافي، اصفر هوامش القوادم والمناكب. عجزه أخضر. ذنبه فارق الطرف، اسود الرقال الخارجية المطوقة بالأبيض، اربد الرقال الداخلية المشحة بالبني. محسراه وزوره وصدرة الى الجؤوة الخمرية. بطنه ينحرف الى الصهبة وينتهي بالأبيض. عيناه صغيرتان خنوبيتا اللون. منقاره مخروطي الشكل، اسمر اللون، ازرق الموج. رسغاه وأصابعه الى السمرة الحنطية. مخالبه صغيرة دقيقة محججة.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وابهت ثوباً منه، يغلب فيها اللون الازرق. عنقها اغبر. زورها ابيض تعلقه ماجة صناعية. صدرها وبطنها الى البياض الاطحل. يألف السهول والبراري والحدائق والغابات والأحراج. مسرحة يستمر طوال النهار. قوته البزور البرية وبعض الحشرات والهوام. يدن في الاشجار الظليلة. عشه قذحي الشكل، جيد الحبك، رفيع الجوانب، خملي البطانة المؤلفة من الزغب والسيب والصوف والوبر. الانثى تضع في اوائل شهر ايار من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى الشهبة يعلوها توشيم ناري وبعض النقط السمر. الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الحماية والغذاء. ومنهم من قال ان الانثى تبيض وتحضن مرة ثانية في اواخر شهر حزيران. غير ان الانثى لا تبيض وتحضن مرة ثانية الا عندما تفقد الحضنة الاولى. يعتبر من العصافير المتوسطة النفع ومنهم من صنفه في فئة العصافير النافعة.

N.S. Turdus merula syriacus.
Fr. Merle noir de Syrie.
Eng. Syrian Blackbird.



شُخْرُور سُورِي

ضرب من الشحرور الأسود. اعطانه بلاد الشرق الادنى يجوب بعضها طلباً للمصيف والمشتى ويأبد في بعضها الآخر. وهو من اوابد لبنان وسوريا وفلسطين ومن ضوارب العراق وايران وبلاد حوض البحر الأحمر.

جسمه اصغر قليلاً من جسم الشحرور الاسود. طوله نحو ٢٤ سم. وبسطته نحو ٢٦ سم. ثوبه يختلف باختلاف الشق اما اليافع من اي شق كان فتوبه ثوب الانثى. الذكر اسود الثوب، ازرق الموج. منقاده وأجفانه الى الحنطي. حدقة عينه كستنية رسغاه الى السمرة السبورية. مخالبه دقيقة سوداء اللون.

الانثى الى السمرة البنية الرمادية الموج. صدرها وبطنها وخوافيها ابهت من ظهرها واقل سمرة منه. اما رقتها فالى السمرة القائمة يطوقها حنار اشقق. منقاده وأجفانها الى الصفار الداكن. حدقة عينها كستنية اللون. رسغاه الى السمرة الداكنة. مخالبها دقيقة طحلاء اللون سمراء الموج.

يألف الحدائق والجنان والغابات. تغريده متوسط الحسن يردده طوال النهار. يتميز بسرعة الحركة، وقلة الحذر، والنشاط والرح. طيرانه افعي الخط، لا نظامي الشوط المتقطع المتتابع.

يدن عشه في الأدغال. عشه كوبي الشكل يحوكه بالالياف والجذور الدقيقة المغموسة بالطين ويغلفه بالطحلب ويبطنه بالقش الناعم.

الانثى تبيض مرتين في العام. المرة الاولى في اوائل آذار والثانية في اواخر ايار. حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الشهبة الغبراء تعلقها رقشة قائمة يكثر فيها الاسمر القاتم والأزرق، الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

قوته الحشرات وبرقاتها والديدان المختلفة والحلزونات والثمار العنبية وغير العنبية. يعتبر من الطيور المتوسطة النفع والتي تألف حياة الاسر.



شَرْق،
صَقْرُ الْغَزَالِ، تُرْمُذِي

طائر من فصيلة الصقريات. موطنه فسيح الارحاء يمتد من الهند الى الشرق الاذنى واروبة الجنوبية والغربية وافريقية الشمالية والشرقية، وهو من ضوارب لبنان التي تقيم فيه بعض الوقت.

جسمه متوسط القد. طوله نحو ٤٥ سم، وبسطه نحو ١٠٠ سم. وهو اجمل الصقور ثوباً واحسنها توشيحاً واملحها تنميراً واملعها موجاً واسرعها اقتباساً وانقياداً. رأسه حتى القفن الى الصداة الشحاء المرقوشة بخطوط سمر تكتنف سيقان الريش. رداؤه وظهره وسقطاه وعجزه الى الكهبة الصنابية العابقة تتخللها عصائب معترضة سوداء. منكباة وذنبه الى الصداة الصنابية تعلوها عصائب بيثة عابقة. زوره وصدرة الى البياض الأغبر يعلوه موج أشقح اصفر ونمشة سمراء. بطنه وايطلاه وفخذه الى البرتقالي الناري الموج تعترضه عصائب ضيقة متراسة سمراء اللون. عيناه كبيرتان مكحلتان بالاسود. حدقة عينه كستنية اللون. منسره متوسط القد، ازرق اللون، اصفر الزفد، محجن البهرة الذرية الحادة. ساقه عريضة. رسغاه واصابعه الى الصفار القائم الاسمر الموج. مخالبه قوية، منعقة، سوداء اللون.

الانثى لا تختلف عن الذكر الا في كونها اكبر قدماً منه. اما اليافع فادكن لوناً من البالغ وتعلوه في خوشيه خطوط كستنية متقاربة.


يألف الجبال والهضاب والمواقع المبعثرة الأشجار. يقرب من العمران ويتعد عن القفر الموحش. يصيد القواضم على اختلافها وما استطاع اليه سبيلاً من الطير واخصه العصفور.

طيرانه تحليق وحوم وانسياب. ينقض على فريسته كالسهم وان تمكنت من الهرب فلا يعود اليها ثانية.

يدثن وكنه في أعالي الأشجار الباسقة. الانثى تحضن مرة واحدة في العام. حضنتها اربع رفقات متوسطة القد والاستدارة، حنطية اللون، تعلوها رقشة سمراء يكثر تجميعها

N.S. Falco chicquera.
Fr. Faucon chicquera.
Eng. Falcon Cherrug.

عند العقب. الترخيم يستمر نحو ٣٢ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية. يعتبر من الكواسر القليلة الضرر المتوسطة النفع.



N.S. Coracias garrula.
Fr. Rollier vulgaire, Rollier bleu.
Eng. Common Roller.

شُقْرَاقُ أَزْرَقُ ،
شُقْرُقُ شَائِعٌ ، صُؤُصُ شَائِعٌ

نوع من الشُقْرَاقِ وفصيلة الصُؤُصِيَّاتِ. موطنه يشمل معظم البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. يجوب مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط مرّة في العام. يقيم في لبنان نحو خمسة أسابيع من أواسط ايلول الى اواخر تشرين الأول ومن أواسط نيسان الى اواخر ايار.

جسمه ربع القامة. طوله نحو ٣٣ سم. وبسطته نحو ٤٨ سم. ثوبه متراكب الالوان المتداخلة الزاهية الجميلة. رأسه وعنقه الى الزرقة الباهتة يعلوها موج اخضر يعقب في القمة. رداؤه ومنكباها الى السمرة الكستنية. ظهره الى الزرقة الفاتحة. عجزه ادكن من ظهره. جناحه معتدل القد، ذلق الطرف، ازرق اللون، باهت اللواحف. قوامه سود القواعد خوافيه سود الاطراف. ذنبه متوسط الطول، ازرق اللون يعقب عند القاعدة وبهت عند الطرف، رقاله الوسطى بيّنة اللون، خضراء الموج، رقاله الوحشية سود. افنيكه الى الزرقة يعلوها موج يراوح من الاخضر الى البنفسجي. بطنه وصدرة وزوره الى الخضار الأزرق. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده كبير وضليح، طوله يعادل طول الرأس وهو اسود اللون، محدّب الطرف العلوي. رسغاه وأصابعه الى الصفرة الحنطية الموج. مخالفه نشيطة وقوية. يألف الهضاب والتهام والبراري والاراضي المدحاة وهوامش الاحراج. طيرانه حوم وتحليق وسيف وارتفاع وانقضاض. شوطه متوسط القاب وهو نزق الطباع، سريع الحركة خفيف الجناح، يصيد فريسته في الفضاء وعلى الأرض.

قوته الحشرات على اختلاف انواعها والعطاء والوزغ والضفادع والثعابين والافاعي وصغار القواضم كالفأر والعكابر...

يدنّ عشّه في تجاويف الأشجار وفي اوقاب الصخور. الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً.

يعتبر من الطيور الصوارب الجزيلة النفع الجديرة بالحماية.



N.S. Gecinus viridis, Picus viridis.
Fr. Gécine vert, Pic vert, Pivert.
Eng. Green Woodpecker.


شُسْنَةُ خَضْرَاءُ ،
نَقَّارٌ أَخْضَرٌ

طائر من الشسن وفصيلة النُقَّارِيَّاتِ. موطنه فسيح الارحاء الرحبة يمتدّ من الهند الصينية الى الشرق الادنى واطراف اروبّة. يضيف الاحراج اللبنانية في اثناء عبوره في رحلتي الصيف والشتاء او في احديهما بعض الايام.

جسمه منسجم القلب والشكل. طوله نحو ٣٣ سم. وبسطته نحو ٣٧ سم. ثوبه جميل الالوان الزاهية، متداخل الاخضر والاحمر والاصفر والاسود والابيض. رأسه احمر اللون. سباله احمر القاعدة والنصف الاول، اسود النصف الثاني. منقاده مستطيل القد، محدّد الجرم، حنطيّ اللون، اسود الموج. عيناه كبيرتان مطوّقتان. حدقة عينه خنوبية. محسره اسود المقدم، حنطيّ المؤخر يرتكز على خط احمر مستعرض الجدة يطوّقه اطار اسود يمتدّ من قاعدة المتقاد الى اعلى العنق. رداؤه وظهره وعجزه الى الخضار الاصفر الموج. جناحاه الى الخضار العابق الاسفع الموج وهما مجدّعا الاطراف الخارجية والداخلية بالاسود والابيض والاصفر. زوره وصدرة وبطنه الى الخضار الفاتح الزاهي. افنيكه اصفر اللون. ذنبه رتاجيّ الريش، معتدل القد، ذلق الطرف، اسود اللون، مجدّع بالحنطي. رسغاه قصيرتان لونهما الى الحنطيّ البني. اصابعه قوية، حنطية موشحة بالاصفر. مخالفه مستدّقة الاطراف المحدودية الحادة.

الاثني اصغر قدًا من الذكر وتتحلّى بذات الثوب الا ان سبالها وحيد اللون الاسود. يألف الاحراج والغابات والرياض والاشجار القريبة من مجاري الماء. يتسلّق الجذوع والأغصان وينقب قشورها وشكيرها سعيًا وراء الاساريع واليرقات. قوته الحشرات على اختلاف انواعها وفي مختلف اطوارها من المكنة الى الجملاء يلقيها بسرعة البرق يمكنه منها منقاده المستطيل ولسانه المنذفع الأخاذ.

يدنّ عشّه في تجاويف الأشجار. الاثني تحضن مرّة واحدة في العام، وذلك في اوائل شهر ايار، من ٥ الى ٨ بيضات كروية الشكل، عاجية اللون، قليلة التوشيم الاسمر. الترخيم يستمر من ١٥ الى ١٨ يوماً تقوم به الأنثى بمناوبة الذكر. يعتبر من الطيور النافعة التي تستحقّ الحماية الجديّة.



شُكْبَةُ صَغِيرَةٌ،
شُنْقَبَةُ صَغِيرَةٌ، بَكَّاسِين صَغِيرَةٌ

N.S. Gallinago gallinula, Lymnocyptes minimus.
Fr. Bécassine sourde, Petite bécassine, Bécot, Jaquet.
Eng. Jack Snipe.


بدثن أفحوصه في التراب بين الأعشاب الكثيفة. الانثى تضع نحو ٤ بيضات لونها الى الصفار التبيي يعلوه توشيم اسمر. الحضن يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً تقوم به الانثى بينما الذكر يؤمن لها الغذاء. يعتبر من الطيور النافعة ولكنه من الطرائد المرغوب فيها.

طائر من الشكْب ينتمي الى فصيلة دجاجيات الأرض. يدعى في مصر «بِكَّاشِينَة صَغِيرَة وَكُوسَة». وهو من القواطع التي تجوب بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وتتقدم شرقاً نحو اواسط الاتحاد السوفياتي واطراف سيريه، وجنوباً الى الهند والصين، وغرباً الى ما وراء خط الاستواء من افريقية الشمالية والشرقية، يعتبر من الضواري التي تقيم في لبنان من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع منها ٥ أو ٦ ايام في رحلة الربيع، ومن ١٢ الى ١٦ يوماً في رحلة الخريف.

جسمه صغير القد، طوله نحو ١٧ سم. وبسطته نحو ٢٢ سم. ثوبه قريب الشبه بثوب الشكْبَة المبدولة. صفحته العليا متراكبة الصهبة والسمره والسواد والزرقة والخضرة. رأسه الى السمره الحنطية تعلوه جدّة سوداء، تضيق مع ابتعادها عن مركزها، تمتد من القنن الى قاعدة المنقاد. محسراه الى الربدة الصفراء يحدهما عند اطرافهما العليا والسفلى خطان جانبيين لونهما الى السمره الحنطية. رداؤه مجذع الجانبين بالأصفر. كلاه ارجوانية اللون. اباهره بنيّة يحوقها اطار ابيض. قوادمه الى البني الداكن الاسمر الموج، واطراف خوافيه بيض. زوره ابيض اللون موشم بالأسمر. عنقه وصدرة الى الصفار الزيتي يعلوه وشم اسمر. بطنه وايطلاه الى البياض الأغبر تعلوه رقشة خفيفة سمراء اللون. جناحه معتدل القد، يكاد يلحف الذنب. ذنبه صغير وقصير يشتمل على ١٢ رفة اطولها الوسطى. عينه مكحلة بالبني وكحلتها تمتد حتى قاعدة المنقاد. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده بالغ الطول، رافخ القاعدة، باهت اللون الأحمر، اسمر الطرف. ساقه وأصابعه الى الربدة الزرقاء تعلوها مشحة خضراء باهتة. مخالفه صغيرة نشيطة. ثوبه الربيعي لا يختلف عن الشتوي إلا بزهاء الالوان.

الانثى اصغر قدًا من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب.

يألف المناقع والمراعي والاراضي الرطبة. اخلاقه اخلاق الشكْبَة المبدولة وطباعه طباعها وعاداته أيضاً إلا انه انفر منها وقل يقظة وأسرع طيراناً ولا يستعمل الغوص في الماء كوسيلة للهرب.



شُكْبَةُ مَبْدُولَةٌ، شُكْبَةُ المَنَاقِعِ،
شُنْقَبَةُ مَبْدُولَةٌ، بِكَاسِينِ مَبْدُولَةٌ

N.S. Gallinago scolopacinus, Capella gall. gallinago.
Fr. Bécassine ordinaire, Bécassine des marais.
Eng. Common Snipe, Wilson's Snipe.

يدتّن افحوصه فوق الوحل الناشف بين الأعشاب المنقعيّة. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات يرمعيّة الشكل لونها الى الشفحة تعلوها ماجة خضراء خفيفة ورقشة سمراء. الحضان يستمرّ من ١٥ الى ١٧ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء. يعتبر من الطيور النافعة ولكنه من الطرائد المرغوب فيها.

طائر من الشكّب يتبعي الى فصيلة دجاجيات الأرض. يدعى في مصر «بكاشينة عادة». وهو من القواطع التي تجوب البلاد الاسيوية والارويية والقسم الأكبر من البلاد الافريقيّة. يعتبر من الضوارب التي لا تقيم في لبنان أكثر من أسبوع.

جسمه متوسط القدّ طوله نحو ٢٥ سم. وبسطته نحو ٢٨ سم. ثوبه متراكب الصهبة والسمرة الحنطية المرقطّة بالأبيض، يسمرّ ويعبق في الظهر وتقطبه خمسة خطوط صناعيّة حنطية بيضاء المواج ونحطّ وسطيّ يمتدّ من الرداء الى العجز ونحطّان جانبيّان، من اليمين ومن اليسار، يمتدّان من الكلي الى القوادم. عنقه وبطنه الى البياض الأغبر. زوره وصدرة وابطلاه الى الصهبة الشقراء تعلوها رقشة سمراء لا قياسية التوشيم. جناحه معتدل القدّ، مستعرض الشكل، يكاد يلحف الذنب. ذنبه صغير وقصير تعترضه خطوط سوداء اللون وجؤويّة. عينه كبيرة، مكحلّة، مركزها بمستوى الاذن، كسائر انواع جنسه، وليس وراءها كما هي الحال في غيرها من الطير. حدقة عينه كستية اللون. منقاده بالغ الطول الذي يفوق ضعف طول الرأس، وهو اسود اللون. جؤويّ القاعدة، ساقه وأصابعه الى الخضار الاسمر الباهت. مخالفه الى السمرة الحادقة.

ثوبه الربيعي لا يختلف عن الشتويّ الا بزهاء الالوان ورونقها.

الانثى أصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب.

يألف المناقع والمراعي والاراضي الرطبة. يعدو على الأرض برشاقة. طيرانه خفيف الحركة معتدل السرعة يكثر فيه الحوم والتحليق. شوطه متتابع التعاريج والصعود والهبوط. حطّه على الأرض انقضااض منحرف الخطّ. وهو كثير الحذر والوجل. سريع الهرب، يفرّ عند الشعور بالخطر دون ان يفكر في الدفاع عن النفس واذا ما فوجئ قرب الماء او فوق سطحه فلا يتردّد في الغوص فيه طلباً للنجاة.

قوته الديدان والحشرات والرخويات اخصّها البرّاق والحلزون. يصيد من الفجر الى الشروق ومن الغروب الى فحمة الليل وفي الليالي القمرية والوضيئة.



N.S. Athene noctua, Carine noctua.
Fr. Chevêche, Chevêche commune.

Eng. Little Owl. أم السهر، أم قويق

طائر من البوميات الكواسر الروامس، موطنه يعم جميع البلاد الآسيوية والأوروبية والأفريقية المعتدلة الحرارة. اعطانه اللبانية تمتد من الساحل الى اواسط الجرد والبقاع يلد ويتكاثر حيثما تلائمه البيئة ويتوافر الصيد.

جسمه صغير القد، ربع القامة، طوله نحو ٢٣ سم. وبسطة سقطيه نحو ٣٢ سم. رأسه مستعرض الشكل، منفرج النقب المستدير. عيناه مستديرتان شاخصتان. حدة عينه الى الصفار الكبريتي. منسره قصير القد، اسمر اللون، اخضر الموج، مدبب البهرة الشديدة الانعقاد. سقطه مستدير القاعدة، ذرب الطرف، يلحف الذنب. ذنبه مخروطي الشكل، صغير القد، مجذع بالبي والاسود. ساقاه مسرولتان. أصابعه كاسية. مخالفه مدببة الأطراف لونها الى السمرة الداكنة.

ثوب الذكر والانثى واليافع على نسق واحد. وهو الى الريدة المنمشة بالاسود والابيض تبهت وتكثر على الرداء والظهر وتقل على الرأس وتلتحم بين مؤخر القفن والرداء فتشكل شبه فلاة. زوره وصدرة وبطنه الى الريدة الغبراء البيضاء الموج تعلوها رقشة مستطيلة مبعثرة تخف كثافتها بابتعادها عن الصدر واقترابها من الافنيك. زمكاه ورسغاه الى الغيرة. يألف البراري المبعثرة الأشجار ويفضل الحدائق والجنان والاكام الصغيرة على غيرها من المواقع.

يدئن عشه في تجاوير الأشجار وفي الخرائب والاطلال وتحت سقوف البيوت المهجورة وفي أكوام الحجارة. زمن السفاد والترخيم يراوح من اوائل نيسان الى اواخر ايار. الانثى تضع من ٤ الى ٧ رفنات مستديرة الشكل، بيضاء اللون تحضنها وحدها من ٢٦ الى ٢٨ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء.

مسرحة دجوي. طيرانه لا قياسي المسلك، يكثر فيه الحوم والتحلوق ويقبل فيه السقيف. يلتمس قوته من الغروب الى الفجر. يصيد الجرذ والفأر والعطاء والضفادع والحلزون والبراق وجميع الحشرات المجنحة والدابة. يعتبر من الكواسر العظيمة النفع الجديرة بالحماية.



N.S. Locustella naevia.
Fr. Locustelle tachetée.
Eng. Grasshopper Warbler.

سُنْدَلْ أَنْمَر،
بُلْبُلُ الْعَابِ الْأَنْمَر، آكِلُ النَّطَّاطِ الْأَنْمَر

طائر من السندل ينتمي الى فصيلة الدخليات. اعطانه العالمية واسعة فسيحة تمتد من الهند الغربية الى الشرق الأدنى واروبة المعتدلة وافريقية الشمالية. اعطانه اللبانية تشمل مجاري ماء السواحل وآجام الوسط وبعض مناطق البقاع.

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٤ سم. وبسطه نحو ١٥ سم. ثوبه متداخل الالوان. رأسه ورداؤه وظهره وجناحاه وعجزه وذنبه الى الطحلة الحنطية الزيتية الموج تعلوها رقشة سوداء تمتد وتتسع في الجناح وفي الذنب. زوره وصدرة الى الصفار الحنطي. بطنه وافنيكه الى الصفار الباهت الأغبر الموج. منقاده مخزوي الشكل، اسمر الملقط الأعلى، حنطي الأسفل. حدة عينه الى السمرة الحنطية. جناحه مستدير الشكل متوسط الطول يلحف الزام الاول من الذنب. ذنبه متوسط القد، مستدير الطرف. رسغاه الى الصفرة الحنطية. مخالفه دقيقة صغيرة محججة سمراء اللون.

ثوب الأنثى لا يختلف عن ثوب الذكر. اما اليافع فانه ادكن لونا في اجزائه العلوية واقل بياضا في السفلية.


يألف ضفاف الأنهار والآجام والحدائق والجنان والمراعي. يعتبر من صميم طيور الغاب لانه لا يبارح حماه الا نادرا وهو يدلف بين الادغال وفروع النبات بسرعة الفارة ورشاقته. وقلما تهدأ له حركة او يكف عن التنقل من مكان الى مكان. زرقته صرير خافت مبتدل يردده طوال النهار وخاصة عند الغروب والمساء. قوته الهوام والذباب وجميع الحشرات المجنحة الصغيرة القد وبعض البذور البرية.

زمن السفاد والترخيم يستمر من اواسط نيسان الى اواخر حزيران. يدئن عشه في الادغال وبين الأعشاب الكثيفة. الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابوة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوماً. بيضها الى الريدة الحمراء تعلوها رقشة جووية لا نظامية الشكل والمبعثرة.

يعتبر من العصافير النافعة الواجب حمايتها.

N.S. Tichodroma muraria.
Fr. Tichodrome de murailles, Échelette.
Eng. Wall-Creeper.

الانثى تحضن من ٥ الى ٧ بيضات صغيرة القد ، عاجية اللون، يعلوه تنقيط اسود منسوب البعثة. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. يعتبر من العصافير المتوسطة النفع برغم كونه لا يأكل سوى الحشرات ويرقاتها والعناكب والديدان ذلك لانه يعيش بعيداً عن المزارع ولا يلتقط سوى الحشرات التي تقترب من الصخور او تعيش عليها او بينها.



صِرّ الصُّخُور

طائر من الصرّ ينتمي الى فصيلة المتوقلات. موطنه يمتد من الشرق الادنى الى اطراف اروية الغربية. اعطانه اللبناية تمتد من الوسط الى الجرد والبقاع. جسمه صغير القد، يطول نحو ١٧ سم. اما بسطته فنحو ٣٠ سم. وهو يتميز باستطالة المقار القليل الاحديداب، الزوايا القاعدة، الدقيق الطرف. لسانه مستطيل الشكل، ضيق الصفحة المطوقة بحليمات مدببة محدودة.

ثوبه يختلف مع فصول السنة وهو متراكب الالوان المنمقة المنضدة الجميلة. ثوبه الربيعي، أي ثوب التصاي والسفاد، الى الربدة الزاهية تعقب عند الرأس والذنب. محسراه وزوره وأعلى صدره الى السواد الفحمي اللامع. سائر صدره وبطنه الى الكهبة. جناحاه كبيران، مستعرضان، لونهما الى الربدة السمراء تعقب في الأطراف ويتخللها تبقيج ابيض وشقحة صناعية. ذنبه قصير القد، ابيض الطرف المقطوم. عيناه مستديرتان مطوقتان. حدقة عينه سوداء اللون. رسغاه قصيرتان قاتماتا السمرة. أصابعه قوية. مخالبه صغيرة مستدقة الأطراف الحادة.

ثوبه الشتوي يتميز عن الربيعي بقلة زهاء الالوان ثم بالشقحة الصناعية التي تعلق الرأس والصدر وبياض الزور.

الشقان لا يختلفان الا قليلاً، الذكر أميز قدماً من الأنثى والانثى ابهت ثوباً من الذكر. يألف المناطق الصخرية الجرداء. مصيفه الصرود ومشتاه الهضاب الصلدا والادوية السحيقة العميقة.

يطير كالفراشة ويتعلق مثلها بالصخور الناتئة العمودية. قوته الحشرات والعناكب والديدان.

زمن التسافد والترخيم يستمر من أيار الى حزيران. يبدن عشه في صدوع الصخور. عشه قمعي الشكل، متين الحبك، يخفيه داخل الصدوع بعيداً عن متناول الطيور الكواسر.

N.S. Lanius excubitor.
Fr. Pie-grièche grise,
Boisselière.
Eng. Great grey Shrike.



صُرْدُ أَرْبَد،
صُرْدُ البَادِيَّة، صُرْبُ أَرْبَد

نوع من الصرد الأبد ينتمي الى فصيلة الصرديات ورتبة الجواثم مشرومات المناقير. موطنه يشمل البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. اعطانه اللبانية تمتد من الوسط الى الجرد والبقاع. يقيم فيها بعض الوقت في زمني الربيع والخريف. جسمه متوسط القد بطول من ٢٣ الى ٢٤ سم. وبسطته نحو ٢٤ سم. وهو ضخم الرأس، غليظ المنقاد المسنن المخطم العلوي. جناحه معتدل الانفراج والطول، عشاري القوادم، اطولها الاولى. ذنبه مستطيل القد، رتاجي الشكل، مستدير الطرف، يتألف من اثنتي عشرة رفة. ساقه حجفية القشار الامامي، سرديّة الخلفي. أصابعه قوية. مخالفه حادة.

ثوبه الى الريدة الطحلاء الزرقاء الموج تعبق في الرأس والرداء والظهر والعجز وتبييض في الزور والصدر والبطن. محسراه الى البياض الأغير يقطبهما خطّ مستعرض قرني اللون اسود الموج، يكتنف العين، يمتد من طرف الشدق الى مستوى القفن. جناحاه الى القرفة السمراء الحالكة يعلوها تبقيج أبيض يتناول اطراف المناكب وبعض قواعد القوادم والاباهر. ذنبه كجناحه الى القرفة السمراء الحالكة يعلوها حنار هامشي أبيض يطوق كامل الذنب. عيناه كبيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنية اللون. مقاده شارف المخطم العلوي، شديد السمرة الحنطية الموج. رسغاه وأصابعه الى السمرة العابقة.

الانثى أصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب.

يألف المروج والمراعي والرياض والاحراج المبعثرة الأشجار. يسرح من الشروق الى الغروب. يجثم في أعالي الأشجار ليتمكن من مراقبة كل ما هو دونه ولا يرى إلا على عمود أو سعة أو شجرة. وهو قلق، كثير الحذر، شرس الطباع، شديد الفور. قوته الحشرات والدويبات والعطاء والجوارن والعقارب والفأر والعكابر والعصافير. ومن عاداته انه يسفد قنصه في الأشواك المستطيلة او في الأفناد اليابسة ليعود اليها عند الحاجة.

N.S. Circaetus gallicus.
Fr. Circaète Jean-le-Blanc.
Eng. Short-toed Eagle.



صَرَارة المَوتَسَط،
أَبُو صَوِي

نوع من الصرارة تنتمي الى عمارة السقاوات وفصيلة الصقريات. تدعى في مصر «عقاب صرارة» و «عقاب قصيرة الأصابع». موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم واخصها بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط. وهي من اوابد لبنان تجوب جباله وسهوله طلباً للرزق.


جسمها كبير القد، رشيق القوام. طولها نحو ٦٥ سم. وبسطتها نحو ١٦٠ سم. رأسها مستعرض وكبير. عنقها قصيرة. سقطها ذلق مستطيل يلحف الذنب دون ان يتجاوزه. اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبها متوسط الطول، مقطوم الطرف، تعرضه ثلاثة خطوط سود ويحوقه اطار أبيض.

ثوبها الى الريدة السمراء تعلوها نمشة عابقة. زورها وصدرها وبطنها وخوافيها الى البياض الأغير يعلوه تبقيج اسمر. عينها الى الصفرة الزاهية اللامعة. زفدها تبيي اللون. منسرها شديد الانعفاف، قوي البهرة الدربة الحادة، لونه الى الزرقة السوداء. رسغاه معتدلنا الطول، تبييتا اللون، أصابعها قصيرة، لونها الى الصفار الباهت التبيي الموج. مخالفها مقوصة، مدببة سوداء اللون.

الانثى اكبر قدماً من الذكر إلا انها تتحلّى بذات الثوب. اليافع ادكن ثوباً وأكثر بياضاً.

تألف الجبال والاحراج المنعزلة والمناقع ومجاري الماء والسهول والشواطئ. وهي هادئة حذرة لا تهاب من الطير إلا العقاب ولا تعني بأكثر من البحث عن فريستها. تسرح من الشروق الى الغروب. قوتها الافاعي والعطاء والفأر والجرذ والعكابر والضفادع والأسماك وبعض العصافير ومختلف الحشرات الكبيرة القد والصغيرة.

تدتن وكرها في الأشجار الشامخة اخصها التنوب والشربين والصنوبر. الانثى تحضن بمنابرة الذكر من رفة الى ثلاث رفات لونها الى البياض السمانجوني او البياض الأغير. الحضن يستمر نحو اربعة أسابيع. تعتبر من الكواسر الجزيلة النفع الواجب حمايتها.



N.S. *Regulus regulus*,
Regulus cristatus.

Fr. Roitelet huppé.

Eng. Golden-crested Wren.

صَعْوَةٌ قَنْبَرِيَّةٌ، دِعْوَيْقَةٌ قَنْبَرِيَّةٌ

نوع من الصعوة وهو طائر من فصيلة الدخليات يدعى في مصر «صعو اصفر العرف» اعطانه تشمل الشرق الأوسط واروبه وتمتد من حوض البحر الأبيض المتوسط الى جبال القفقاس واوكرانيا وبولندا. وهو من اوابد لبنان يجوب احراجه الصنوبرية وبعض ادغاله باستمرار.

جسمه صغير القد، طوله نحو ١٠ سم. رأسه برتقالي الريش، اسود الطوق، اصفر المحسرين. ريش قفنه يتميز ببعض الاستطالة وبالتوتر عند الحاجة فيبدو كالاغرة في مؤخر الرأس. رداؤه وظهره وعجزه الى الخضار الزيتي. جناحاه الى السمرة البلقاء. صدره وبطنه الى الربرة الطحلاء. عيناه مكحلتان. حدقة عينه ومقاره ورسغاه الى السمرة. ذنبه فارق الطرف اسمر اللون يعلوه موج زيتي.


يألف بنوع خاص جميع اشجار الفصيلة الصنوبرية. وهو نشيط، رشيق، حذر، لا ينقطع عن الحركة والتنقل من غصن الى غصن ومن فند الى فند. ومن ميزاته انه بصاحب غيره من الطير ويخالطها فترات طويلة يستثنى منها فترة السفاد والترخيم حيث ينقطع الى العناية بانثاء وبصغاره.

يدئن في الصنوبر والتنوب على ارتفاع عشرة امتار وأكثر. الانثى تحضن مرتين في العام المرة الاولى في ايار والثانية في اواخر حزيران. حضنها يستمر نحو ١٦ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. حضنتها تراوح من ٨ الى ١٠ بيضات صغيرة القد بيضاء اللون منمّشة بالحنطي.

قوته الحشرات والهوام لذلك فهو من الطيور النافعة الواجب حمايتها.

يدئن عشه في الصنوبر. الانثى تضع من ٤ الى ٧ بيضات لونها الى الشبهة الخضراء تعلوها رقشة سمراء، الحضن يستمر نحو ١٦ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية.

يعتبر من الطيور الضارة لانه يقضي على الكثير من العصافير الصغيرة.



N.S. Oriolus oriolus,
Oriolus galbula.

Fr. Lorient vulgaire, Lorient jaune. Eng. Golden Oriole.

صَفَارِيَّة مَبْدُولَةٌ ،
صَفْرَايَةٌ مَأْلُوفَةٌ

طائر من الصفاري ينتمي الى فصيلة التبشريات الفردوسيات. من اسمائه المشهورة الصفرة والتبشر ويدعى في مصر «صغير وعصفور التوت» موطنه يمتد من الهند الصينية الى الشرق الأدنى واروبه الجنوبيه والغريه وقسم من الشماليه والشرقيه، ثم افريقيه الشماليه والشرقيه والجنوبيه. وهو من الضوارب التي تضيف لبنان في ايار ثم من اواسط تموز الى اوائل تشرين الاول.

جسمه معتدل القد، رشيقي القوام. طوله نحو ٢٧ سم. وبسطه نحو ٣٥ سم. منقاره معتدل الطول، ضليح البنية، جوي اللون، صناعي الموج. عيناه كبيرتان مكحلتان. حدقة عينه الى الحمرة الباقويه. جناحه ذلق مستطيل يلحف نصف الذنب ويتألف من احدى عشرة قادمة اطولها الرابعه واضمرها الاولى وتليها الثانيه التي يبلغ طولها نصف طول الثالثه. ذنبه متوسط القد، فضفاض الشكل، مقطوم الطرف، يتألف من اثني عشرة رفلة. ساقه معتدلة. أصابعه عفيه وقويه، مخالبه صغيره محجنه ومدببه.

ثوبه الى الصفرة الجميله المذهبه الموج. جناحاه الى السواد العاقب اللامع. لوحف قوادمه ذهبيه اللون اما اطراف القوادم والمناكب والخوافي فالى البياض الناصع. ذنبه اسود اللون مذهب الجانبين. رسغاه حجفتا القشار لونهما ولون الأصابع الى السمرة الرصاصيه الزرقاء الموج.

الانثى اصغر قدًا من الذكر وثوبها يختلف، بعض الشيء، عن ثوبه. صفحتها العليا الى الصفار الأخضر الموج. زورها وصدورها الى البياض الأغبر يعلوه توشيم داكن. ابطاها وفخذاها وافنيكها الى الخضار الذهبي. جناحها الى البني الاريد الموج. اطراف قوادمها الى الصفار الليموني.

يألف الهضاب والبراري والأحراج المبعثرة الأشجار ولا يقترب كثيرًا من العمران. يتميز بالنشط وبكثرة الحركة وسرعة الانتقال بين الأشجار. وهو شرس الطبع، كثير الحذر، لا يرى على الحضيض إلا نادرًا والوقت اللازم لالتقاط فريسته.



N.S. Regulus atricapillus.
Fr. Roitelet à triple bandeau.
Eng. Fire-crested Wren.

صَعُورَةٌ مُجَدَّعَةٌ، دِعُونِيَّةٌ مُجَدَّعَةٌ

نوع من الصعورة وفصيلة الدخليات. اعطانها تمتد من الشرق الأدنى الى اروبه باستثناء مناطقها الشرقيه والشماليه القصيه. وهي من اوابد لبنان تجوب السواحل والوسط والبقاع والجروود.

جسمها صغير القد، مطوق الرأس، مستقيم المنقار الدقيق، متوسط الجناح، قصير الذنب المقعر الفارق. طولها نحو ٩ سم. وبسطها نحو ١١ سم. رأسها أصفر اللون، اسود الطوق. محسراها مجدعان بالابيض. سائر ثوبها كالصعورة القنبريه.

تؤم الجبل في اوائل ايار وتبقى حتى ايلول ثم تعود الى الساحل هربًا من البرد. تألف الادغال والسيجات والاحراج. تنتقل بين الاشجار وعلى اغصانها وقضبانها وافنانها بخفة ولباقة لا مثيل لهما.

تدتن عشها في الأشجار الفناء، اخصها السرو والشربين على ارتفاع عشرة امتار وأكثر. عشها كويي الشكل، معتدل العمق، جيد الحبك تغلفه بالحزاز والطحلب وتبطنه بالزغب والصوف والسيب. الانثى تحضن مرتين في العام، المرة الاولى في اوائل ايار والثانية في اواخر حزيران. الحضن يستمر من ١٥ الى ١٦ يومًا تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. حضنتها لا تتجاوز ٨ بيضات صغيرة القد عاجية اللون يعلوها تقيط اسود وتميش اسمر.

قوتها الحشرات والهوام لذلك فهي من الطيور النافعة الواجب حمايتها.

N.S. *Crex pratensis*, *Crex crex*.

Fr. *Crex des prés*,
Râle des genêts,
Râle terrestre,
Roi des cailles.

Eng. *Corncrake*, *Landrail*.



صَفْرَد، سَلْوَى

طائر من التفلق قريب الشبه بالسمانى ويأتي معها في زمن واحد. يدعى في مصر «مرعة الغلة». موطنه يمتد من شمالي اروبة الى اواسط القارة الاسيوية ومنها الى افريقية الشرقية والاستوائية، يجوب بعض اصقاعها كل عام في طلب المصيف والمشتى. يعتبر من الضوارب القليلة الاقامة في لبنان لانه لا يمكث في ربوعه اكثر من خمسة أو ستة ايام. جسمه متوسط القد، طوله نحو ٢٥ سم. وبسطه نحو ٣٠ سم. يتميز برشاقة الشكل، وانضغاط العرض، وقوة المتفاد المتوسط الحجم، واعتدال العنق، وغزارة الريش الناعم، واستدارة الجناح الذي يكاد يلحف الذنب.

ثوبه الى الصهبة السمراء تلوها رقشة حنطية عابقة. اواسط ريشه الى السمرة السوداء. حواشيه الى الصهبة. ظهره اغبر المواج العابق. جناحاه موشحان بالاحمر الصنابي. صدره وبطنه الى الطحلة البيضاء. ابطاه مخططان بالسمرة. ذنبه جدعة صغيرة. اجفان عينه وردية اللون يحوقها طوق اكهب اغبر. حدقة عينه بنية. منقاده جووي المخطم العلوي، تني السفلي. ساقه واصابعه الى الجوة السمراء.

الثوب الصيفي لا يختلف عن الشتوي الا بماجة زرقاء طحلاء تكتنف اعلى الصدر وعلاطا العنق والزور، وبخط أطحل باهت يمتد فوق العين.

الانثى اصغر قدًا من الذكر وحلتها الشتوية لا تختلف عن حلتها اما حلتها الربيعية فهي أقل لمعة وطحلة وازرقاقًا.

يألف السهول والمواقع المزدرعة والمروج الطبيعية والصنعية واحصها التي تجاور زروع الحنطة. يسرح في الصباح الباكر ومن الغروب الى الظلام وفي الليالي القمرية. يعدو على الارض وبين الأعشاب بخفة ورشاقة. طيرانه سفيف بطيء الحركة، معتدل السرعة، قصير الشوط، مستقيم الخط، قريب الشبه بطيران التفلق.

وهو كثير الحذر والوجل، سريع الهرب. يقال انه جبان يخشى الصعوبة وفي المثل «اجبن من صفرد»، وقد قال الشاعر:



N.S. Falco sacer, Hierofalco saker.
Fr. Faucon sacre, Sacre.
Eng. Falcon saker, Saker.

صَقْر ، أَجْدَل ،
جَدَل ، قَطَامِي

طائر من الكواسر ينتمي الى عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . موطنه البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم اخصها البلاد الاسيوية وبعض مناطق اروبة الشرقية . يعتبر من ضوارب لبنان لانه يقيم فيه من اسبوع الى عشرة ايام خلال رحلتي الربيع والخريف . جسمه ربع القامة ، مجدول البدن الاهيف ، طويل السقطين والذنب ، محدد الرأس ، اسود العين ، قصير المنسر المسنن المخطمين ، اعقف البهرة الذرية ، امرط الساقين . طوله نحو ٥٠ سم . وبسطه نحو ١٢٠ سم . ثوبه الى البني الكستني المتفاوت الموج يعلوه تمشيح اشقح . سقطه ذلق مستطيل يكاد يلحف الذنب . ذنبه عابق الطرف ، مجدع بخطين معترضين . زوره وصدرة وبطنه الى الغبرة الطحلاء يعلوها وشم اسمر وتنميش وتبقيح . رسغاه واصابعه الى الزرقة السمراء . مخالفه قوية ، منعقة ، حادة ، سوداء اللون . يجوب البلاد من السواحل الى الجرود ويأوي الى الاحراج والغابات والجبال الجرداء على السواء . وهو اهدأ من البازي واقنع منه وابد مزاجاً واشد اقداماً واكثر إلفة . تصرفاته وسلوكه في الصيد ، وسرعة طيرانه ، وحذقه في اصابة الهدف ، تجعله في مصاف الرتبة الاولى من الكواسر . وهو لا يصيب فريسته الا في الجو لانه لا يستطيع خطفها اذا كانت جاثمة على الارض .

يدئن وكنه في صدوع الصخور النائية او في اعالي الاشجار الباسقة . انثاه تضع من ٣ الى ٤ رفنات تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع .

قوته الطير من العصفور الى البطة وكل ما استطاع اليه سبيلاً من الطيور القوية . لذلك يعتبر من الكواسر الضارة المؤذية .

«تراه كالليث لدى امنه وفي السوغى اجين من صفر»

قوته الحشرات والديدان والبذور والحبوب البرية والزراعية .

يدئن افحوصه في التربة بين الاعشاب المستطيلة الكثيفة التجميع . الاثني تضع من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع بينما الذكر يؤمن لها الغذاء . بيضها اشهب اللون يعلوه موج اخضر باهت او اصفر وتوشيم لا نظامي النقش واللون يراوح من السمرة الحنطية الى الربدة البنفسجية .

يعتبر من الطرائد الفاخرة الصنف .



N.S. Cynchramus schœniclus,
Emberiza schœniclus.

Fr. Cynchrame schœnicole,
Bruant des roseaux.

Eng. Dalmatian Reed Bunting.

طَرَبَال مُطَوَّق ،
دُرْسَة القَصَب المَطَوَّقَة

طائر من الدرس وفصيلة الشرشوريات. يدعى في مصر «بلبل الغابة». موطنه اروبة الجنوبية ويقطع في الشتاء نحو قبرص ولبنان وفلسطين وسيناء ومصر. يعتبر من الضوارب التي تقيم في لبنان من شهر الى اربعة اشهر واكثر وذلك بالنسبة الى برد فصل الشتاء ان قارساً او معتدلاً.

جسمه ربع القامة مستغلق المقدم. طوله نحو ١٥ سم. ويسطته نحو ١٨ سم. ثوبه الى الطحلة البنية يعلوها توشيح كستني. رأسه وزوره الى السمرة السوداء يعلوها موج كستني لان حافات ريشهما كستنية. ويمتد من قاعدتي الشدقين خطان ابيضان فاصلان بين المحسرين والزور ثم يتصلان بقلادة بيضاء تطوق الرأس من القفن الى اسفل الزور. ويعلو الرداء والظهر والعجز خطوط كستنية تتخللها خطوط سود. الجناح متوسط الطول، اطول قوادمه الأربع الاولى، وهو بني اللون يعلوه تمشيح داكن يعود الى حافات الريش الكستنية الداكنة. ذنبه معتدل القد، فارق الطرف، كستني اللون، داكن الموج، ابيض الاطراف الوحشية والانسية. صدره وبطنه الى الغبرة البيضاء. ايظاه موشحان بالبني. عيناه مطوقتان بالبني. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده مخروطي الشكل، قصير القد، صلب المادة، مدبب الطرف، سبوري اللون، اسود الموج. رسغاه واصابعه الى البني الداكن.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وثوبها قريب الشبه بثوبه. رأسها الى البني الداكن يعلوه موج كستني. زورها الى البني الاحمر تخالطه مشحة بيضاء ويعلوه خطان قاطبان يمتدان حتى الصدر والصدر موشم بالبني الداكن.

يألف المناقع والآجام والمراعي وضفاف مجاري الماء. يسرح اسراباً صغيرة لا يتجاوز عددها ٣٠ زوجاً. ويبيت غالباً في مواقع معينة يرتادها عند المساء. يتميز بعدم الوجل وبخفة الانتقال على النبات. شوطه قصير القاب تتخلله بعض المباغيات كالارتفاع السريع غير المنتظر ثم الانقضااض شبه العمودي.



N.S. Falco lithofalco, Falco œsalon.

Fr. Faucon-émérillon, Émérillon, Rochier. Eng. Merlin.


صَفْر الجِرَاد ،
يُؤْبُو ، جِرَادِيَّة

طائر من الكونج وفصيلة الصقريات. كنيته أبو رياح ويدعى الجلم لخفة جناحيه وسرعة انقضاضه وهو حر المزاج، قوي الشكيمة، بطاش، شجاع. موطنه آسية الوسطى وينتشر شرقاً حتى الصين واليابان ويقطع في الشتاء الى الشرق الاوسط وقبرص ومصر والسودان والحبشة. يعتبر من ضوارب لبنان لانه يقيم في ربوعه نحو ١٥ يوماً عندما يكون في طريق رحيله نحو السودان والحبشة.

جسمه صغير القد، جميل القالب. طوله نحو ٢٦ سم. ويسطته نحو ٦٠ سم. ثوبه اغبس انمر تتخلله رقشة بنية وتوشيم اسود. زوره وصدره وبطنه الى البياض الاغبر الفضي الموج يعلوه وشم نظامي الترتيب، عابق السمرة. رأسه مستعرض الشكل، عيناه كالياقوت يكتنفهما اطار اصفر. منسره اصفر الزبد، قصير الجرم، شديد الاحدياب، قوي البهرة الذرية الحادة، ازرق اللون، اسود الموج. سقطه ذلق مستطيل، يلحف الذنب. ذنبه اميل الى القصر من الاعتدال. رسغاه قصيرتان عاريتان. اصابعه معتدلة الثخانة والطول. مخالفه مقوسة مدببة سوداء اللون.

الانثى اكبر قدماً من الذكر واعقب ثوباً واكثر بياضاً وصبغة رمادية. اليافع كالانثى البالغة الا انه عادم الموج الاكهب في الرداء والظهر وأظهر منها في اللون البني. يألف المواقع المبعثرة الاشجار من الهضاب والجبال. قوته القواضم والعطاء والجراد وبعض العصافير.

يدئن وكنه في اوقاب الصخور وفي قنن الاشجار الباسقة. اناثه تبيض نحو ٥ رفنات تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع بينما الذكر يؤمن لها الغذاء. يعتبر من الكواسر النافعة لان نسبة اضراره لا تتجاوز ١٥ او ٢٠ %.



N.S. Totanus calidris, Tringa totanus.

Fr. Chevalier gambette,
Chevalier à pieds rouges.

Eng. Redshank, Common Sandpiper.

طَيْطَوَى أَحْمَرُ السَّاقِ

طائر من عمارة الطوطانيات وفصيلة دجاجيات الارض. اعطانه تمتد من اواسط البلاد الاسيوية الى معظم بلاد اروبة وبعض مناطق افريقية الشمالية. وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان وقتاً قصيراً يراوح من اسبوع الى اسبوعين. جسمه رشيق القوام. طوله نحو ٢٨ سم. وبسطته نحو ٤٥ سم. يتميز بطول الساق واستطالة المنقار الجالس وتديب الجناح واندلاق الذنب المخروطي الشكل وتغيير الثوب عند التحسير مرتين في السنة.

عيناه خرنوبيتان. منقاده احمر الانتشاب، جووي الافك الاعلى، برتقالي الاسفل. ساقاه واصابعه الى الحمرة القرمزية السمراء المواج.

ثوبه الشتوي الى الريدة السمراء يعلوها مواج زيتي. رداؤه وظهروه وعجزه بيض. قوادم الجناح الى البني الداكن، اطول قوادمه الاولى. خوافيه الى الريدة البيضاء. ذنبه ولواحفه العليا مستنجة ومخططة بالبني والابيض. لواحفه السفلى الى البياض العاجي تغشاها بعض الخطوط البنية الباهتة. زوره وصدره وبطنه الى البياض الموشم بالبني. ابطلاه موشحان بالرمادي الاغبر. ثوبه الصيفي اظهر ربة في الاجزاء العليا ويتخلل رداءه ريش اسود وعلى الرأس والعنق خطوط بنية كثيفة وعلى المنكبين خطوط سود. زوره وصدره وابطلاه مرقوشة بالاسود وفيما عدا ذلك فلا يختلف عن الثوب الشتوي.

الشقان لا يختلفان قدماً وثوباً. واليافع كالبالغ باستثناء حواشي لواحف الجناح البيضاء اللون ثم الساق والاصابع التي يغلب فيها اللون البرتقالي الباهت.

يتميز بكثرة الحذر وبشدّة النشاط وسرعة الحركة وقوة الطيران وخفة العدو وحسن السباحة. يألف المناقع ومجاري الماء وضايف الانهر. قوته الديدان والقشريات والرخويات. يدتن عشه بين اعشاب المناقع. عشه افحوص مستدير الشكل، متوسط الانخفاض، قليل البطانة تضع فيه الانثى نحو ٤ بيضات لونها الى الريدة يعلوها تمشيح اخضر ومواج اصفر. الحضن يستمر من ٢٢ الى ٢٥ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.


يعتبر من الطيور النافعة ومن الطرائد المرغوب فيها.

يدتن عشه على الارض بين الاعشاب الكثيفة. جباكه قش ناعم يغلفه بالاوراق اليابسة ويبطنه بالصوف والسبب والزغب.

الانثى تحضن مرة واحدة في العام ويكون ذلك في خلال شهر تموز. حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر من ١٣ الى ١٤ يوماً. بيضها مستطيل الشكل، اربد اللون، تعلوه رقشة سمراء عابقة وتنقيط بنفسجي.

قوته في الربيع والصيف والخريف الحشرات المجنحة على اختلاف انواعها واخصها التي تعيش قرب الماء وعلى سطحه. اما في الشتاء فقوته يرتكز على مختلف انواع البزور.

يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى.



طَيْطَوَى أَخْضَر ، نَسَّاسَة

N.S. Totanus ochropus, Tringa ochropus.
Fr. Chevalier cul-blanc.
Eng. Green Sandpiper.

يدتّن بين اعشاب المناقع في افحوص معتدل الانخفاض وثير البطانة تضع فيه الانثى نحو
٤ بيضات لونها الى الشبهة تعلوها نمشة حنطية خفيفة . الحضان يستمرّ نحو ثلاثة اسابيع تقوم
به الانثى بمنابرة الذكر الذي لا يستكن على البيض اكثر من اربع ساعات في النهار .
يعتبر من الطرائد المستحبّة العادمة النيرج المميّز .


طائر من عمارة الطوطانيات وفصيلة دجاجيات الارض . اعطانه معظم مناقع ومجاري
مياه حوض البحر الابيض المتوسط ، يجوب في مصيفه ومشتاه اكثر بلاد الشرق واروية وافريقية
الشمالية والشرقية . وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان وقتاً قصيراً لا يتجاوز ثلاثة اسابيع .
جسمه رشيق القوام . طوله نحو ٢٦ سم . وبسطته نحو ٤٢ سم . يتميّز بطول الساق
واستطالة المنقاد الجالس ، وكبر الجناح الذئق الذي يكاد يلحف الذنب ، واعتدال الذنب
المقطوم الطرف وتغيير الثوب عند التحسير مرتين في السنة .

عيناه مستديرتان خزنويتان . منقاده اخضر الانتشاب اسمر الجرم . ساقاه واصابعه الى
الخضار الاسمر الزيتي المواج .

ثوبه الشتوي متراكب الالوان . رأسه ومحسراه حتى اعلى الرداء الى البني الرمادي المواج .
كل صدغ من صدغيه مجذع بخط قاطب ابيض يمتد من المنشق الى الففن ماراً بمستوى
طوق العين . رداؤه ومنكباه الى الحنطي العابق يعلوه توشيح ابيض . ظهره وعمجه الى البياض .
لواحف جناحيه الى البني الداكن تعلوه رقشة غبراء . قواده سود . ذنبه ابيض الانتشاب والنصف
الاول ، مجذع النصف الاخير ، حتى الطرف ، بخطوط سود معترضة . زوره وصدرة الى
البياض المنمش بالحنطي . بطنه وافنيكه الى البياض الناصع . ابطاه وابطاه الى السواد المجذع
بالابيض .

ثوبه الصيفي اعبق لوناً من الشتوي ويعلوه مواج اخضر وسفعة حنطية وتبيح اصفر .
الشقان لا يختلفان قدماً وثوباً . واليافع كبير الشبه بالبالغ .
يتميّز بالوجل والحذر والنشاط وبسرعة الطيران والحركة وبخفة الانتقال على الارض
وبجودة العم والسباحة .

يألف المناقع ومجاري الماء وجرف الانهر واخوارها . قوته الديدان والقشريات والرخويات
والضفادع والحشرات المختلفة .



N.S. Prunella collaris.
Fr. Accenteur alpin, Pégot.
Eng. Alpine Accentor.

عُصْفُورُ الشُّوكِ الجبليّ

طائر آبد من عصافير الشوك وفصيلة الشحروريّات. موطنه جبال الشرق الاوسط واروبّة. جسمه متوسط القدّ، طوله نحو ١٨ سم. وبسطته ٢٠ سم. ثوبه الى الطحلة تعلوها رقشة مستطيلة تكتنف القفن والرأس والرداء والظهر والعجز. جناحه مجدّع بخطّين ابيضين. ذنبه ابيض الطرف. زوره ابيض اللون تعلوه رقشة سوداء. صدره وبطنه وابطاه الى الطحلة الغبراء يعلوها ترقيط أشقح صناعي. عيناه مكحلتان. حدقة عينه حنطيّة صناعيّة المواج. منقاره صغير القدّ، شديد الصلابة، اصفر القاعدة، اسمر الجرم. رسغه حجفيّة القشار، حنطيّة اللون. مخالبه دقيقة محجّنة سمراء اللون.

يألف الجبال والجرود في الصيف وهضاب الوسط والادوية في الشتاء. يتميّر بالخفة والرشاقة وعدم الوجل. طيرانه سفيف متوسط السرعة، ازور الخط المتّوجّج، باستثناء زمن السفاد حيث يرتفع عاليًا ويحلّق ويحوم. قوته الحشرات والهوام والعناكب والديدان والثمار النوويّة الحرجيّة وبزور النباتات البرية اخصّها الشوك.

يدتّن في الارض وبين صدوع الصخور وفي تجاويف الاشجار. عشه صاجبي الشكل، جيّد الحبك، كثيف الجانب، وافر البطانة التي تتألف باكثريتها من صوف الغنم وشعر الماعز. الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين في السنة، المرّة الاولى في ايار والثانية في تموز. يبضها مستطيل الشكل، اخضر اللون، ازرق المواج. الذكر يناوب الانثى في الحصن الذي يستمرّ من ١٣ الى ١٤ يوماً.

يعتبر من العصافير المتوسّطة النفع.



N.S. Tinnunculus alandrius,
Falco alandrius.
Fr. Crécerelle commune,
Émouchet doré.
Eng. Common Windhover.

عَاسُوقٌ مَعْرُوفٌ ، عَوْسُق

طائر من العاسوق وفصيلة الصقريّات. اعطانه العالمية فسيحة الارحاء تشمل معظم المناطق الاسيوية والارويّة وافريقية الشماليّة. يعتبر من ضوارب لبنان لانه يقيم فيه بعض الوقت في زمن رحيله نحو اروبّة الجنوبيّة والشرقيّة وفي زمن عودته نحو افريقية الشرقيّة.

جسمه جميل الشكل والهندام، رشيق القوام، طوله نحو ٣٢ سم. وبسطته نحو ٥٠ سم. ثوبه الى الحمرة الصنابيّة المذهبة المواج. رأسه وعنقه الى الربدة الزرقاء. رداؤه وظهره ومناكبه الى الجوّرة الصنابيّة المجدّعة بخطوط مزويّة الشكل، سوداء اللون. صدره وبطنه وابطاه منمّشة وموشّمة بالاسود. سقطه ذلق مستطيل يكاد يلحف الذنب، قواده الى السمرة السوداء، اطار قواده الى الربدة الحنطيّة الصنابيّة المواج. ذنبه متوسط الطول، ثوبه الى الربدة الزرقاء تعلوها، في الزام الاخير، جدّة سوداء مستعرضة يكتنفها اطار ابيض. عيناه مطوّقتان بالازرق. حدقة عينه كستنيّة اللون. منسره ضليع، قصير القدّ، ازرق اللون، اصفر الزفد، اسود البهرة الحادة القوية التحجين. رسغه دقيقة عريضة صفراء اللون كالاصابع. مخالبه سود.

الانثى اميز قدًا من الذكر وثوبها اعبق من ثوبه وهو اكدف رقشة وتوشيمًا. يألف جميع الاماكن دون استثناء. طيرانه خفيف الحركة يكثر فيه السفيف ويقلّ فيه التحليق. قوته القواضم واخصّها الفأر والعكابر ثم العطاء والضفادع والحشرات. يدتّن وكنه في الاشجار الشامخة. اناثه تضع من ٤ الى ٧ رفنات نحضنها وحدها نحو ٢٨ يوماً بينما الذكر يؤمّن لها الغذاء.

يعتبر من الكواسر النافعة لانه يقضي على معظم القواضم الضارّة.

N.S. Aquila clanga,
Aquila nœvia.

Fr. Aigle criard.

Eng. Spotted Eagle, Rough-footed.



عُقَاب سَقْعَاء، صَقْر الأَرَب

طائر من العقبان وفصيلة الصقريات. تدعى في مصر «عقاب سقاء كبرى» اعطائها المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم. تعتبر من ضواري لبنان لأنها لا تنقطع عن التحليق في اجوائه طوال فصل الخريف.

جسمها كبير القد. طولها نحو ٧٢ سم. وبسطة سقطيها نحو ٢٠٠ سم. سقطها كبير القد، ذلق الطرف، اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ثوبها الى السمرة الموشمة يعلوها موج اسفح يزيد لها لمعة واسوداداً. خوافي سقطيها الى السمرة الزرقاء. ايظاها ابهت لوناً من صدرها وبطنها. ذنبها يتكوّن من ١٢ رفة وهو حنطي اللون، اسمر الموج يعلوه تجذيع معترض اصهب. عيناها كبيرتان. حدقة عينها عنابية اللون، رمادية الماجة. منسرهما قصير الجرم، مسن الحافة العليا مشروم السفلى، اصفر الزفد، ازرق القاعدة، اسمر الجسم، حنطي البهرة المحجّنة الذرية. ساقها مسرولة وقصيرة. اصابعها كبيرة. مخالبيها قويّة، منعقة، حادّة.

الانثى اكبر قدّاً من الذكر والشقّان لا يختلفان في الثوب. اما اليافع فلا يرتدي ثوب البالغ الا بعد اكتمال الاربع سنوات من عمره وهو قبل ذلك داكن السمرة، حنطي الرأس والقفن، مرقوش الثوب بالاصفر والاغبر والابيض.

تألف الجبال الشاهقة ومجاري الماء وترغب في الاماكن الرطبة. وهي شديدة البأس، يابسة المزاج، حادّة البصر، سريعة الطيران. تصيد فريستها ولا تقع على الجيف الا اذا عضها الجوع.


تدثّن ولكنها في صدوع الصخور النائة او في قن الاشجار الكبيرة الباسقة. الانثى تحضن رفتين مرّة واحدة في العام. الترخيم يستمر من ٣٢ الى ٣٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء والحماية. والفرخ لا يهجر الوكن قبل عشرة اسابيع.

تعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها لأنها تقضي على جميع القواضم والزحافات بما فيها الافاعي.

N.S. Prunella modularis.

Fr. Accenteur moucheté,
Accenteur mouchet,
Mouchet chanteur,
Traîne-buisson.

Eng. Hedge Accentor,
Hedge Sparrow.



عُصْفُور الشُّوك الصَّغِير

طائر أبد من عصافير الشوك وفصيلة الشحروريات. موطنه الشرق الادنى ومعظم الاصقاع الارويّة.

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٥ سم. وبسطه ١٦ سم. رأسه وزوره وجوشنه الى الربدة. رداؤه وظهره وعجزه ومناكبه الى الصحرة يعلوها توشيم مستطيل عابق. جناحاه وذنبه الى الربدة السمر. بطنه وخوافيه الى الصهبة الحنطية تعلوها رقشة سمر مبعثرة خفيفة. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره اسمر. رسغاه واصابعه الى الجؤوة. مخالبه دقيقة مستطيلة محجّنة سمر اللون.


يألف الحدائق والادغال والسيجات واحراج الصنوبر والتنوب. يتميز، كسائر انواع جنسه، بالخفة والرشاقة وعدم الوجل. طيرانه كثير السفيف قليل التحليق والحوم. قوته الحشرات على اختلافها واليزور البرية والزراعية. يدثّن في الادغال والاشجار والفاء. عشه صاجي الشكل، جيد الحبك، يبطنه بالصوف والشعر والسيب. الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين في السنة، المرّة الاولى خلال شهر ايار والثانية خلال شهر تموز. بيضها سمانجوني اللون عادم الرقشة. الانثى والذكر يتناوبان على حضن البيض الذي يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً.

يعتبر من العصافير المتوسطة النفع.

N.S. Aquila pennata,
Aquila minuta,
Aquila nipalensis,
Hieractus pennatus.

Fr. Aigle botté, Aigle nain,
Aigle des steppes.

Eng. Steppe Eagle, Booted Eagle.



عُقَاب مُسَيَّرَة ، عُقَاب البَادِيَة ، خُدَارِيَة

طائر من العقبان وفصيلة الصقريات . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة تجوبها طلباً للرزق والمصيف والمشتى . تعتبر من عواير لبنان لانها تقيم فيه بعض الايام وذلك في زمن رحيلها نحو البلاد المعتدلة الحرارة او في زمن عودتها نحو البلاد الحارة .

جسمها متوسط القد . طولها نحو ٦٠ سم . وبسطنتها نحو ١٢٠ سم . ثوبها مختلف الالوان . قمة رأسها ومحسراها وعتقها الى الشقحة تملؤها رقشة مستطيلة سمراء . قفنها ورداؤها وظهرها وسقطها وذنبها الى السمره الحنطية يعلوها في حثار السقطين تسنيج اسمر داكن . جبهتها ومنكباها وعجزها وزورها وصدورها وبطنها وخوافيها الى البياض الناصع يعلوه توشيم اسمر خفيف في الصدر وفي اعلى البطن . عينها كبيرتان . حدقة عينها صناعية اللون . منسرها غليظ الشكل ، شديد الانعقاد ، كبير الشدق ، مسنن الحافة العليا ، مشروم السفلى ، حنطي اللون ، اسمر البهرة ، اصفر الزرد . ساقها نصفية السرولة . رسغاها واصابعها الى الصفرة الخضراء الموج . مخالباها قوية ذرية .

الانثى اكبر قدماً من الذكر وابهت ثوباً منه اما اليافع فانه ابهت ثوباً من البالغ وهو مجدع الذنب عادم البياض في المتكبين .

تعيش ذكراً وانثى كسائر العقبان وتألف الحياة الجماعية . سر بها يعد من زوجين الى ستة ازواج .

تحوم فوق السهول والوادي والجبال والاحراج سواء كانت كثيفة الاشجار او مبعثرتها ولكنها لا تنقطع عن ورود مجاري الماء .

تصيد القواضم المختلفة وما تستطيع إليه سبيلاً من الطير كالبرقش والزرزور والغراب والزاع الخ ...

الانثى تحضن مرة واحدة في السنة من رفتين الى ثلاث رفات . الترخيم يستمر من ٣٢ الى ٣٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية . اما الفراخ فلا تهجر الوكن قبل مرور ٩٠ او ٩٥ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة لانه يقضي على الضارة .



N.S. Aquila imperialis, Aquila heliaca.

Fr. Aigle impérial.

Eng. Imperial Eagle.

عُقَاب قَيْصَرِيَّة ،

مَلِك العُقْبَان ، خَائِنَة ، خَاطِيَة

طائر من العقبان وفصيلة الصقريات . اعطانها تمتد من الشرق الاقصى الى الشرق الاذني واروبه وافريقية الشمالية والشرقية تجوبها طلباً للرزق والمصيف والمشتى . تعتبر من عواير لبنان لانها لا تقيم فيه في اثناء قطوعها اكثر من يوم او يومين .

جسمها كبير القد . طولها يراوح من ٨٠ الى ٩٠ سم . وبسطة سقطها تراوح من ٢٢٠ الى ٢٤٠ سم . وهي تأتي في تصنيف العقبان بعد العقاب الذهبية التي تعتبر اكبر العقبان وابطشها واجلها . ثوبها اصداً الصهبة ، اسفع الموج تملؤها مشحة صناعية في الرأس تمتد من القمة الى القفن . سقطها كبير القد ، ذلق الطرف ، اطول قوادمه الثالثة والرابعة . ذنبها متجانس الريش يتكوّن من ١٢ رفة ويعلوه توشيم اطحل لا قياسي الشكل والحجم لانه يختلف بالنسبة الى السن . وهي تتميز باستطالة الشدق الذي ينتهي ابعد من مؤخرة العين . حدقة عينها الى الحمرة الياقوتية الرمادية الموج . منسرها قصير الجرم ، مسنن الحافة العليا ، مشروم السفلى ، واسع الشدق ، اصفر الزرد ، ازرق القاعدة والجسم ، اسود البهرة المحجّنة الذرية . ساقها مسرولة . اصابعها كبيرة ، حنطية اللون . مخالباها قوية شديدة الانعقاد والصلابة والحدة .

الانثى تتحلّى بثوب الذكر ولكنها اكبر قدماً منه . اما اليافع فلا يرتدي ثوب البلوغ الا بعد اكتمال الاربع سنوات وهو قبل ذلك داكن الصهبة تملؤها رقشة غبراء وتباقيج بيض .

تألف الجبال والاحراج والسهول ولا تخشى الاماكن الآهلة . وهي من انبل الجوارح واهيها واعتاها واشدها بأساً وأيسها مزاجاً واحدها بصراً واسرعها طيراناً .

تصيد الاريل والياومر والوعل والمغزاة والحمل والثعلب والكلب والسنور والسمور والقنفذ والقواع والارنب وكبير الطير على اختلاف الاجناس والانواع والرحافات والافاعي .

تدئن وكنها في قنن الاشجار الكبيرة الشامخة الرفيعة او في صدوع الصخور الناتئة .

الانثى تحضن مرة واحدة في العام من رفتين الى ثلاث رفات . الترخيم يستمر نحو خمسة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية . اما الفراخ فلا تهجر الوكن قبل مرور ٩٠ او ٩٥ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة لانه يقضي على الضارة .



N.S. Pica caudata.

Fr. Pie vulgaire, Pie bavarde.

Eng. Common Magpie.

عَقَقُ مَعْرُوفٌ ،

عَقَقُ مَبْدُولٌ ، كُنْدُشُ مَبْدُولٌ ، قَعَقُ

طائر من العقق وفصيلة الغراييات. اعطانه تشمل اكثر مناطق العالم القديم وهو مبدول في معظم بلاد الشرق الاوسط ومنها لبنان حيث يقيم بعض الوقت خاصة في رحلة الخريف. وقد اختلفوا في سبب تسميته عققاً فقال الجاحظ لانه يعق فراخه كسائر الغربان فيتركها بعض الوقت بلا طعام. وقبل اشتقاق من صوته المعروف بالعَقَقَة او القَعَقَة. العامة تسميه القَعَقُ والعرب تضرب به المثل في السرقة والخيانة والخبث. قال الشاعر في وصفه:

اذا بارك الله في طائرٍ فلا بارك الله في العقق
طويل الذنابي قصير الجناح متى ما يجد غفلة يسرق
يقلّب عينيه في رأسه كأنهما قطرتا زئبق

جسمه متوسط القدّ طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه نحو ٥٠ سم. ثوبه ابيض اللون. رأسه وعنقه وزوره وظهره وعجزه الى السواد الخملي الاسفع تعلوه ماجة خضراء في قمة الرأس والجبهة. جناحه وذنبه الى السواد الفحميّ تعلوه موج قزحيّ الالوان يتغيّر بالنسبة الى انعكاس النور من الاخضر الى الازرق والارجواني والبفسجيّ. صدره وبطنه وكلّ جناحه الى البياض العاجيّ. جناحه متوسط الطول، مستعرض الشكل، ذلق الطرف. ذنبه مستطيل القدّ، رتاجيّ الريش، طوله يعادل طول الجسم لانه يبلغ نحو ٢٥ سم. حدة عينه كستية اللون شديدة السمرة. مفقاده وساقاه واصابعه الى السمرة القاتمة.

الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب.

يألف في لبنان بعض مناطق الوسط والجرد وهو يفضل الاحراج والحدائق على الزروع والاراضي المدحاة. يعيش ذكراً وانثى من اوائل الربيع الى اواسط الخريف ثم يجتمع الى اسراب صغيرة تعدّ بعض الأزواج.

طيرانه بطيء الحركة، ثقلها، قصير الشوط. انتقاله على الارض طفر كانتقاله على الاغصان.



N.S. Aquila fasciata,
Pseudaeetus bonelli.

Fr. Aigle à queue barrée,
Pseudaète.

Eng. Bonelli's Eagle.

عَقَابٌ مُؤَزَّرَةٌ ، سَهُوكٌ


طائر من العقبان وفصيلة الصقريات. موطنه يمتد من الهند الصينية الى الشرق الاوسط واليونان وايطاليا وفرنسة واسبانيا وافريقية الشمالية يقيم فيها صيفاً وشتاءً ولا ينزح عن منطقة الى غيرها الا عند انقطاع الرزق. يعتبر من عواير الجرد اللبنانية واخصها جرد الشمال.

جسمه ممشوق القوام. طوله نحو ٧٠ سم. وبسطه نحو ١٣٠ سم. ثوبه الى البني الاسمر الاسفع الموج. سقطه مؤزّر بالابيض ومنقّط بالاسود. ذنبه متوسط الطول موشح بخطوط معترضة لونها الى البياض العاجي. خوافيه الى البياض الاغبر تعلوه خطوط لولبية لا قياسية العرض بنية اللون، حدة عينه برتقالية صناعية. زفده اصفر اللون. منسره كبير القد لونه الى الزرقة السمراء. بهرته محدبة مستطيلة تعلوها موج حنطي. ساقه كبيرة مسرولة. اصابعه الى الصفرة السمراء، مخالبه مستطيلة متوسطة الانعقاد.

الانثى اكبر قدماً من الذكر والشقان لا يختلفان في الثوب. اما اليافع فانه يتميز عن البالغ باصفرار الرأس وباحمرار العنق من جهته اليمنى واليسرى ويتميّز ايضا بانحراف لون الصدر والبطن نحو الحنطي وبكثرة الخطوط المعترضة في الذنب.

يعيش ذكراً وانثى كسائر العقبان. يألف الجبال العاتية والغابات والاحراج ومجاري الماء. طيرانه تحليق وحوم وانقضاض وهو من اسرع العقبان وارشقها واخفها جناحاً. يصيد البط والاوز والبعج والحوصل والبلشون والنحام والحمام واليمام والغراب والزراغ والقاق والزرياب والقواضم المختلفة.

يدثن وكنه في صدوع الصخور المنيعة النائية. انثاء تبيض رفتين تحضنهما وحدها نحو اربعة اسابيع بينما الذكر يؤمن لها الغذاء. الفراخ لا تهجر الوكن قبل عشرة اسابيع. يعتبر من الكواسر المتوسطة النفع.



N.S. *Melanocorypha calandra*.
Fr. Calandre commune.
Eng. Calandra.

عُلَّعْل مَعْرُوف ،
عُلَّعْل مَبْدُول ، عُلَّعْلَة

طائر من العلعل وفصيلة القَبْرِيَّات . يدعى في مصر «قنبرة الغرب الكبيرة» . موطنه يمتد من الهند الى الشرق الاوسط واروثة الجنويّة وافريقية الشرقية والشمالية . وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان بعض الاسابيع .

جسمه متوسط القدّ . طوله نحو ٢٠ سم . وبسطته نحو ٢٨ سم . منقاره معتدل الجرم ، شبه مخروطي الشكل . مدبّ الطرف . جناحه ذلق مستطيل يميّز بطول خوافيه ولكنها لا تتقدّم القوادم . ذنبه معتدل الطول مقطوم الطرف . ساقه واصابعه دقيقة ، مخلب الاصبع الخلفية كبير القد ، عادم التحجين كانه شوكة غليظة .

ثوبه الى الصهبة يعلوها موج احمر وتوشيم اسود في الرأس والرداء والظهر والجناح . قوادم الجناح اعقب من الخوافي البيض الاطراف . زوره ابيض اللون تعلقه من جهتي العنق بقعة سوداء . صدره الى الصهبة الصفراء تعلقها رقطة سوداء . بطنه وايتلاه الى البياض الاصفر الموج . ذنبه كستني اللون ، ابيض الحتار الخارجي . عيناه كبيرتان مستديرتان . حدقة عينه بنية اللون . منقاره الى الحنطي الاسمر . رسغاه واصابعه الى الحنطي الباهت .

الانثى اصغر قدًا من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب .

يتميّز بشدوه العذب وباقتباس وترديد انغام غيره من الطير .

يألف الحقول المزروعة والمراعي والبقاع والسهول . قوته البزور والحبوب وبعض الحشرات

في زمن الحضان والترقيم .

يدنّ افحوصه في المراعي وبين الزرع . انثاه تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات .

يعتبر من الطيور القليلة النفع ومن الطرائد الكاعنة .

قوته الحشرات والديدان والرخويّات والحبوب والثمار وبيض العصافير . ومن طباعه اختطاف كل ما يبهر النظر .


يدنّ عشه في اعالي الاشجار الباسقة او في الشجيرات الشائكة . عشه صاجي الشكل ، كبير القدّ ، تظللّه قبة يغلفها بالطين ويبطن العش بالقش الناعم والحشيش الدقيق . الانثى تضع من ٦ الى ٧ بيضات لونها الى الزرقة الباهتة الخضراء الموج يعلوها توشيم اسمر متقارب النمشة . الحضان يستمرّ نحو ٣ اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء . والفراخ تهجر العش بعد النقف باربعة اسابيع .

يعتبر من الطيور الضارة المؤذية .

N.S. Corvus cornix.

Fr. Corneille mantelée,
Corneille cendrée,
Corbeau mantelé.

Eng. Hooded Crow.



غُرَابُ أَبْقَع ، قَاق

طائر من الغربان وفصيلة الغرابيات . اعطانه فسيحة الارحاء بلبد في بعضها ويجوب البعض الآخر طلباً للمصيف والمشتى . وهو من اوابد لبنان المبذولة في جميع مناطقه واقليمه . جسمه متوسط القد ، طوله نحو ٥٠ سم . وبسطته نحو ٦٥ سم . رأسه وعنقه وزوره وصدره وسقطاه وذنبه ومنقاده وساقاه واصابعه الى السواد العابق الاسفع المواج . رداؤه وظهره ومنكباه وعجزه وبطنه الى الربدة الطحلاء تعبق في الذكر وينحرف مواجها الى الشقحة في الانثى . والانثى اصغر قدماً من الذكر . عيناه كبيرتان . حدقة عينه سوداء . منقاده كبير القد ، ضليع البنية ، اسود اللون .

يألف الحقول المزدرعة والسهول والهضاب والروابي والمراعي وضايف الانهر وشواطئ البحر . يعيش جماعات متفاوتة العدد . طيرانه تحليق وحوم وسقيف . شوطه متوسط القاب ، متعاقب التجديف والسكون كسائر ابناء جنسه وهو يحط على الارض كالعصفور ولا يقص عمودياً كالكواسر .

قوته الحشرات والديدان والدويبات والفأر والعكابر والعطاء والاسماك التي يلفظها البحر والقشريات وجلايط العصافير وبذار الحنطة والزرور المختلفة والحبوب الناشئة . يياشر الصيد مع الشروق وينقطع عنه عند الظهيرة ثم يعود اليه من العصر الى الغروب .


يدئن عشه في الاشجار الباسقة . عشه كبير القد ، صاحي الشكل ، قطره لا يقل عن ٦٠ سم . وارتفاع حافته نحو ١٠ سم . بطانته من القش الناعم والرناث والصوف والسبيب . الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى الزرقة البحرية الباهتة يعلوها تنقيط حنطي وتنميش اسمر . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء . والفراخ تهجر العش بعد النقف بخمسة اسابيع .

يعتبر من الطيور المؤذية الضارة .

N.S. Luscinia megarhyncha,
Philomela luscinia.

Fr. Rossignol chanteur.

Eng. Nightingale.



عَنْدَلِيب

طائر غريد من الهزار وفصيلة الدخليات . يدعى في مصر « هزار اوروي » موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الجنوبية والغربية وافريقية الشمالية والشرقية يجوب اصقاعها دون ان يتجاوزها الى الاقاليم الباردة او الاستوائية . وهو من الضوارب التي تقيم في الربوع اللبنانية نحو سبعة اشهر .


جسمه صغير القد رشيق القوام . طوله نحو ١٦ سم . وبسطته نحو ٢٢ سم . ثوبه الى السمرة الحنطية الشفراء تعبق ويعلوها مواج بني عند الرأس والظهر . جناحه متوسط الطول والانفراج تعلوه مشحة صناعية خفيفة . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف ، كستني الماجة اسفع اللمعة . زوره وبطنه الى البياض الاغبر الاطحل المواج . صدره وابطلاه الى الربدة الزاهرة تعلوها مشحة صناعية . عيناه مطوقتان بهالة باهتة . حدقة عينه كستنية اللون . منقاره صغير القد ، مدبب الطرف ، اسمر اللون . رسغاه واصابعه الى الحنطي الباهت .

الشقان لا يختلفان قدماً وثوباً . واليافع منه كالبالغ . يألف الحدائق والغابات والادغال . ينتقل بين الاشجار وعلى الاغصان برشاقة ويعدو على الارض بخفة ولباقة .

يتميز بجودة عدلته وحسن صوته الطروب وكثرة انغامه الشجية وصفاء نبرته وابداع اوتار حنجرته .

قوته الحشرات المختلفة الاجناس والانواع والاساريع والديدان والنمل . يدئن في العوسج او في الجنبات الشائكة الفناء على ارتفاع ذراع او ذراعين عن سطح الارض . عشه قدسي الشكل ، جيد الحيك يطنه بالسبيب والصوف . الانثى تحضن مرة واحدة في العام من ٥ الى ٦ بيضات سمراء اللون تعلوها رقشة زرقاء خفيفة . الترخيم يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

يعتبر من العصافير الجزيلة النفع الواجب حمايتها .



N.S. *Pyrrhocorax graculus*.
Fr. Chocard, Corbin chocard.
Eng. Chough (Lebanon form).

غُرَابٌ لُبْنَانِيّ، زُمَّتٌ لُبْنَانِيّ

طائر من الغربان وفصيلة الغرابيات. موطنه يشمل معظم مناطق الشرق الادنى واروبّة الجنوبية والغربية - وهو من اوابد لبنان المبذولة.

جسمه صغير القدّ. طوله نحو ٤٠ سم. وبسطته نحو ٥٦ سم. ثوبه الى السواد العابق تعلوه لعة متبانية المواج تراوح بين الاخضر والازرق. سقطه ذلق مستطيل يكاد يلحف الذنب. ذنبه متوسط القد. مستدير الطرف، عشاري الرقال. عيناه كبيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستية اللون. منقاده مستغلظ الشكل، كبير القدّ، ضليع البنية، اصفر اللون. ساقاه واصابعه الى الجؤوة. مخالبه الى السمرة السوداء وهي متوسطّة الطول، حادّة الاطراف الدقيقة.

الانثى اصغر قدّاً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب. واليافع كالبالغ.

يألف الجبال والبقاع في الصيف ويعيش في الوسط وقرب الشطوط في الشتاء. طيرانه لا يختلف عن طيران غيره من الغربان ويتنقل على الارض حجلاً وطفرّاً ولكنه عادم الخفة واللباقة. سره لا قياسي العدّد، تغلب فيه القلّة.

قوته الحشرات والدويبات والديدان والقشريّات والرخويّات والبذار والحبوب الناتشة والثمار اليانعة واخصّها العنبيّة.

يدنّ عشّه في صدوع الصخور الوعرة الشديدة الانحدار ويبطنه بالقش والجتالة والصوف والسيب. الانثى تضع مرّة واحدة في العام من ٤ الى ٥ بيضات لونها الى البياض الاغبر تعلوه رقشة حنطية. الترخيم يستمرّ نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء. والفراخ تهجر العشّ بعد النقف باربعة اسابيع.

يعتبر من الطيور المؤذية الضارّة.

مأتم القاق


ذكر لي صديق اثق بوصفه انه شاهد ذات يوم بالقرب من بلدة تل عباس الغربي في عكّار مجموعة من القاق فصوب عليها بنديته ورمى منها قاقاً. ولم يمض على الحادث اكثر من خمس دقائق حتى اجتمع فوق جثة الصريع اكثر من ٥٠٠ قاق اخذت تندبه بنعيقها المزعج ونعيبها الصاحب وتحلّق وتحوم حوله نحو نصف ساعة ثم انفرط الاجتماع وعاد كل سرب الى ناحيته.

N.S. Fulica atra.

Fr. Foulque noire, Foulque morelle, Macroule.

Eng. Common Coot, Bald-Coot, Baldicoot.

الفتاح تملوه ماجة صفراء ونكت بنية داكنة. الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء. تعتبر من الطيور النافعة ولكنها من الطرائد المرغوب فيها.



غُرَّة سَوْدَاء


طائر من الغرّ، تنتمي الى فصيلة التفلقيات. تدعى في مصر «غرّ». موطنها يمتد من الشرق الى اروية وافريقية تجوب اصقاعها في طلب الرزق والمصيف والمشتى. تعتبر من العوابر التي تقيم في الربوع اللبناية من اسبوع الى عشرة ايام.

جسمها متوسط القد، منضغط الجانبين. طولها نحو ٤٠ سم. وبسطنها نحو ٤٨ سم. رأسها كبير القد، عنقها معتدلة الطول. رأسها وعنقها الى السواد العابق. جبهتها مدبجة بالابيض الاغبر الذي يمتد حتى قاعدة المنقاد. رداؤها وظهرها وعجزها وجناحها وذنبها الى السمرة السوداء الرصاصية الموج. بطنها وابطالها الى السواد الازرق. عينها مطوّقتان بالاصفر ومكحلتان بالاسود. حدقة عينها قرمزية اللون. منقادها مخروطي الشكل، ضلع البنية وردّي اللون. ساقها رمادية يعلوها طوق مستعرض جووي اللون، اخضر الموج. اصابعها الى الربدة الزرقاء وهي مستطيلة، منفصلة، مزودة بشرايح حظائية. جناحها منفرج، مستطيل، يلحف الذنب. اطول قوادمه الثالثة والرابعة. ذنبها صغير القد، مخروطي الشكل، يتألف من ١٤ رفة عند الانثى ومن ١٦ رفة عند الذكر.

الانثى اصغر قدًا من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب. والياغ كالبالغ الا انه اخف سمرة وابته ماجة وياض جبهته اقل اتساعًا. تألف المناقع والبحيرات وضاغف الانهر واخوارها وتعم وتغوص. قوتها الحشرات ويرقاتها والحلزون والبراق والقشريات والنباتات المائية.

سلوكها لا يختلف عن سلوك سائر التفلقيات من جهة الوجل والحذر. تقضي معظم اوقاتها في الماء ولا تعلى البر الا قليلا. عدوها على الارض اخرق قريب الشبه بعدو البط. تعيش في زمن التساقد والحضن ازواجًا ثم تنضم الاسر الى بعضها وتجوب البلاد في طلب الرزق.

تدتن عشاها قرب الماء او فوق سطحه بين القصب والغزار والاسل وما اشبه. والانثى تباشر البيض منذ اوائل ايار. حضنتها تراوح من ٧ الى ١٥ بيضة مستديرة الشكل لونها الى الرمادي



N.S. Coturnix coturnix.
Fr. Caille commune, Caille des blés. Eng. Quail.

فِرِّي مَبْدُول ،
سَمَانِي مَبْدُولَة ،
مَرِيَعِي مَبْدُول

طائر من السماني ينتمي الى عمارة الحجليات وفصيلة الطيهوجيات . واحدته فرأية وسماناة . اعطانه تمتد من آسية الغربية الى الشرق الاوسط واروية وكامل حوض البحر الابيض المتوسط وافريقية الشرقية والشمالية ، يجوب معظم اقطارها كل عام طلباً للمصيف والمشتى . وهو من الضوارب التي تقيم في الربوع اللبانية من اواسط شباط الى اواسط ايار ويبقى منها قسم يسير ببيض في لبنان . اما القسم الذي يرتاد مناطق الفستق السوداني في عكار ومناطق البصل والشوندر والبطاطا والذره والبقول في البقاع فانه يقيم من تشرين الاول الى اواسط كانون الاول .

جسمه صغير القد . طوله نحو ١٨ سم . وبسطه نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الصهبة الحنطية يعلوها تجذيع وتوشيم وتوشيح . رأسه الى الشقحة تعلوها مشحة سمراء عابقة وثلاثة خطوط قاطبة لونها الى البياض الاشقر . الخط الاوسط يقطب الرأس من الجبهة الى القفن والخطان الجانبيان يقطبان المحسرين بمستوى العينين . محسره الى البياض الاغبر . رداؤه وظهره وعجزه وذنبه موشحة بخطوط سود وبنية وحنطية . زوره مطوق بقلادة ثلاثية الخطوط ، الخط الوسطي الى البياض الاصهب والخطان الجانبيان الى السمرة الحنطية السوداء الموج . صدره وبطنه الى الشقحة تعبق في اعلى الصدر وتبهت مع ابتعادها باتجاه البطن . حدقة عينه كستنية اللون . منقاده صغير القد ، مخروطي الشكل ، اريد اللون ، محدب الطرف البني في الافك العلوي . رسغاه واصابعه الى الحنطي الاحمر الموج .

الانثى اصغر قدماً من الذكر وثوبها لا يختلف عن ثوبه في الصفحة العليا اي من الرأس الى الذنب . اما زورها فالى الصفرة الباهتة العادمة النمشة ، وصدورها مستطيل التوشيم الاسود ، وبطنها الى البياض الاصفر الموج يعلوه في مؤخره قرب الافنيك توشيح احمر . وايطلاها مجدعان بخطوط بيض وسود .

يألف في تجواله الحقول المزدرعة والمراعي ويجتنب الإمات . قوته الاعشاب والحبوب والهوام والحشرات المختلفة . وهو قليل المواهب ، كثير الوجل ، ينفر من التجمّع ولا يرغمه



N.S. Ulula noctua.
Fr. Chouette chevêche.
Eng. Little Owl.

فُدَادَة الشَّرْق

يقال فُدَادَة وفُدَادَة وهي طائر من فصيلة البوميّات الكواسر الروامس . موطنها يمتد من الصين الى اطراف اروية ومن هضاب افريقية الشرقية وجبال اثيوبية الى تهام مراکش الاطلسية . اعطانها اللبانية تشمل الوسط والبقاع وبعض المناطق الجردية .

جسمها متوسط القد . طولها نحو ٤٥ سم . وبسطه سقطيها نحو ٦٠ سم . رأسها مستغلظ الشكل ، منفرج النقب المستدير . عيناها كبيرتان مستديرتان وحدقتها الى الصفرة الصنابية . منسرها قصير القد ، حنطي اللون ، مدبب البهرة . سقطها متوسط الانفراج ، مستطيل الشكل ، يكاد يشرف على الذنب . ذنبها صغير الحجم ، مخروطي الشكل ، مستدير الطرف . ساقاها مسرولتان . اصابعها كاسية . مخالبا سوداء اللون مدببة الاطراف المتعققة الحادة .

ثوبها يختلف باختلاف الشق والعمر وهو عند الذكر البالغ اشهب اللون . اغبر الموج ، تعلوه رقشة حنطية عابقة لا متساوية التبقيع ، وتجذيع معترض عابق يكثر في الجناح وفي الذنب . نقابها الى الكهبة الغبراء البيضاء الموج تطوقها مشحة حنطية كالهالة ثم حثار عابق دقيق الخط . صدرها مستطيل الرقشة المنتظمة التي تمتد حتى اواخر البطن . زمكأها وريش رصغها الى الشبهة الفاتحة السوية الموج .

الانثى اجسم من الذكر وافتح ثوباً منه واقل رقشة وتبقيعاً .

زمن السفاد والترخيم يراوح من اوائل نيسان الى اواخر ايار . تدنّ عشها في تجاوير الاشجار القديمة العهد او في الاوكان الكبيرة المهجورة . الانثى تبيض مرة واحدة في العام وتُحَضِّن من ٤ الى ٦ رفنات بيضية الشكل ، خشنة الخشل ، غبراء اللون . الحضن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء .


تألف الاحراج والادوية وتأوى الى الخراب . مسرحها دجوي يستمر من الغسق الى الفجر . تصيد الجرذ والفار والعطاء والصفادع وجميع انواع الحشرات والرخويات والديدان .

تعتبر من الكواسر العظيمة النفع لانها تقضي على معظم الدويبات والحشرات الضارة .

N.S. Alauda arvensis.

Fr. Alouette des champs,
Alouette commune.

Eng. Sky Lark.



قُبْرَة الحَقُول ،
قُبْرَة مَعْرُوفَة ، مَطُوق

نوع من القُبْر وهو طائر زقزاق من فصيلة القُبْرِيَّات. تدعى في مصر «قُبْرَة الغيط». اعطائها فسحة تشمل معظم الاقطار الاسيوية والاروية وافريقية الشمالية والشرقية. تعتبر من الضوارب التي تقيم في لبنان نحو اربعة اشهر من تشرين الثاني الى اواخر اذار. جسمها متوسط القد. طولها نحو ١٨ سم. وبسطنتها نحو ٢٢ سم. ثوبها متداخل الالوان. رأسها وسائر وشاحها العلوي الى الكهبة الموشحة بالاسود والاصهب والاغير. عنقها مطوق بقلادة حنطية سمراء. بطنها وصدورها وابطالها واسفل زورها الى البياض الاغير تعلوه رقشة سمراء. قمة رأسها مكلفة بكشة خفيفة صغيرة تنوتر وتنصب عند الطلب. حنار عينها الاعلى مستطيل الشكل، اشقر اللون. عيناها جوزيتان. منقارها مخروطي الجرم، مدبب الطرف، اسمر اللون. ذنبها متوسط الطول، مقعر الطرف. رسغاها واصابعها الى الشقحة السمراء.

ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر. وهنا لا بد من القول ان القُبْرَة تمانن البيئة التي تستوطنها وان هذه الشودلة او المماننة لا تنفرد بها القُبْرَة بين الطير.

تألف البراري والمراعي والاراضي المدحاة والسهول. تتميز بكثرة الاقامة على الارض وبالتنقل من تلعة الى تلعة ومن صخرة الى غيرها ونادراً ما ترى على غصن شجرة. وهي قلقة لا تستقر في مكان وتحب العراك مع طيور جنسها دون ان يحول ذلك بينها وبين الزقزقة التي ترسلها في اثناء طيرانها ولا تنفك عنها من الشروق الى الغروب. وهي لا تسالم وتنقطع عن العراك الا في فصل الشتاء لتعود اليه في اوائل الربيع عند زمن السفاد.

تدتن عشها على التربة بين الزروع واعشاب المراعي. عشها كالطاس تحبكه بالقش الناعم وبالالياف المختلفة وتبطنه بالصوف والسيب، الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة ولا تقوم بالمرّة الثالثة الا في ظروف خاصة تعود الى عوامل المناخ المؤاتية وخصب المرتع. حضنتها تتألف من ٤ او ٥ بيضات. بيضها اخضر اللون، اصفر المواج. او عاجي اللون وردي المواج تعلوه نمشة شهباء ورقشة سمراء. الحضن يستمر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر قوتها الحشرات والديدان والهوام والبزور البرية والحبوب. تعتبر من الطيور المتوسطة النفع.

عليه سوى الخوف والحاجة والرحيل. ينتقل على الارض بين النبات والزروع بخفة ورشاقة. طيرانه سفيف قصير الشوط.

الذكر يعاشر ويسافد عدة اناث وهو شديد الغيرة يحاول ما امكنه طرد كل غريم من حماه ويقاثل في سبيل اناثه او في سبيل السيادة المطلقة على اناثه حتى الموت.


تدتن الانثى افحوصها بين الاعشاب الكثيفة وترصعه بالحشيش الناعم وتضع من ٨ الى ١٥ بيضة لونها الى الصفار الحنطي تعلوه نمشة سوداء يكثر تجميعها عند العقب. الترخيم يستمر من ١٨ الى ٢٠ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء.

يعتبر من الطيور القليلة الاذى ولكنه من الطرائد المشهورة المرغوب فيها.

N.S. Alauda cristata,
Galerida cristata.

Fr. Alouette cochevis,
Cochevis huppé.

Eng. Tufted Lark.



قُبْرَة مُتَوَجَّهَة ، قُبْرَة مُتَوَجَّهَة ، قُوبَارَة

نوع من القَبْر ومنهم من جعلها جنساً مستقلاً . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية ، تجوب اصقاعها طلباً للرزق والمصيف والمشتى . تقيم في لبنان بعض الوقت . جسمها يطول نحو ١٨ سم . وبسطه نحو ٢١ سم . رأسها مستطيل القترعة . ظهرها اسمر اللون ، رماديّ الموج . حنار ريش رأسها وظهرها وعجزها وجناحيها الى الصهبة الحنطية . صدرها وبطنها وخوافيها الى البياض الاصهب تعلوه رقشة مستطيلة سوداء اللون . ذنبها الى الربدة السمرء . حدقة عينها كستنية اللون . حواجب عينها الى الصهبة البيضاء . متقارها مخززي الشكل ، مدبب الطرف ، اسمر اللون . رسغاها واصابعها الى الكهبة السمرء .


تألف المناطق الوعرة والمراعي والحقول المزدرعة والكروم وجوانب الطرقات والمسكن الريفية وتردد على مواقع البيادر بعد هطول المطرة الاولى لالتقاط الحبوب الرافخة المبعثرة . قوتها الحشرات والهوام والبزور والحبوب . تدنن عشها في التربة بين الاعشاب او في حصى التلع وفي كل مكان حرير لا تنظر به العيون . وهي لا تحضن اكثر من مرتين في الحول . حضنتها تتألف من ٥ او ٦ بيضات تبينة اللون تعلوها مشحة جووية ونمشة ربداء لا متساوية التنقيط . الحضن يدوم من ١٢ الى ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر الذي لا يحضن اكثر من ساعتين او ثلاث ساعات في النهار منها ساعة أو أكثر عند شروق الشمس ومثلها عند العصر .

تعتبر من الطيور المتوسطة النفع .

N.S. Alauda arborea, Lullula arborea.

Fr. Alouette lulu, Lulu,
Alouette des bois.

Eng. Wood Lark.



قُبْرَة العِيَاض ،
قُبْرَة العِيَاض

نوع من القَبْر وهي من العصافير الضواري التي تقيم في لبنان من اواسط اذار الى اواسط ايلول او اواخره . اعطانها تمتد من الهند الى اروبة وافريقية الشمالية .

جسمها صغير القد بطول نحو ١٥ سم . وبسطها نحو ١٧ سم . ثوبها ، على اختلاف شقيها ، ثوب قَبْرَة الحقول لكنه اكثر بياضاً واشرق صهبة وزورها عادم البياض .

تألف العياض والاحراج المبعثرة الاشجار والادغال والهضاب والوعر وترغب في مراتع الخلنج والصعتر حيث تكثر بعض الحشرات والفرشات التي تفضلها على غيرها وقلما تحط في السهول المزدرعة وغير المزدرعة .

وهي رشيقة ، خفيفة الحركة ، تبدو آمنة وادعة حيث لا تزعجها المطاردة ، ووجلة حذرة عند الشعور بالخطر وقد تنطرح على الارض وتختفي بين التلع والحجارة عندما تلمح الصقر وغيره من الكواسر . وتتميز كسائر بنات جنسها بكثرة الاقامة على الارض وان جثمت على شجرة فانها تنتقي الافئاد الجرداء او القليلة الورق .


اخلاقها لا تختلف عن اخلاق غيرها من القَبْر وهي تحب العراك ولا تنقطع عنه الا في زمن الترخيم والرحيل .

تدنن عشها في الادغال والسيجات وبين الاعشاب وفي التربة في ظل صخرة او تلة . تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات ، لونها الى الكهبة تعلوها نمشة سمرء لا قياسية التجميع . الحضن يستمر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

قوتها الحشرات والديدان والهوام والبزور البرية والحبوب . تعتبر من الطيور المتوسطة النفع .

N.S. Parus cœruleus.
Fr. Mésange bleue, Mésange azurée.
Eng. Blue Titmouse, Blue Tit.

رقشة حمراء. الترخيم يستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية.
قوته الحشرات المختلفة ويرقاتها ومكثها وبعض البزور البرية. يقال ان الحشرات التي يلتهمها هذا العصفور في العام الواحد لا يقل عددها عن ٤٠٠٠٠ لذلك يعتبر من الطيور الجزيلة النفع الجديرة بالحماية.




قُرُقْفَ أَرْزُقْ، قُرُقْبَ أَرْزُقْ

طائر حاشر آبد من فصيلة الفرققيات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير. موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة، يجوب بعض اصقاعها ويلبد في البعض الآخر. وهو من اوابد لبنان ينزح في الصيف نحو الجرود والبقاع ويستوطن الوسط والسواحل في الشتاء.
جسمه صغير القد. طوله نحو ١٢ سم. وبسطه نحو ١٥ سم. منقاده مخروطي الشكل، قصير الجرم، قوي التركيب. جناحه معتدل الحجم والانفراج. اطول قوادمه الاولى والثانية. ذنبه متوسط الطول، مقعر الطرف، يتألف من اثنتي عشرة رفة. ساقه دقيقة حجفية القشار. ثوبه جميل الالوان المتراكبة. قلنسوة رأسه الى الزرقة السمنجونية العابقة يطوقها حنار ابيض يمتد من الجبهة الى القفن. جناحاه وذنبه الى الزرقة الغبراء الزاهية يعلوها في الجناحين تبقيج ابيض يتناول اطراف الاباهر والمناكب. رداؤه وظهره وعجزه الى الخضار الزيتي اللامع. محسراه الى البياض الناصع يقطبهما خط اسود يمتد بمستوى العين من قاعدة الشدق الى طوق العنق. طوق عنقه وزوره اسود اللون، ازرق المواج. صدره وبطنه وافنيكه الى الصفرة الزاهية. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده ورسغاه واصابعه الى السمرة الطحلاء السوداء المواج.

ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر الا بدكارة الالوان.

يسرح من شروق الشمس الى غروبها. يألف الاحراج والحدائق والجنان. يعتبر من العصافير الحرجية التي تقضي معظم حياتها في الانتقال من شجرة الى شجرة دون ان تكثر السعي على الارض. وهو كثير الحذر والوجل. طيرانه قصير الشوط المتقطع، خفيف الحركة، وعندما يبصر ما يخيفه يرتمي في اقرب دغلة ويختفي.

يدتن عشه في جذوع الاشجار النخرة او بين الافناد المتراكبة التي تظللها الاوراق. عشه قدحي الشكل، متوسط الحبك، مستعرض الحافة، يغلغه بالحشيش الناعم ويبطنه بالسيب والصوف والوبر. الانثى تحضن مرتين في العام، الاولى في نيسان والثانية في مطلع تموز. عدد بيض الحضنة الاولى يراوح من ٦ الى ١٦ والحضنة الثانية من ٤ الى ٨، بيضها عاجي اللون تعلوه



قُرْقُوبٌ كَبِيرٌ ، قُرْقُوبٌ كَبِيرٌ

N.S. Parus major.
Fr. Mésange charbonnière, Mésangère.
Eng. Great Titmouse, Tomtit, Oxeye.

يُدْتَنُّ عَشَّهٖ فِي تَجَاوِيفِ الْأَشْجَارِ أَوْ فِي أَطْرَافِ اغْصَانِ الْأَشْجَارِ الْوَارِقَةِ الظِّلِّ. عَشَّهٖ كَرُوبِيَّ الشَّكْلِ ، جَيِّدَ الْحَبِكِ ، مَتِينِ الرِّبَاطِ يَحُوكُهُ بِالْقَشِّ النَّاعِمِ وَالْجُدُورِ الدَّقِيقَةِ وَيَبْطِنُهُ بِالزَّغْبِ وَالسَّيْبِ وَالغُفْرِ وَالصُّوفِ. الْإُنْثَى تَحْضِنُ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ. الْأُولَى فِي أَوَاسِطِ نَيْسَانَ وَالثَّانِيَةَ فِي مَطْلَعِ تَمُوزَ. عَدَدُ بَيْضِ الْحَضْنَةِ الْأُولَى يَرَاوِحُ مِنْ ٨ إِلَى ١٦ أَمَّا الْحَضْنَةُ الثَّانِيَةُ فَمِنْ ٥ إِلَى ٧ ، لَوْهَا إِلَى الْبَيَاضِ التَّيْبَنِيِّ تَعْلُوهُ رَقْشَةٌ جَوْوِيَّةٌ. التَّرْخِيمُ يَسْتَمُرُّ مِنْ ١٤ إِلَى ١٥ يَوْمًا تَقُومُ بِهِ الْإُنْثَى دُونَ الذَّكَرِ الَّذِي يُؤْمَنُ لَهَا الْغِذَاءُ وَالْحِمَايَةُ .
يَعْتَبَرُ مِنَ الْعَصَافِيرِ الْمَتَوَسِّطَةِ النِّفْعِ وَالضَّرَرِ.

طائر حاشر آبد من فصيلة القرقبيات ورتبة الجوائم مخروطيات المناقر. موطنه يشمل جميع المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم واخصها الشرق الاوسط واروبة الجنوية والغربية.

جسمه صغير القد، طوله نحو ١٤ سم. وبسطه نحو ١٧ سم. منقاره مخروطي الشكل، قصير الجرم، جالس الارتكاز، قوي التركيب. جناحه معتدل الانفراج والحجم، اطول قوادمه الاولى والثانية. ذنبه متوسط الطول، مقعر الطرف، يتألف من اثني عشرة رفلة. ساقه دقيقة حجفية القشار. مخالبه قوية محججة حادة.

ثوبه جميل الالوان المتراكبة. رأسه وعنقه وجذة زوره الى السواد اللامع. محسراه وقفنه بيض. رداؤه وظهره وعجزه الى الخضار الزيتي يعلوه موج اصفر. جناحه الى الزرقة الرمادية. قوادمه ومناكبه واباهره الى الشقحة السمراء يحوقها اطار ابيض يضيق جداً في القوادم ويعرض في الاباهر. صدره وبطنه وخوافيه الى الصفرة الباهتة يعلوها خط قاطب من الزرقة السوداء يمتد من جذة الزور وطوق العنق الى اواسط البطن. افيكه ابيض اغبر. ذنبه متوسط القد، مقعر الطرف، رمادي اللون، ازرق الموج. عيناه صغيرتان، مستديرتان، داخلتان ضمن اطار سواد الرأس. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره ورسغاه واصابعه الى اليردة السمراء السوداء الموج.

ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر إلا بزهاء الالوان عند الذكر وبدكاتها عند الانثى. يألف الحدائق والجنان والغابات والادغال. يسرح من الفجر الى الدغشة. يتميز بالحذر والوجل والفضول وبالتعدّي على غيره من العصافير الصغيرة. وهو نزق الطباع شرس الاخلاق. يعيش معظم حياته على الاشجار يتنقل بينها وعلى اغصانها بخفة ورشاقة. طيرانه قصير الشوط. متمواج الخط المتقطع المتتابع.

قوته الحشرات المختلفة ويرقاتها ومكثها وبعض البزور البرية والثمار السكرية. وعندما يأخذ حشرة او ثمرة يقبض عليها بمخالبه ويمزقها بمنقاده.



قِرْلَى شَائِع ، قَاوَنَد شَائِع ،
أَبِي الرَّقْص ، مُلَاعِب ظَلَّة

N.S. Alcedo ispida.
Fr. Martin pêcheur vulgaire.
Eng. Common Kingfisher.

الماء. افحوصه نفق مستطيل قطره من ٥ الى ٦ سم. وطوله من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ينتهي بحجيرة
فسيحة قطرها نحو ٢٠ سم. وارتفاعها ١٠ سم. تشترك الانثى مع الذكر في عملية الحفر ونقل
البوثر الى الخارج. ويستلزم هذا العمل من ١٨ الى ٢٤ يوماً.
الانثى تضع من ٦ الى ٩ بيضات شبه كروية الشكل، عاجية اللون. تحضنها وحدها من
١٤ الى ١٦ يوماً بينما الذكر يؤمّن لها الغذاء وتنظيف الافحوص من الوخم.
يعتبر من الطيور المتوسطة الأذى لانه يلتهم الكثير من الحشرات ولا يصيد إلا في الماء
القراح الشفاف.


طائر من القِرْلَى ينتمي الى فصيلة القِرْلَانِيَّات ورتبة الجوائم ملتصقات الاصابع. موطنه
يمتد من الهند الى بلاد فارس والشرق الاوسط واروبّة وافريقية الشماليّة. اعطانه اللبنايّة ضفاف
الانهر ومجاري الماء.

جسمه ربع الحجم منكمش الشكل. طوله نحو ١٨ سم. وبسطته نحو ١٧ سم. ثوبه
قزحيّ الالوان الزاهية الجميلة. رأسه مرقوش بالاخضر والازرق السمنجوني والابيض. محسراه
الى الصهبة القائمة. قفنه وجناحاه الى الزرقة الخضراء المواج. رداؤه وظهره وعجزه الى
السمنجوني يعلوه مواج لاوزودي ومشحة سفعاء. زوره واعلى عنقه الى البياض العاجي. صدره
وبطنه الى الشهبه الصنائية السفعاء. ذنبه قصير القدّ، ازرق اللون متباين المواج. جناحه متوسط
الحجم، مستدير الشكل، متتابع الرقشة والتجاذيع. منقاره بالغ الطول، ذلق الطرف، اسود
اللون. رسغاه قصيرتان قويتان لونهما الى الجؤوة. اصابعه الخلفيّة والاماميّة نصفية الالتصاق.
عيناه كبيرتان مكحلتان. حدقة عينه كستنية اللون.

يتميز بحدة البصر وسرعة الاختطاف. وقد قيل فيه: « طائر حزم يهوي باحدى عينيه الى
قعر الماء طمعاً في ما يصيده ويرفع الاخرى حذرًا ممّا يصيبه ». ومنه المثل: « هو احزم او احذر
من قِرْلَى ان رأى خيراً تدلّى وان رأى شراً تولى ». ذلك لانه اذا ابصر في الماء ما يستقلّ بحمله
انقضّ عليه كالسهم المرسل فاخرجه من قعر الماء واذا ابصر في الجو كاسراً دخل البرّ هرباً
بسرعة النبلة.

يألف جرف الانهار ومجاري الماء واشجار الضفاف واخصها الصفصاف والمغث والدلب
ولا يجثم عادة الا عند طرف القضيب العادم الاوراق المتدلّي فوق الماء.
طيرانه سريع الحركة، قصير الشوط، مستقيم الخطّ الافقي. صيده رقص فوق صفحة
الماء وانقضاض فيه وغوص.

قوته الاسماك الصغيرة والبلاغيط والقشريات والحشرات المختلفة واخصها اليعاسيب.
يسافد خلال شهر اذار ويخلد افحوصه توّاً بعد السفاد في اصعب المنحدرات واقربها من



N.S. Pterocles orientalis.

Fr. Ganga oriental. Eng. Imperial Sandgrouse.

قَطَاة شَرْقِيَّة،

قَطَاة سَوْدَاء البَطْن، جُونِيَّة

طائر من القطا وفصيلة الجونيات. اعطانها تمتد من اواسط آسيا الى الشرق الادنى واروية الجنوبية والغربية حتى اسبانية وافريقية الشمالية والغربية. تعتبر من الصوارب التي تنتحي بعض مناطق لبنان حيناً من الوقت عند قطعها نحو مشتاتها.

جسمها متوسط القد، طولها نحو ٣٠ سم. وبسطها نحو ٥٠ سم. رأسها صغير الجرم. عينها مستطيلتان مكحلّتان. حدقة عينها الى البني الداكن. منقادها صغير القد، مقوس المخطم العلوي، رمادي اللون. عنقها متوسط الطول. جناحها مستطيلان، اطول قوادمهما الاولى والثانية. ذنبها مخروطي الشكل يتألف من ١٦ رفة اطولها الزوج الاوسط. ساقاها قصيرتان كاسيتان. اصابعها صغيرة جزئية الحطاب الذي يكتنف نصف الزام الاول. مخالبها قصيرة معتدلة التحجين.

ثوبها يمانن البيئة التي تعيش فيها. رأسها ومحسراها الى الصهبة الحنطية. زورها مطوق بقلادة جووية تمتد عبر علاطي العنق حتى القفن. رداؤها الى الصهبة الحنطية الباهتة. ظهرها وعجزها الى الحنطي الرملي تعلوه رقشة سماء سوداء تنحرف الى الطحلة الزرقاء في لوحف الجناح الصغرى. قوادم الجناح الى الزرقة الريداء يعلوها موج بني. ذنبها بني اللون ايض الرقشة اما الزوج الاوسط من الرفال فهو الى الصفرة المجذعة بالطحلة. اسفل الزور الى السواد تليه منطقة جووية يخالطها الرمادي ثم خط اسود ومنطقة صفراء سماء. بطنها الى السمرة السوداء.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وابهت ثوباً واقل شقاً وأكثر اصفراراً. اما اليافع فتوبه ثوب الانثى.

قوتها الحبوب البرية والزراعية المختلفة.

تدتن افحوصها في التربة. تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام. حضنتها تراوح من بيضتين الى ثلاث بيضات حنطية اللون تعلوها رقشة جووية خفيفة مبعثرة. الحضن يستمر نحو ٣ اسابيع تقوم به الانثى بمنابوة الذكر. تعتبر من الطرائد المرغوب فيها.



N.S. Gyps fulvus.

Fr. Gyps fauve, Vautour fauve, Griffon.

Eng. Griffon Vulture.

قَشْعَام أَكْلَف، حَنَق

طائر من القشام وفصيلة النسريات. موطنه فسيح الارحاء يمتد من الهند الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية. يعتبر من صوارب لبنان التي تقيم في ربوعه بعض الوقت.

جسمه كبير القد، قريب الشبه بالنسر، لكنه اقل ضخامة منه واطلق جناحاً. طولهُ نحو ١٢٠ سم. وبسطة سقطيه نحو ٢٧٠ سم. ثوبه الى الكلفة الغبراء تزهو في الظهر وفي سائر الصفحة العليا وتعبق في البطن وفي سائر الصفحة السفلى. رأسه مستطيل الشكل، اغفر الزغب. عينه سوداء المقلّة، صفراء الحدقة. منسره قصير القد، غليظ الجرم، اسمر اللون، ازرق الزرد والبهرة المنعقدة الحادة الطرف. عنقه مستطيل اغفر الريش للبد الناعم. برائله مهذلّ الزغب الابيض الاغبر الموج. سقطه كبير رافل تعرّضه خطوط بيض ناتجة عن اطار بعض المناكب والاباهر. ذنبه قصير القد، مقطوم الطرف. ساقه مرطاء سبورية اللون. رسعه قوية سرديّة المقدّم، حجفية المؤخر. اصابعه قصيرة. مخالبه خفيفة متوسطة التحجين.

ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر. والذكر لا يفارق اناهُ مدى الحياة. وهو يألف الحياة الجماعية. سربه في تجواله من بلاد الى بلاد يعدّ من ١٥ الى ٢٥ زوجاً.


طيرانه حوم وتخليق. شوطه يفوق سرعته سرعة جميع النسور لكنه لا يجاري العقبان. وهو شرس الاخلاق، قوي الشكيمة، جسور، يسطو على جميع انواع النسور التي تهاجه وتخشاه. يألف قمم الجبال والسهول على السواء. قوته الجيف المختلفة كسائر النسور.

يدتن وكته في فجوات الصخور الشاهقة الموحشة بأمّن من المطر. الانثى تبيض رقنة واحدة كبيرة القد تحضنها بمنابوة الذكر نحو اربعة اسابيع.

يعتبر من الكواسر النافعة لانه كغيره من النسور ينظف البلاد من الجيف.

N.S. Pterocles alchata.
Fr. Ganga cata.
Eng. Large pintailed Sandgrouse.

تدثن افحوصها في التربة. تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام. حضنتها تراوح من ٣ الى ٤ بيضات حنطية اللون تعلوها مشحة كدراء. الترخيم يستمر نحو ٣ اسابيع تقوم به الانثى بمنابرة الذكر. تعتبر من الطرائد المرغوب فيها.



قَطَاة كُذْرِيَّة ،
قَطَاة عِرَاقِيَّة ، كُذْرِيَّة


طائر من القطا وفصيلة الجونيئات. اعطانها فيافي وصحاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية والغربية. تعتبر من الصوارب التي تحط في لبنان من يوم الى يومين بعد عبورها البحر وقبل ان تتوجه نحو سورية والعراق.

جسمها متوسط القد. طولها نحو ٢٧ سم. وبسطها نحو ٤٨ سم. رأسها صغير الجرم. عينها كبيرتان مكحلتان. حدقة عينها عتائية اللون. منقادها صغير القد، محدب المخطم العلوي، سبوري اللون، تعلوه ماجة خضراء. عنقها متوسط الطول. جناحها ذلق مستطيل، اطول قوادمه الاولى والثانية. ذنبها مخروطي الشكل يتألف من ١٤ رفة اطولها الزوج الاوسط. ساقها قصيرتان كاسيتان. اصابعها جزئية الشنرة التي تكتنف نصف الزام الاول. مخالبها قصيرة ومقوسة.

ثوبها يمانن البيئة التي تعيش فيها ويختلف بين الذكر والانثى. ففي الذكر: قمة الرأس الى الطحلة يعلوها موج اصفر. جبهته ومحسراه الى الصفرة الفاقعة. عيناه مكحلتان، مستطيلتا الخط الاسود. اعلى العنق والرداء والظهر الى الصفار الحنطي الاربد الموج. منكباه اعقب لوناً من ظهره وتعلوها مشحة خضراء. قوادم الجناح رمادية، والنصل الوحشي للاولى كستني اللون ولواحف الجناح عتائية عابقة. ذنبه الى الطحلة المرقوشة والمجدعة بالابيض. فذالاه مديبتا الاطراف. زوره اسود، اسفل زوره اصفر ينتهي بخط اسود. صدره كستنائي اللون ينتهي عند اوائل البطن بخط رفيع اسود. بطنه وافنيكه الى البياض الاغبر.

اما في الانثى وهي اصغر قدماً من الذكر فالاجزاء العليا مصفرة وعلى الرأس بقع سود وعلى الظهر والعجز خطوط سود والزور ابيض واسفل الزور واعلى الصدر الى الكستنائي الباهت تعلوه رقشة سوداء. اسفل الصدر والبطن والافنيك الى البياض الاغبر.

البافع يتحلل بثوب الانثى يضاف اليه زركشة لا قياسية الترتيب في الرداء والظهر والصدر. قوتها الحبوب البرية والزراعية المختلفة. تسرح في طلبها وفي طلب الماء عشرات الاميال.



N.S. Cisticola schaeincola.

Fr. Cisticole ordinaire, Cisticole des roseaux.

Eng. Fan-tailed Warbler.

كزّوان مَبْدُول، فُسَيْكَة،
فُصِيَّة مَرُوحِيَّة الذَّنْب، أُم فِصِي

عصفور آبد من فصيلة الدخليات. يدعى في لبنان وسورية «فسيكة» ويدعى في مصر «فصية مروحية الذنب» «أم فصي». اعطانه حوض البحر الابيض المتوسط، يسرح ويمرح في جميع مناطق لبنان.

جسمه صغير القدّ، يطول نحو ١١ سم. وبسطته نحو ١٢ سم. ثوبه الى الطحلة السمراء. محسراه الى الغبرة. رداؤه وظهره وعجزه الى الطحلة المشومة بالاسود. جناحاه الى السمرة القاتمة. قوادم جناحيه غير الاطراف. ذنبه متوسط القدّ، مروحي الشكل، اسمر اللون، ابيض الطرف. نحره ابيض. صدره واظلاه وبطنه الى الشقرة. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه سوداء. منقاره صغير القدّ، مستدق الطرف اسمر اللون. رسغاه واصابعه الى السمرة. مخالبه دقيقة، سمراء اللون.


الشقّان لا يختلفان قدًا وثوبًا.

يألف المناقع وضياف الانهر والمراعي والحقول المزدرعة. يرفرف بجناحيه قبل ولوج الفضاء. شوطه قصير القاب. طيرانه متوسط السرعة. عدوه على الارض وبين الادغال والاعشاب يفوق حفة الصعوبة ورشاقة الفأرة.

يدنّ عشّه في الادغال والاعشاب التي تعلو سطح التربة او الماء من ١٠ الى ١٢ سم. عشّه جراب برمعي الشكل تحوكة الانثى بلباقة لا مثيل لها وتبطنه بانعم الحشائش والالياف. الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرّات في الحول. حضنتها تدوم نحو ١٣ يومًا وتتألف من ٤ بيضات لونها الى البياض الاغبر تعلوه ماجة وردية او زرقاء وبعض التنميش الاسمر. الذكر يؤمّن لها الغذاء.

قوته الذباب والهوام والحشرات والاساريع والرخويات.

يعتبر من العصافير الجزيلة النفع الواجب حمايتها.



N.S. Halcyon smyrnensis.

Fr. Halcyon de Smyrne.

Eng. Halcyon.

قَبُون الغَاب، قَبُون إِزْمِرْلِيّ


طائر من المازوريات وفصيلة القرلايات. موطنه شاسع الاطراف يمتد من الشرق الاوسط الى الهند وسيام وجزر الزابج. اعطانه اللبناية تشمل بعض الرياض وضياف الانهر في فصل الخريف.

جسمه متوسط الجرم منكمش الشكل. طوله نحو ٣٢ سم. وبسطته نحو ٢٨ سم. ثوبه متراكب الالوان الجميلة لكنّه اقلّ زهاءً من ثوب القرليّ. رأسه وعنقه وخوشاه وبطنه الى الكستنائي الداكن. زوره واعلى صدره الى البياض. رداؤه وظهره وعجزه الى الزرقة الخضراء يخفّ اخضرارها ويزداد لمعانها مع اقترابها من العجز. جناحاه متراكب الازرق والاحضر والاسود والكستنائي والابيض. قوادمه الى الزرقة الخضراء، كلاه الى السمرة السوداء، اباهره الى السمرة الحنطية، مناكبه مجذعة بالابيض. عيناه كبيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنية صناعية الموج. منقاده كبير القدّ، مستطيل الشكل، ذرب الطرف، محدودب الافك الاسفل، احمر اللون، مرجاني الموج. ساقاه الى الجؤوة. رسغه قصيرة سردية القشار. الشقّان لا يختلفان واليافع كالبالغ الا انه ادكن لونًا.

يألف الغابات والرياض ومجاري الماء. طيرانه متوسط الشوط لا قياسي النهج يكثر فيه السيف ثم الحوم والارتفاع والهبوط والاقبال والادبار. قوته العطاء والحشرات وخصها السحالي والجنادب والجراد يلتقطها سارحة وجائمة وطارثة.

يدنّ عشّه في تجاويف الاشجار. الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات كروية الشكل، عاجية اللون تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٨ يومًا.

يعتبر من الطيور النافعة لكنه قليل الوجود في لبنان.



N.S. Ciconia alba.
Fr. Cigogne blanche,
Cigogne commune.
Eng. White Stork.


لَقْلَقُ أَيْبُض

ومن اسمائه لَقْلَاقُ ابيض وبلأرج. يدعى في مصر «عَنْزُ أبيض». كنيته أَبُو حُدَيْجٍ .
طائر من اللقلق ينتمي الى فصيلة اللقليات ورتبة طوال الساق. اعطانه تمتد من العراق
الى سورية وتركيا واروية الوسطى والغربية وافريقية الشمالية والغربية ويقطع في الشتاء الى
افريقية الجنوبية والشرقية. يعتبر من الضوارب التي تحط في لبنان حيناً من الوقت لا يتجاوز
اليوم.

يتميز بطول العنق والمقاد والساق. جسمه كبير القد، طوله نحو ١١٠ سم. وبسطته نحو
٢٣٠ سم. رأسه معتدل الجرم. عيناه مستديرتان. حدقة عينه الى الزرقة الرمضاء المواج.
مقاده كبير القد، وشعي الشكل، احمر اللون. عنقه نحيل، مستطيل، يتميز بقصر ريشه
باستثناء القسم السفلي، الذي يتاخم اعلى الصدر، فانه بالغ الطول. جناحه مستطيل الشكل
اطول قواده الثالثة والرابعة والخامسة. ذنبه قصير القد مستدير الطرف يتألف من اثنتي عشرة
رفلة. ساقه رفيعة عارية الى ما فوق الرسغ. اصابعه قصيرة جزئية الحطاب الذي يكتنفها حتى
المفصل الاول. ساقاه واصابعه الى الحمرة الداكنة.

ثوبه الى البياض الناصع. اما قوادم الجناح وخوافيه فالى السواد الفحمي.
الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلى بالثوب نفسه. واليافع كالبالغ الا انه بني
المقاد ولواحف الجناح.

قوته الجراد والجنادب والحشرات المختلفة والعطاء والسحالي والثعابين والافاعي والاسماك
والقشريات.
يعيش ذكراً وانثى مدى الحياة ولا يألف الحياة الجماعية الا في زمن الرحيل.
يدثن عشه في كل مكان رفيع ويعود اليه كل عام فيصلح ما فسد منه او يرمم ما قضى عليه
الزمن. انثاه تبيض من ٤ الى ٥ بيضات عاجية اللون تعلوها مشحة خضراء او صفراء. الحضن
يستمر من ٢٨ الى ٣١ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء والحماية.
يعتبر من الطيور الضوارب او القواطع الجزيلة النفع.



N.S. Chrysomitris spinus.
Fr. Tarin commun.
Eng. Common Siskin.

كُعْتَرُ مَبْدُولُ ، سُمَيْلِيّ

نوع من الكعتر وهو عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات. موطنه يمتد من اطراف البلاد
الاسيوية الى اروبة وبعض مناطق افريقية الشمالية. يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف ،
ويجوب غابات واحراج المناطق المعتدلة في الشتاء. اعطانه اللبنانية تمتد من احراج الوسط
الى الجرد واخصها احراج الصنوبر والشربين والتتوب.

جسمه صغير القد، بطول من ١١ الى ١٢ سم. وبسطته نحو ١٤ سم. ثوبه جميل
الالوان المتداخلة. رأسه اسود القمة والجبهة. رداؤه وظهره وعجزه الى الخضار الاصفر يعلوه
تجديع اسمر. جناحاه الى السواد يعترضهما خطان اصفران. ذنبه متوسط الطول، مستعرض
الشكل، اصفر اللون الداكن، اسود الطرف الفارق. محسراه وزوره وصدره الى الصفار
الاخضر، تزين عنقه لطعة سوداء. بطنه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة مستطيلة سمراء.
مقاره مخروطي الشكل، قصير القد، حنطي الجسم، اسود الملقط. حدقة عينه كستنية
اللون. ساقاه الى الربدة.

الانثى اكثر بياضاً من الذكر واقل سمرة واسوداداً. اما رأسها فالى الخضار الاكهب بدلاً
من الاسود.


يتميز بحسن التغريد وخفة الانتقال وكثرة الحركة وشدة الحذر. يدثن عشه في الصنوبر
والشربين والسرو. عشه حقي الشكل يشيده عند اطراف الاغصان بين الافنان الكثيفة.
انثاه تبيض وتحضن مرة واحدة في العام وقد يكون ذلك في الوتيرة الاولى من حزيران. حضنتها
تراوح من ٣ الى ٥ بيضات لونها الى البياض الاربدي، او الازرق السماوي، يعلوه تميمش
جذوي. حضنها يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء.

قوته بزور النباتات البرية ونوامي الاوراق والحشرات الصغيرة على اختلاف فصائلها
وانواعها. وهو يألف القفص بسرعة، ويدجن بسهولة، ويسافد النغر والكنار.
يعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها.

N.S. *Ruticilla phoenicura*,
Phoenicurus phoenicurus.

Fr. Rouge-queue à gorge noire,
Rouge-queue à front blanc,
Rouge-queue de muraille.

Eng. Common Redstart.



لَهَيْبِ أَسْوَدِ الزُّورِ ،
حُمَيْرَاءِ سَوْدَاءِ الزُّورِ

طائر من اللهيب وفصيلة الشحروريات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشرقية والشمالية يجوب بعض مناطقها طلباً للمصيف والمشتى وأبداً في بعضها الآخر . وهو من الصوارب التي لا تقيم في لبنان اكثر من ثلاثة اسابيع ويكون ذلك في اثناء عودتها نحو مناطق مشناها التي تمتد من حوض البحر الاحمر الى اواسط افريقية الشرقية .

جسمه صغير القد ، رشيق القوام . طوله نحو ١٥ سم . وبسطه نحو ١٩ سم . منقاره صغير الجرم ، مدبب الشكل ، يحمل عند طرف افكه العلوي تنوعاً دقيقاً . جناحه متوسط الانفراج ، معتدل الطول . اطول قوادمه الثالثة . ذنبه معتدل الطول ، مقطوم الطرف . ساقه دقيقة رفيعة . ثوبه جميل الالوان المتداخلة المتراكبة . رأسه الى الكهبة الزرقاء تتوسطه بقعة بيضاء تمتد الى الجبهة . رداؤه وظهوه الى الكهبة الرمادية يعلوها موج ازرق . قاعدة جبهته ومحسراه وزوره الى السواد اللامع . صدره وابطلاه وعجزه وزمكاه وذنبه الى الصهبة الصنائية الزاهية . رفلتا عزالانه وقوادم جناحه الى السمرة الحنطية . اباهره الى الصهبة . بطنه وافنيكه الى الصفرة الحنطية البيضاء الموج . عيناه صغيرتان مستديرتان . حدقة عينه عناية اللون . منقاره ورسغاه واصابعه الى السمرة السوداء .

ثوب الانثى يتميز بخفة الزهاء وبقلة الالوان العابقة . رأسها وراؤها وظهوها وجناحها الى الصهبة الطحلاء الموج . عجزها وذنبها كعجز الذكر وذنبه . زورها الى الصفار البني الابيض الموج . صدرها وبطنها وابطلاها وافنيكها الى الصهبة الصنائية الحنطية الماجة .


يألف جميع المواقع المبعثرة الاشجار والجنبات ولا يقترب من الاماكن الآهلة لانه كثير الوجل والحذر . طيرانه اشواط قصيرة متتابعة متماوجة الخط . انتقاله بين الاشجار وعلى الاغصان كثير الخفة والرشاقة . سعيه على الارض متعثر وقليل .

تغذيده شجيّ الالحان والانغام . قوته الحشرات الصغيرة القد على اختلاف انواعها واخصها الذباب والفرش .

N.S. *Ruticilla tithys*,
Phoenicurus ochrurus.

Fr. Rouge-queue tithys,
Rouge-queue noir.

Eng. Black Redstart.



لَهَيْبِ أَسْوَدِ الرَّأْسِ ،
حُمَيْرَاءِ سَوْدَاءِ الرَّأْسِ

طائر من اللهيب وفصيلة الشحروريات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وهو من اوابد لبنان ، يقضي الصيف في الجبال والبقاع ويمضي الشتاء في الوسط والسواحل .

جسمه صغير القد ، رشيق القوام . طوله نحو ١٦ سم . وبسطه نحو ٢٠ سم . منقاره صغير القد ، جالس الجرم ، مدبب الطرف . جناحه متوسط الانفراج ، ذلق الشكل . ذنبه معتدل القد ، مقطوم الطرف . رسغاه نحيلتان واصابعه كذلك . مخالبه صغيرة ، مقوسة ، سمراء اللون .

ثوبه جميل الالوان المتراكبة . رأسه وراؤه وظهوه وزوره وصدره الى الكهبة السمراء السوداء الموج ، يعيق في الرأس ويزداد سمرة في الزور ، وتخف سمرة وتنحرف الى الطحلة الزرقاء بالاتعاد عن الظهر باتجاه العجز وبالابتعاد عن الصدر باتجاه البطن . جناحه الى البني الداكن باستثناء بعض الاباهر والمناكب . عجزه كستني اللون ، صنائي الموج . ذنبه عنائي الرفال الوحشية ، كستني الداخلة اي الانسية . بطنه الى الطحلة الغبراء . ابطلاه وافنيكه الى الطحلة الحنطية الموج . عيناه صغيرتان مستديرتان . حدقة عينه كستنية . منقاره ورسغاه واصابعه الى السمرة الشديدة الجوزية الموج .

الانثى ابهت ثوباً من الذكر واخف سمرة في رأسها وزورها واقلّ بياضاً في جناحها . يألف الحدائق والجنائن والادغال والاحراج القريبة من الاماكن الآهلة ولكنه يجتنب الاقتراب من الناس لانه كثير الحذر والوجل . وهو نرق الطباع ، خفيف الحركة ، سريع الانتقال . سيره على الارض قفز رشيق . قوته الحشرات واخصها الذباب والاساريع .

يدئن عشه في اوقاب الصخور وفي المنازل المهجورة والخربة وفي تجاويف الاشجار وفي الادغال المستعصية . الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات مرتين او ثلاث مرات في العام . بيضها عاجي اللون لا يشوبه دنس . الحضن يستمر من ١٢ الى ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

يعتبر من العصافير الجزيلة النفع الواجب حمايتها .



N.S. Certhia familiaris.

Fr. Grimpeau des bois. Eng. Tree-Creeper.

مَتَوَقِّلُ الغَاب

طائر من المتوقلات ورتبة الجواثم رقيقات المناقير. اعطانه تشمل الشرق الادنى واروبة. يألف المناطق الجبلية واطحصها احراج التنوب والشربين.

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٤ سم. وبسطه نحو ١٦ سم. ثوبه متباين الالوان. رأسه وردائه وظهره وعجزه الى الشقحة السمراء تعلوها رقشة بيضاء. جناحاه مجدعان بالابيض وهما اشد سمره من الظهر وأكبر رقشة منه. زوره وصدرة وبطنه الى البياض العاجي تشويه مشحة غبراء خفيفة الوقع. ذنبه متوسط الطول، رتاجي الريش، اسمر اللون، اشقح الموج. منقاره مستطيل القد، بين الاحديداب، اسمر اللون. رسغاه قصيرتان حنطيتا اللون. اصابه مستطيلة لا سيما الخلفية. مخالفه محججة، حادة الأطراف، سوداء اللون. ثوب الأنثى لا يختلف عن ثوب الذكر واليافع منه كالبالغ.


يألف في لبنان معظم احراج الجرود واطحصها احراج القموعة حيث تكثر أشجار الشوح اي التنوب الاناضولي التي يتفقد قشورها الصلقة طوال النهار في طلب الحشرات ويرقاتها ومكناها. يتسلق ساق الشجرة حتى القنة ويرتمي منها الى الأرض ثم يتسلق غيرها متبعاً طريقة التنقيب نفسها. ويتنقل على صفحات الأغصان السفلى، ظهره للأرض، بخفة مدهشة ورشاقة تضاهي رشاقة العظاية.

طيرانه قصير الشوط وانتقاله على الأرض عرقصة خرقاء. زرقته صياح وجيز، قصير النبرة، لا يردده إلا نادراً وفي احوال معينة.

يدتن في تجاويف الأشجار. الانثى تبيض مرتين في العام. المرة الاولى في اواخر آذار والثانية في اواسط حزيران. الذكر يناوب الانثى في حضن البيض الذي يستمر نحو اسبوعين. الحضنة الأولى تتألف من ٧ او ٨ بيضات والحضنة الثانية من ٣ الى ٤، بيضها عاجي اللون تعلوه رقشة جووية يكثف تجميعها عند العقب.

قوته الحشرات ويرقاتها ومكناها لذلك فهو من الطيور الجزيلة النفع الواجب حمايتها.

يدتن عشه في الادغال وفي تجاويف الاشجار. الانثى تحضن مرتين في العام، الاولى في اواسط نيسان والثانية في اوائل حزيران. حضنتها تراوح من ٥ الى ٨ بيضات لونها الى الزرقة الباهتة تعلوها مشحة خضراء خفيفة. الحضن يستمر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الحماية والغذاء. يعتبر من العصافير الضوارب الجزيلة النفع الواجب حمايتها.



مُرْعَة شَائِعَة ، مُرْعَة مَرُوطَة


نوع من المُرْع وهو طائر من دجاجيات الماء وفصيلة التفلقيات. يدعى في مصر «مُرْعَة مَنَقَطَة» موطنه يمتد من اواسط وشمال البلاد الاسيوية الى اطراف اروبة ثم افريقية الشرقية والشمالية والاستوائية. يجوب المناقع وضفاف البحيرات والأنهار في طلب الرزق والمصيف والمشتى. يضيف الربوع اللبانية في رحلتي الربيع والخريف. اقامته في كل مرة لا تتجاوز بعض الأيام.

جسمه متوسط القد طوله نحو ٢١ سم. وبسطته نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الصهبة الحنطية السمر المواج. رأسه منمَّش بالأبيض. محسراه الى الطحلة. زوره وبطنه الى البياض الأغبر تعلوه ماجة سبورية. صدره الى الطحلة الحنطية المواج. ريش ردايه وظهره وعجزه اسود التقيح، ابيض الحتار. جناحه مستدير الشكل، معتدل الطول، مجذع بالأغبر. مقدم الخصر، من مستوى الصدر وصاعداً حتى أطراف علاط العنق، الى الشقحة الزيتية المواج. اواسط الخصر ومؤخره حتى الافنيك الى البياض الأغبر يعلوه تجذيع معترض اسود وابيض. افنيكه اصفر اللون صنائي المواج. ذنبه مخروطي الشكل صغير القد. عينه مطوقة ومكحلة بالاسود. حدقة عينه الى السمرة الخضراء المواج. منقاده متوسط الطول، دقيق الطرف، جالس الارتكاز، جوي القاعدة والثالث الاول، اصفر الثالث الثاني، اسمر الثالث الاخير حيث الطرف. ساقه واصابعه الى الخضار الزيتي الباهت.

الانثى اصغر قدماً من الذكر ولكنها تتحلّى بذات الثوب واليافع كذلك. يألف المناقع وضفاف البحيرات والأنهار. قوته الحشرات والبراق ويزور النباتات المائية. يسرح من الضحى الى الفجر ومن الغروب الى الظلمة وطوال الليالي القمرية. مأواه في النهار مخبأ بين السعادي او الاسل او الاعشاب المنقعة الرفيعة الكثيفة التجميع. يعدو على الأرض وبين الاسل والاعشاب الكثيفة بسرعة مدهشة ورشاقة كلية. يسبح ويعوض بخفة، طيرانه لا يختلف عن طيران سائر التفلقيات وهو سفيف معتدل السرعة، قصير الشوط، مستقيم الخط.

N.S. Porzana porzana, Porzana maruetta.
Fr. Porzane marouette, Marouette ponctuée.
Eng. Spotted Crane.

يدتّن عشّه وسط جمّ السعادي في مكان يعلو سطح الماء الذي يحيط به بعض الشيء. عشّه مستدير الشكل متهدل الحباك يضره بعصف النجيليات والسعادي. الانثى تضع من ٨ الى ١٨ بيضة مستطيلة الشكل، لونها الى الصفار الزيتي، تعلوه نمشة جووية تخالطها الشهية. الحضن يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى بمناوبة الذكر. الفراخ تنقف كاسية بالزغب الاسود وتبارح العش بعد التقف بثمانية وأربعين ساعة فتسعى كابويها وتنهج نهجها وتعدو وتسبح وتغوص وتسرع في الهرب وتحسن الاختفاء. يعتبر من الطرائد المتوسطة الصنف.



مُزَقَّة ، مُسَهْر

طائر من الهزار وفصيلة الدخليات. يدعى في مصر « مسهر لبلاندي ». موطنه يمتد من حوض البحر الأحمر الى حوض البحر الأبيض المتوسط الى اروبة الشمالية. وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان نحو ثلاثة أسابيع عند مرورها في طريق عودتها الى مناطق مشائها في سينا ومصر والسودان وليبيا.

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٥ سم. وبسطه نحو ١٩ سم. جناحه متوسط الحجم والانفراج. ذنبه معتدل الطول، مقطوم الطرف. رسغاه وأصابعه نحيلة. مخالبه ضعيفة. ثوبه متراكب الألوان الجميلة التنسيق والزخرفة. ثوبه العلوي الى الصهبة الحنطية الداكنة تعبق في الرأس حيث توجد خطوط سمر قاطبة. جناحاه ابهت ثوباً من ظهره. رقاب ذنبه الخارجية حمر الحواشي حتى الثلث الأخير ثم تنحرف الى الكستني العابق. محسراه الى الصنابي الوردي الموج يعلوهما خط ابيض يمتد فوق العين من فتحة المنشق الى مستوى القفن. زوره وأعلى صدره الى الزرقة الجميلة تتوسطها عند أسفل الزور بقجة حمراء مستعرضة الشكل. ويحد زرقة الزور ثلاثة خطوط متتابعة الاول اسود والثاني ابيض والثالث كستني. أما أسفل صدره فالى الصنابي الوردي الموج. بطنه وافنيكه الى البياض التني. عيناه مستديرتان. حدقة عينه كستنية اللون، منقاره صغير القد، دقيق الطرف المدبب، حنطي اللون. رسغاه وأصابعه الى الحنطي الاسمر.

الانثى كالذكر قدماً وثوباً إلا ان زرقة الزور والصدر تنحرف الى ربة تتوسطها بقجة صفراء.


يألف المواقع الرطبة والمناقع ومجاري الماء. قوته الحشرات والديدان وبعض الثمار العنينة التي تينع في الخريف.

يدثن عشه في العوسج وبين الادغال على ارتفاع بعض الاصابع عن سطح الأرض. عشه قلنسوي الشكل، جيد الحبك يغلفه بالجنثالة ويبطنه بالصوف والسيب. الانثى تضع

N.S. Luscinia svecica.
Fr. Gorge-bleue à miroir roux.
Eng. Bluethroat (Lapland form).

من ٦ الى ٧ بيضات مرة واحدة في العام وذلك في خلال شهر حزيران. يبضها اغبر اللون، أخضر الموج تعلوه نمشة كستنية. الترخيم يستمر نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء.

يعتبر من الضوارب الجزيلة النفع.



تَدَاخَة ، صَدَاخَة الغَاب

N.S. Luscinia melanopogon.
Fr. Lusciniole à moustaches.
Eng. Moustached Warbler.


البيض اغبر اللون تعلوه رقشة كستنية لا متساوية البعثة يكثر تجميعها عند العقب .
قوته الحشرات المجنحة انحصها الفراش والذباب والهوم ثم الديدان والبراق .
يعتبر من العصافير النافعة اللامؤذية .

طائر من الهوازج وفصيلة الدخليات . موطنه يشمل معظم مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط . اعطانه اللبانية تمتد من السواحل الى الجرود والقاع وهو من الاوابد التي قلما ترحل من منطقة الى منطقة .

جسمه منسجم الشكل ، رشيق القوام ، يطول نحو ١٣ سم . وتبلغ بسطته نحو ١٥ سم .
ثوبه الى البني الاطحل . رأسه ، من الجبهة الى القفن ، كستني اللون اسود المواج . محسره الى الكستني البني يعترضه خط ابيض يعلو العين ويمتد من المنشق الى القفن . رداؤه وظهره وجناحاه وعجزه وذنبه الى البني الاطحل يعلوه تمشيع عابق يزداد سمرة في الجناح والذنب .
جناحه مستدير الشكل ، اطول قوادمه الثالثة والرابعة والخامسة . زوره اغبر ابيض . صدره الى الغبرة البنية المواج . بطنه وايطلاه وافنيكه الى الغبرة الصدئية يعلوها مواج أصفر . عيناه مطوقتان بالاغبر الاصهب . حدقة عينه بنية . سباله وافر الهلب وهو ما دعى الى تلقيبه في بعض البلاد « بأبي شوارب » . منقاره رشيق الشكل . مدبب الطرف ، بني اللون ، اسمر المواج . رسغه وأصابعه ومخالبه الى السمرة البنية الداكنة .

الانثى اصغر قدماً من الذكر وابتهت ثوباً منه .
يألف المقاصب والمآسل والآجام الغضة الكثيفة النبات وشفاف مجاري الماء . يتميز بعدم الوجل وبقلة الحذر وبخفة الانتقال وبيطاء الطيران وبقصر الشوط . يخوض الماء بسرعة ورشاقة لالتقاط ما يعلو سطحه من حشرات . تغريده زققة لطيفة متباينة الانغام القصيرة المعودة . يدئن عشه في الآجام والمقاصب حيث يجمع بعض العصف فيشكله على ارتفاع متر أو أقل عن سطح الأرض او المنقع او الماء ثم يحبك عليه وفوقه عشاً صغيراً من القش الناعم يبطنه بالسبيب والصوف والرغب .

الانثى تحضن ثلاث مرات في السنة . المرة الاولى في اوايل ايار والثانية في اواخر حزيران والثالثة في اواخر آب . حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .



N.S. Serinus syriacus.
Fr. Serin de Syrie.
Eng. Syrian Canary.

نَعَّار ،
نَعْر سُورِي

نوع من النعور وهو عصفور غريب من فصيلة الشرشوريات. يدعى في مصر «نعار شامي وصباح شامي». اعطانه البلاد اللبنانية السورية. يألف جميع المواقع باستثناء الجرداء الخالية من الشجر.


جسمه صغير القَدِّ ممشوق. طوله نحو ١٢ سم. وبسطه نحو ١٥ سم. ثوبه ترنجبي اللون يعلوه في ظهره وجناحيه تمشيح اسمر. عجزه ذهبي اللون. ذنبه فارق الطرف لونه الى الصفار الأخضر الاسمر. زوره وصدرة وبطنه الى الصفار البرتقالي المواج تعلوه رقشة سمراء مستطيلة. افيكه الى الصفار الباهت. منقاره مخروطي الشكل، صغير القَدِّ، حنطي الجسم، اسمر الملقط. عيناه صغيرتان مستديرتان. حدقة عينه بنية اللون. رسغاه وأصابعه الى السمرة. مخالبه دقيقة، محججة، حنطية اللون.

الانثى اصغر قدًا من الذكر ورأسها اقل استدارة من رأسه وثوبها اقل لمعة وخصيياً من ثوبه. يدئن عشه في مختلف الأشجار الوارفة الظلّ ويحسن حبكه وتغليفه وتبطينه كما يفعل الحسون. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات عاجية اللون تعلوها رقشة جووية لا قياسية التجميع. الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمّن لها الغذاء.

يتميز بالحنفة والرشاقة وحسن التغريد وعدم الوجل. يألف القفص ويقتبس ادب التغريد ويجيده ويساقد الكنار والحسون والكعتر والتففيجي.

قوته البزور البرية المختلفة ثم الثمار السكرية وخصها التين السالك ثم الديدان ومكن الحشرات ومازان النمل ودباه.

يعتبر من العصافير المتوسطة النفع.



N.S. Vultur monachus,
Aegypius M. monachus.

Fr. Vautour moine, V. cendré,
V. arrien, Grand vautour.

Eng. Hooded Vulture, Cinereous Vulture.

نَسْر الجِوَاء

طائر من النسور وفصيلة النسريات. موطنه العالم القديم يجوب اجواء معظم البلاد الاسيوية والاروية والافريقية واطرها الشرق الاوسط واروية الجنوبية وافريقية الشرقية والشمالية. يعتبر من صوارب لبنان التي تقيم فيه وقتاً طويلاً.


جسمه ضخيم الشكل، كبير القَدِّ. طوله نحو ١٢٥ سم. وبسطه سقطيه نحو ٢٥٠ سم. ثوبه الى السمرة الحنطية الغبراء الداكنة. رأسه اصلع. حدقة عينه كستية اللون. منسره كبير القَدِّ، جالس السطح، اسمر اللون، حاد البهرة المنعقة الزرقاء. زفده سبوري اللون. عنقه اغفر الريش الاطحل. برائله مهذل الزغب حنطي اللون. سقطة منفرج، مستطيل، يلحف الذنب. ذنبه قصير القَدِّ، مستدير الطرف. ساقه عارية سبورية اللون. رسغه قوية، سردية. اصابعه قصيرة. مخالبه ضعيفة، متوسطة التحجين.

ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر. والذكر لا يفارق اناثه مدى الحياة. وهو يألف الحياة الجماعية. سر به في تجواله من بلاد الى بلاد لا يقل عن ثلاثة ازواج ولا يفوق الستة. طيرانه حوم وتحليق يقال انه يرتفع في الفضاء ارتفاع العقاب وقد يفوقه تحليقاً ولكنه لا ينازعه البسالة والبطش والسيطرة.

يألف قمم الجبال والسهول على السواء. قوته الجيف على اختلاف انواعها واذا جاع تعدى على الغنم والماعز. وهو شره، نهم، رغب، اذا وقع على جيفة وامتلأ منها لم يستطع الطيران حتى يشب وثبات متتالية يرتفع على أثرها شيئاً فشيئاً.

يدئن وكنه بين فروع شجرة داسية على ارتفاع بضعة اقدام من الأرض. اناثه تبيض رقتين كبيرتين لونهما الى الوردية تعلوها رقشة حمراء. الحضن يستمر نحو اربعة أسابيع تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

يعتبر من الكواسر النافعة لانه ينظف البلاد من الجيف.



N.S. Picus medius,
Dendrocopos medius.

Fr. Pic mar, Pic à tête rouge.

Eng. Middle-spotted Woodpecker.

نقَّار أَحْمَرُ الرَّأْسِ،


فِرَاعِ أَحْمَرِ الرَّأْسِ، نَاقُوبَةُ حَمْرَاءِ الرَّأْسِ

نوع من النِّقَّار وهو طائر متسلِّق ينتمي الى فصيلة النِّقَّاريَّات. موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة. اعطانه اللبناية لا تتعدى احراج السنديان في اي موقع كانت. جسمه متوسط القد، طوله نحو ١٨ سم. وبسطه نحو ٢٤ سم. ثوبه جميل الالوان المتباينة الزاهية. رأسه احمر القلنسوة التي تمتد من الجبهة الى القفن. رداؤه وظهره وعجزه الى السواد اللامع. محسراه وزوره الى البياض الأغير. علاطا عنقه وجناحاه الى السواد اللامع المبقَّح والمجدَّع بالابيض. صدره الى الصفرة الصنابية يعلوها توشيم مستطيل اسمر. بطنه وافنيكه الى الحمرة الوردية المواج. جناحه متوسط الانفراج، ذلق الطرف. ذنبه مخروطي الشكل، معتدل القد، اسود الصفحة العليا، مجدَّع السفلى بالأصفر الباهت. حدقة عينه حمراء اللون. منقاده مخروطي الشكل، مخدَّد الجرم، اكهب اللون العابق. ساقاه قصيرتان، جزئيتا السرولة، لونهما ولون الاصابع الى الكهبة العابقة. مخالبه سمراء اللون، معتدلة التحجين، حادة الأطراف.

الانثى تتحلَّى بثوب الذكر والياغ منه كالبالغ.

يألف احراج السنديان دون سواها في أي منطقة كانت ويركب كسائر انواع جنسه جذوع الاشجار فيقرعها وينقر قشورها وينقب شكيرها لاستخراج ما فيها من أساريع وديدان. قوته الحشرات على اختلاف انواعها وادوار حياتها ثم البلوط وبعض البزور البرية. يدنن عشه في تجاويف الأشجار اخصها السنديان. الانثى تضع في اواسط شهر أيار من ٥ الى ٧ بيضات مكورة الشكل، ناصعة البياض. الحضن يدوم نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

يعتبر من الطيور النافعة التي تستحق الحماية.



N.S. Coccothraustes vulgaris.

Fr. Gros-bec vulgaire,
Gros-bec commun.

Eng. Common Hawfinch.


نُقَّاذ مَبْدُول

طائر من النُّقَّاذ وفصيلة الشرشوريَّات. يدعى في مصر «بلبل زيتوني». موطنه معظم المناطق المعتدلة الحرارة من العالم القديم. اعطانه اللبناية تشمل السواحل والجرد وبعض مناطق البقاع.

جسمه ضخم الشكل. طوله نحو ١٩ سم. وبسطه نحو ٢٤ سم. رأسه كبير القد كسبتي اللون. قفنه الى الصهبة الرمداء. زوره اسود. عنقه اريد. رداؤه وظهره وعجزه الى البني يعقب ويدكن في الرداء ويصفر في العجز. صدره وبطنه الى الصهبة الخمرية. افنيكه ابيض. كلي جناحه الى البني العابق الاسمر المواج. قواده الى السمرة السوداء يعلوها تبقج ابيض على النصل الأنسي. اباهره ببيض. خوافيه الى السمرة السوداء يعلوها موج ارجواني. ذنبه اسود القاعدة والنصف الأول، ابيض النصف الثاني. لواحف ذنبه بيبة اللون. حدقة عينه وردية. منقاده مخروطي الشكل لونه الى الزرقة العابقة. رسغاه واصابعه الى الطحلة الحمراء المواج مخالبه سود. الانثى كالذكر الا انها ادكن ثوباً.

يألف الاحراج والغابات اخصها احراج الصنوبر والتنوب ولا يقرب من الحدائق والجنانن الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة الى القوت. وهو حذر، شديد اليقظة، لا يغفل عن سلامته في اي وقت كان. يتنقل على الاغصان وبين الأشجار برشاقة وخفة ولكنه يتعثر على الارض نظراً لثقل جسمه وقصر ساقه.

يتميز بمنقاده الضليغ الذي يمكنه من كسر عجمة اللوز والخوخ والكرز باقل من نصف دقيقة. قوته الثمار الجافة وبعض الحبوب والحشرات واخصها الخنافس ويرقاتها ويقتنص الحشرات الطائرة ويذهب بها الى اقرب شجرة حيث يأكلها بعد ان ينتزع منها اغمادها وارجلها. يدنن عشه في الأشجار الفناء. عشه قدحي الشكل، متين الحبل الجيد يبطنه بالحشيش الناعم والسيب والصوف. الانثى تضع في اواخر شهر أيار من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً. يبيضها الى البياض الأغير تشويه ماجة خضراء ورقشة سمراء داكنة. يعتبر من الطيور المتوسطة النفع.



N.S. Picus major,
Dendrocopos major.

Fr. Pic épeiche.

Eng. Great-spotted Woodpecker.

نقّار كبير ،
قرّاع كبير ، ناقوبة الصنوبر

نوع من النقّار وهو طائر متسلّق من فصيلة النقّاريّات . موطنه شاسع الاطراف يمتدّ من اواسط الشرق الى اطراف اروبة الغربية . اعطانه اللبانيّة تشمل جميع احراج الصنوبريّات . جسمه ربع القامة ، متوسط القدّ ، طوله نحو ٢٤ سم . وبسطه نحو ٢٨ سم . ثوبه متباين الالوان . رداؤه وظهوه وعجزه الى السواد اللامع . عنقه ومحسراه وجناحاه مبقّجة بالابيض . رأسه اسود . قفنه ومؤخر بطنه وافنيكه الى الحمرة الزاهية . زوره وصدره وبطنه الى البياض الاغبر . حدقة عينه جووية اللون . منقاده مخرزي الشكل ، مخدّد الجرم ، كهب اللون ، رصاصيّ المواج . جناحه متوسط الانفراج ، ذلق الطرف ، اطول قوادمه الثانية والثالثة . ذنبه متوسط الطول مخروطي الشكل ، اسود الصفحة العليا ، ابيض السفلى المجذّعة بالاسود . ساقاه قصيرتان ، جزئيّتا السرولة ، لونهما الى الكهبة الرصاصية والأصابع كذلك . مخالفه كستنيّة اللون ، متوسطة التحجين ، حادّة الاطراف .


الشقّان لا يختلفان الا بحمرة القفن التي تتحوّل الى سمرة عند الانثى .

يألف احراج الصنوبر والتنوب والشربين والشوح والارز ولا يقترب من الحدائق والجنانث الا عند الحاجة الماسّة الى الطعام . يركب جذوع الأشجار فيقرعها وينقر القشور واللحاء وينقب الشكير لاستخراج ما فيها من أساريع وديدان .

قوته الحشرات ويرقاتها وأساريعها من النمل الى العناكب والخنافس والجنادب .

يدلّن عشّه في تجويف شجرة نخرة . الانثى تضع في اواسط شهر ايار من ٥ الى ٧ بيضات مستديرة الشكل بيضاء اللون . الترخيم يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

يعتبر من الطيور الجزيلة النفع التي تستوجب الحماية .



N.S. Picus minor, Dendrocopos minor.

Fr. Pic épeichette.

Eng. Lesser-spotted Woodpecker.

نقّار صغير ،
قرّاع صغير ، ناقوبة السنديان


طائر متسلّق من النقّار . موطنه يمتدّ من الهند الى الشرق الادنى ومعظم بلاد اروبة باستثناء الاصقاع الشماليّة . اعطانه اللبانيّة تشمل المناطق الحرجيّة واخصّها احراج السنديان . جسمه صغير القدّ . طوله نحو ١٥ سم . وبسطه نحو ٢٠ سم . ثوبه العلويّ الى السواد العابق اللامع يعلوه تجذيع ابيض معترض . جبهته ومقدّم رأسه الى الحمرة القرمزيّة . مؤخر قمة الرأس والقنّة الى السواد اللامع . محسره الى البياض الاغبر يحده من الشدق الى منتصف العنق جدّة سوداء تتسع وتسدل بعض الشيء على علاط العنق . زوره وصدره وبطنه الى الصفرة الصنائيّة يعلوها توشيم دقيق ، متباعد ، عابق ، ويتوسّط صدره سيالة سوداء تمتدّ من قاعدة المنقاد الى اواسط الجوشن . عيناه مستديرتان . حدقة عينه ياقوتية اللون . منقاده مخرزي الشكل ، مخدّد الجرم ، اطحل اللون ، اسمر المواج . جناحه متوسط الانفراج ، ذلق الطرف . ذنبه مخروطي الشكل ، صغير القدّ ، اسود الصفحة العليا ، ابيض السفلى المجذّعة بالاسود . ساقه قصيرة جزئيّة التسرول . رسغاه وأصابعه الى السمرة الرصاصية . مخالفه معتدلة التحجين ، سمراء اللون .

الشقّان لا يختلفان الا بحمرة الرأس التي تتحوّل الى بياض عند الانثى .

يألف الاحراج على اختلاف اشجارها وقد يفضّل احراج السنديان على غيرها فيقرع جذوعها وينقب قشورها لاستخراج ما فيها من أساريع وديدان . قوته الحشرات ومكناها وأساريعها ويرقاتها والديدان .

يدلّن عشّه في تجاويف الأشجار النخرة . الانثى تضع في اواسط شهر ايار من ٥ الى ٧ بيضات مستديرة الشكل عاجية اللون منمشة بالأسمر . الحضن يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

يعتبر من الطيور النافعة التي تستوجب الحماية .



N.S. Phyllopneuste rufa,
Phylloscopus collybita.

Fr. Pouillot véloce. Eng. Chiff-chaff.

نَقْشَارَةٌ صِنَائِيَّةٌ ،
سُكْسَكَةٌ صِنَائِيَّةٌ


طائر من النقشار وفصيلة الدخليات. اعطانه لا تختلف عن اعطان نقشارة الحدائق وهي تشمل معظم اقطار البلاد الاسيوية والاروية وافريقية الشمالية. يقيم في الربوع اللبنانية بعض الاسابيع .

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٢ سم. وبسطته نحو ١٤ سم. ثوبه متداخل الالوان. رأسه ورداؤه وظهره وعجزه الى الرتبة الخضراء الصفراء الصنائية المواج، تعبق في الرأس وتخف تدريجياً باتجاه العجز الذي يبدو باهتاً. جناحاه الى النبي الصناني المهذب بالأصفر. ذنبه بني اللون، اسمر المواج. زوره وصدرة وبطنه الى البياض الأغبر تعلوه مشحة بنية صفراء الماجة تكتنف الايظلين وجانبي الصدر. عيناه مكحلتان بالنبي العابق يعلوهما خط قاطب اخضر اللون يمتد من قاعدة المقار الى طرف المحسر. حدقة عينه كستنية اللون. مقاره مخروطي الشكل، مستعرض القاعدة، داكن السمرة. رسغاه وأصابعه الى السمرة السوداء.

الشقان لا يختلفان الا بزهاء الثوب الأكثر لمعة عند الذكر. اما اليافع فتوبه ثوب البالغ. يتميز بكثرة النشاط والمرح والتبلج. ينساب بين الأشجار واغصانها ويندس بين الأدغال وفيها بخفة ولباقة لا مثيل لهما. سعيه يشبه سعي الدخلة ومشيها الخفيفة الحذرة غير انه يخفض الذيل من وقت الى آخر بخلاف الدخلة التي ترفعه. تغريده زقزقة ثلاثية النبرات يرددها طوال النهار من اوائل الربيع الى اوائل الخريف.

يألف الأحراج والغابات المبعثرة الأشجار والحدائق والجنان القريبة من العمران. يلدن عشه في الأشجار الفناء واخصها الشربين والسرو. عشه اهليلجي الشكل جانبي المدخل تحوكة الاثني بينما يؤمن لها الذكر جميع المواد اللازمة. الاثني تحضن مرتين في العام، الاولى في مطلع شهر ايار والثانية في اواسط حزيران. حضنتها تتألف من ٤ بيضات لونها الى البياض العاجي تعلوه نمشة جووية خفيفة يكتف تجميعها عند العقب. الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الاثني بمناوبة الذكر.

قوته الحشرات الصغيرة المختلفة وبقاناتها وكزودها ومكناها واخصها الذباب والاروق والقمص. لذلك فهو من العصافير الجزيلة النفع الواجب حمايتها.



N.S. Phyllopneuste trochilus,
Phylloscopus trochilus.

Fr. Pouillot fitis, Chantre.

Eng. Willow-Warbler, Willow-Wren.

نَقْشَارَةٌ الْحَدَائِقُ ،
سُكْسَكَةٌ الْحَدَائِقُ


طائر من النقشار وفصيلة الدخليات. اعطانه تشمل معظم اقطار البلاد الاسيوية والاروية وافريقية الشرقية والشمالية. يستوطن بعضها ويجوب البعض الآخر طلباً للرزق والمصيف والمشتى. يضيف لبنان بعض الاسابيع .

جسمه صغير القد. طوله نحو ١٢ سم. وبسطته نحو ١٤ سم. ثوبه متراكب الالوان. رأسه ورداؤه وظهره وعجزه الى الرتبة الخضراء. زوره وبطنه الى البياض الأغبر. صدره وبطوله الى الشبهة الصفراء. جناحاه وذنبه الى النبي المهذب بالأخضر. عيناه مكحلتان بالنبي العابق يعلوهما خط الى الصفار الفستقي يقطب المنطقة من قاعدة المقار الى طرف المحسر. حدقة عينه كستنية اللون. مقاره مخروطي الشكل، مستعرض القاعدة، اسمر اللون، زيتي المواج. رسغاه الى الرتبة الجووية.

الشقان لا يختلفان الا بزهاء الثوب الأكثر لمعة عند الذكر. اما اليافع فتوبه ثوب البالغ. يتميز بكثرة النشاط والمرح والتبلج. ينساب بين الأشجار واغصانها ويندس بين الأدغال وفيها بخفة ولباقة لا مثيل لهما. سعيه يشبه سعي الدخلة ومشيها الخفيفة الحذرة غير انه يخفض الذيل من وقت الى آخر بخلاف الدخلة التي ترفعه. تغريده زقزقة ثلاثية النبرات يرددها طوال النهار من اوائل الربيع الى اوائل الخريف.

يألف الأحراج والغابات المبعثرة الأشجار والحدائق والجنان القريبة من العمران. يلدن عشه في الشجيرات والأشجار المتدونة القليلة الارتفاع عن الأرض. عشه شبه مخروطي الشكل جانبي المدخل تحوكة الاثني وتجيد حبكه بينما الذكر يؤمن لها المواد اللازمة. الاثني تحضن مرتين في العام. المرة الاولى في مطلع ايار والثانية في اواسط حزيران. حضنتها تتألف من ٤ أو ٥ بيضات لونها الى البياض الناصع تعلوه رقشة جووية. الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الاثني بمناوبة الذكر.

قوته الحشرات المختلفة وبقاناتها وكزودها ومكناها. لذلك فهو من العصافير الجزيلة النفع الجديرة بالحماية.



N.S. Calamodyta phragmatis,
Acrocephalus schoenobaenus.

Fr. Phragmite des joncs,
Rousserolle des souchets.

Eng. Sedge-Warbler.

هَازِجَة السُّعْد، هَازِجَة الأَسَل،
هَازِجَة السَّمَار، أم نُوح

الاسم المصري «وش الدبية». طائر من الهواجز وفصيلة الدخليات. اعطانه تمتد من اطراف البلاد الاسيوية الى اطراف البلاد الاروية المعتدلة الحرارة وبعض مناطق افريقية الشمالية. وهو من اوايد بعض اقاليم الشرق والشرق الأدنى ومن ضوارب اروبة وافريقية الشمالية. اعطانه اللبانية تشمل جميع الآجام والرياض والمناقع وضفاف الأنهار.


جسمه صغير القد، يطول من ١٢ الى ١٣ سم، وبسطته نحو ١٤ سم. ثوبه الى السمرة الزيتونية العابقة تبهت مع ابتعادها عن الرأس والرداء باتجاه الذنب. زوره ابيض. صدره وبطنه وخوافيه الى الصهية الصفراء الباهتة. محسراه الى السمرة الحنطية يعلوها من جانبيها بمستوى سطح العين خط ابيض اصفر يمتد من المنشق الى طرف المحسر. منقاره ورسغاه الى السمرة الحنطية. حدقة عينه عسليه اللون صناعية الموج.

يألف، كما ذكرنا اعلاه، الآجام والمناقع والمقاصب. قوته الحشرات المجنحة الصغيرة القد والذباب والهوم، يلتقطها طائرة وجائمة. وعندما تقل الحشرات، في فصل الخريف، يستعوض عنها بالثمار العنينة البرية.

يعتبر من الطيور الوجلة التي تخشى كل شيء جديد، يتنقل على حسف الاسل والسمار بخفة ولباقة لا مثيل لهما. طيرانه كثير الاشكال، لا يرتكز على اسلوب؛ يتبدل من شوط قصير القاب، متموج الخط، الى تحليق يكثر فيه الحوم والصعود والهبوط الى سفيف يكاد يلامس التربة والنبات.

زرقته لا قياسية الايقاع لانه يقلد تغريد غيره من العصافير فيردد بصوته الثاقب الكاعن. صياحه عند الخوف والاستجداء صرير متقطع حاد.

يسرح من الشروق الى الغروب. زمن السقاد والترخيم يستمر من اوائل نيسان الى اواخر ايار. يدن عشه في الأدغال وفي الشجيرات المنقعة الكثيفة الأوراق. عشه قمعي الشكل حسن الحبك يطنه بالصفوف والسبيب والزغب. الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٢ الى ١٤ يوماً. بيضها اصهب اللون يعلوه تنقيط اسمر وتمشيح أغبر. يعتبر من العصافير المتوسطة النفع القليلة الأضرار.



N.S. Hoplopterus spinosus.

Fr. Hoploptère épineux,
Vanneau à éperon.

Eng. Spur-winged Plover.

نُهْبُوغ نَاحِس، زَقْرَاق نَاحِس

طائر من النهبوغ وفصيلة الزرققيات. يدعى في مصر «أبو ظفر» و «زقراق بلدي». اعطانه تمتد من الحبشة الى السودان ومصر والجزيرة العربية والعراق وسائر اقطار الشرق الأوسط وحوض البحر الأسود واليونان. يجوب بعض اصقاعها كل عام طلباً للرزق والمصيف والمشتى. يقيم في لبنان وقتاً قصيراً لا يتجاوز بعض الايام.

جسمه متوسط القد طوله نحو ٣٠ سم. وبسطته نحو ٤٥ سم. رأسه وزوره وصدره الى السواد العابق تلعوه ماجة زرقاء. ريش قفنه مستطيل القد منسدل الى الوراء. رداؤه وظهروه وجناحاه الى الصهية السمراء. محسراه وعلاطا عنقه وبطنه وافنيكه وكتفاه وأواسط جناحيه الى البياض الناصع. اطراف قوادمه سود، عجزه ابيض، ذنبه اسود. عيناه كبيرتان بيضيتا الشكل. حدقة عينه كستنية اللون، قرمزية الموج. منقاره متوسط الطول قليل الاحديداد اسمر اللون. ساقه سمراء، مستطيلة، عفبة، ثلاثية الاصابع الامامية، عادمة الخلفية. يتميز بوجود شوكة مستطيلة، حادة الطرف، ناخسة، سوداء اللون، مركزها في مقدم المنكب. وهما شوكتان: في كل منكب واحدة.

يألف الاخوار وضفاف الانهر والبحيرات. يعدو على الأرض بسرعة ويطير بخفة. يعتبر من الطيور اليقظة الجريئة الشديدة الميل للقتال ويعيش ازواجاً متجاورة تجتمع عند الرحيل فقط الى اسراب متوسطة العدد.

ويتميز ايضاً بزرقه عالية خاصة تسمع عن بعد يرسلها قبل ان يطير وفي اثناء طيرانه، وكلما شاهد ما يتوقع منه شرّاً ينبه صاحبه وسائر الطيور الى الخطر المتوقع فيولين الادبار. قوته الحشرات والديدان والرخويات والقشريات.

يدن عشه في افحوص يحتفره بالرمل او التراب ويطنه بالحشيش والعصف الناعم. الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات لونها الى الخضار الزيتي الفاتح تلعوه رقشة سمراء داكنة. الحضن يستمر نحو ثلاثة أسابيع تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.



N.S. *Upupa epops*.

Fr. Huppe commune, Huppe vulgaire.

Eng. Common Hoopoe.

هُدُودُ شَائِعٍ ، دُونِكُ الْجَبَلِ

طائر من الهدهد أخرج الثوب متوج الرأس ينتمي الى فصيلة الهدهديات ورتبة الجوائم رقيقات المناقير . كنيته أبو الأخبار وأبو ثمامة وأبو قامة وأبو الربيع وأبوروح وأبو سجاد وأبو عباد . ج هداهد وهداهيد .


اعطائه تشمل بعض البلاد الاسيوية والشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية وافريقية الشمالية والشرقية ، وهو من اوابد لبنان المبذولة في السواحل والوسط واواسط الجرد .

جسمه رشيق القوام ، متوسط القد ، يطول من ٢٧ الى ٢٨ سم . وبسطه من ٣٠ الى ٣٢ سم . ثوبه متداخل الالوان الزاهية تغطي عليه الصهبة الطحلاء . جناحه وظهره الى الصهبة القاتمة يعلوها تسنج اسود وابيض يتخلله الاصفر . ذنبه عشاري الرفال ، متوسط القد ، مستعرض الطرف المقطوم ، اسود اللون ، ابيض الجانبين والوسط . رأسه مستطيل الشكل ، تعلوه قترعة مروحية كبيرة القد تمتد من قاعدة المنقاد الى القفن ، لونها الى الشقحة الكدرية ، اطرافها سود . منقاده مستطيل الشكل ، ضعيف الجرم ، دقيق الطرف ، بين الاحديداب ، اسمر اللون . لسانه مزواني الصفحة ، متوسط الطول . رسغه قصيرة ، سرديّة القشار . ساقاه وأصابعه الى الطحلة السّورية .

يألف الكروم والزواتين والجنانن والاحراج المبعثرة الاشجار والودية ومجاري الماء ويمتنع عن السهل . وهو شديد الحذر والوجل والخوف حتى انه يخشى الكلب والثور . وعندما يلمح ما يخيفه من الطير الكواسر يرتمي على الأرض باسط الجناح طارح الراس الى الوراء فيبدو كالحرقرة الرقماء الى ان يزول الخطر .

طيرانه لا قياسي النمط ، متقطع الشوط المتوسط القاب . وقبل ان يحط على شجرة يحوم حولها ويصفّ جناحيه ثم يهبط . سعيه على الأرض عدو طبيعي لا ازدحام فيه ولا عرقصة .

يبدئن في تجاوبف الاشجار واوقاب الصخور وصدوع الجدران . عشه كالصحن المكفوف الاطار تدبره الانثى بما تيسر لها من مواد وهي تحضن مرّة واحدة في العام . تبيض من ٤ الى ٧



N.S. *Acrocephalus arundinaceus*,
Calamoherpe turdoïdes.

Fr. Rousserolle turdoïde,
Grive de rivière.

Eng. Great-reed Warbler.

هَازِجَةُ الْقَصَبِ ، حَشَّعُ الْغَابِ

طائر من الهوازج وفصيلة الدخليات . موطنه يمتد من افريقية الاستوائية الى الشرق والشرق الاوسط واروية الشرقية . يجوب بعض اصقاعها كل عام في طلب المصيف والمشتى . وهو من ضواري لبنان يقيم فيه من اواسط نيسان الى اواسط او اواخر ايلول .


جسمه متوسط القد يطول من ١٩ الى ٢٠ سم . بسطه نحو ٢٢ سم . جناحه مستطيل الشكل ، ذرب الطرف . ذنبه رتاجي الريش ، مخروطي الجرم ، محدب الطرف . ثوبه متداخل الالوان . رأسه ورداؤه وظهره وجناحاه وعجزه وذنبه الى الصهبة الصفراء المواج تغبر وتعبق في الرأس وغطاء الجناح اطرافه واطراف الذنب . زوره ابيض اغبر . جوشنه الى الكهبة المستنجة بالاسمر . بطنه الى البياض الاشقق . محسره أبهت لوناً من رأسه ويعلوه خط ابيض يكتنف سطح العين حتى المنشق . حدقة عينه عنايّة اللون . منقاره مستعرض القاعدة ، مدب الملاقط ، اسمر اللون ، حنطي المواج . رسغاه وأصابعه الى السمرة الحنطية . مخالبه دقيقة ، معتدلة التحجين ، حنطية اللون .

يألف المقاصب والآجام والمنافع ومجاري الماء ويتنقل بين القصب والغزار بخفة ورشاقة لا مثيل لهما ويتميز بالجرأة والاقدام وبميله الجامح الى القتال خاصة في زمن السقاد حيث يتم انتقاء رفيقة الموسم بعد الاقتال في سبيلها بحضورها .

يبدئن عشه في المقاصب على ارتفاع ٦٠ او ٧٠ سم . عن سطح الأرض او الماء . عشه كالطاس يصفه عند ملتقى الثلاث او الاربعة قصبات التي يجمعها الى بعضها بخيوط من الليف يلحفها بما استطاع من الحسف فيبدو كأنه معلق بين هذه القصبات . الانثى تضع عند اواسط حزيران من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوماً . يبيضها ازرق اللون ، اخضر المواج ، تعلوه رقشة سمراء تتخللها الكهبة .

قوته الحشرات والهوام اخصها اليعاسيب والنعر والبعوض .

يعتبر من الطيور النافعة لانه يقضي على الكثير من الحشرات الضارة .



N.S. Luscinia luscinia,
Philomela major.

Fr. Rossignol progné.

Eng. Sprosser, Thrush Nightingale.

هَزَارٌ أَشْرَقٌ

طائر غريد من الهزار وفصيلة الدخليات. يدعى في مصر «عندليب». موطنه الصيفي يمتد من جبال القوقاز الى الاورال واروبه الوسطى والشمالية. موطنه الشتوي يمتد من الجزيرة العربية الى افريقية الشرقية والاستوائية. وهو من الضوارب التي تقيم في لبنان من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع في اثناء عبورها نحو مناطق ممتاها.

جسمه صغير القد، رشيق القوام. طوله نحو ١٨ سم. وبسطه نحو ٢٤ سم. جناحه متوسط الحجم والانفراج. ذنبه ضمي الشكل، معتدل الطول، مستدير الطرف الضيق. ثوبه جميل الالوان المتداخلة وهو الى الحنطي الاصهب الموج يعبق وتعلوه نمشة سمراء في الرأس والرداء والجناح. ذنبه الى الصهبة الحنطية الصنابية. زوره ومؤخر بطنه الى البياض الأغبر. صدره ومقدم بطنه الى الصفرة الحنطية يعلوها بياض اكدر. عيناه كبيرتان مستديرتان. حدقة عينه كستنية اللون. منقاره صغير القد، دقيق الجرم، مدبب الطرف، حنطي الافك الاعلى، اصفر الاسفل. رسغاه وأصابعه نحيلة الجرم، حنطية اللون صفراء الموج. صداحه قريب الشبه بصداح عندليب ولكنه لا يجاربه برقة الشدو وحسن الالحن وتباين الأنغام.

يألف الغابات والاحراج والحدائق والادغال على السواء. قوته الحشرات المختلفة وأخصها الصغيرة والاساريع والديدان والنمل. يعتبر من العصافير النافعة المفيدة.

بيضات ترخمها وحدها نحو ١٦ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء. يبضها صغير القد، مستطيل الشكل، اخضر اللون، اصفر الموج، منقطة بالأبيض.

ومن خصائص هذا الطائر، الرائحة الكريهة التي تنتشر باستمرار حول العش فتحول دون اقترابه من كل حيوان. قيل فيما مضى ان مصدرها القذارة التي تحيط بالعش واختمار هذه القذارة. وقد ثبت اليوم انها من افراز الغدة الزيتية وان الانثى لا تفرز هذه المادة الكريهة الا في اثناء الحضن لإبعاد الحيوانات وكواسر الطير عن يبضها وفرادها.

قوته الحشرات والديدان يتقّب عنها بمنقاده المستطيل في جميع الاماكن وفي النفايات والاقذار. وعندما لا يتمكن من ابتلاع حشرة التقطها بالعرض فانه يقذفها في الفضاء وبلتقطها ثانية وان لم يتمكن من اخذها بالوضع الطولي يعيد الكرة مرّة ثالثة ورابعة الى ان يتمكن منها. يعتبر من الطيور الجزيلة النفع الواجب حمايتها.

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام



وَرَشَان

الواحدة ورشانة والجمع وراشين وورشان. نوع من الحمام البري القاطع. موطنه فسيح الارحاء يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية والغربية. يعتبر من الصوارب التي تضيف الربوع اللبناية بضعة أيام.

جسمه كبير القد، منسوب الشكل والقوام، يطول نحو ٤٥ سم. وتبلغ بسطته نحو ٥٨ سم. ثوبه متراكب الالوان المنسجمة. رأسه وعنقه وزمكاه ولواحف ذنبه الى الرمادي الازرق الموج. رداؤه واعالي عنقه الى الخضار الذهبي الازرق الموج. ظهره ولواحف جناحيه الى الربرة السمرء. قوادمه ومناكبه الى الشبهة الحنطية الزرقاء يطوقها حثار ابيض. علاطا عنقه تنتهيان بهلالين اطحليين. زوره وصدره الى الربرة الخمرية السفعاء. بطنه وايطلاه الى الشبهة تعلوها مشحة زرقاء خفيفة. ذنبه متوسط الطول، مقطوم الطرف، يتكون من ١٢ رفة لونها الى الطحلة العابقة يزداد اسمراراً واسوداداً مع اقترابه من الطرف في الصفحة العليا ويعترضه في الصفحة السفلى جدّة مستعرضة كهباء اللون تعلوها ماجة زرقاء.

عيناه كبيرتان مستديرتان. حدقة عينه صفراء اللون. ساقاه وأصابعه الى الحمرة الداكنة. مخالبه قوية، متوسطة التحجين، حنطية اللون القاتم. منقاده احمر القاعدة، حنطي الطرف، ابيض الحثار الذي يطوق المنشقين.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وتحتل بذات الثوب باستثناء حجم هلال العلاط الذي لا يتجاوز ثلثي حجم هلال الذكر.

يألف الاحراج والغابات والحقول والمراعي القريبة منها. يعدو على الأرض بخفة ولباقة. ويطير بسرعة برغم ثقل الهمة. طيرانه سفيف وحموم وتحليق وتصعيد وتهيبط.

يعيشان ذكراً وأنثى لا يفرقهما سوى الموت. سربه في تجواله ورحيله لا قياسي العدد الذي يراوح من ٢٠ زوجاً الى ٢٠٠ زوج وأكثر.

قوته الثمار والبيذور والحبوب المختلفة وبعض الحشرات.


N.S. Columba palumbus.

Fr. Colombe ramier, Grand ramier, Pigeon des bois.

Eng. Wood Pigeon.

يدثن عشه في الأشجار الرفيعة الوارفة الظل، انثاء تبيض وتحضن من مرة الى مرتين في العام. حضنتها بيضتان لونهما الى البياض العاجي تعلوه مشحة زرقاء تزداد وضوحاً عند العقب. الحضن يستمر نحو ١٦ يوماً تقوم به الأنثى بمناوبة الذكر، الجوازل تهجر العش بعد النقف بستة أسابيع.

يعتبر من الطرائد المرغوب فيها، الجيدة الصنف.



وَقَوَاقِ أَرَبْد، كُوكُو مَبْدُول



N.S. Troglodytes parvulus.
Fr. Troglodyte mignon.
Eng. Common Wren.

وَصَعَّة، عَصْفُورِ السِّت

ومن أسمائه المشهورة حَمَام قَوَال، سُخْفُوت، قَوَقَل، هُوهُو. وهو نوع من الوقواق ينتمي الى فصيلة الفيقوبيات. موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وبعض مناطق افريقية اخصها الشرقية والشمالية والاستوائية. يمضي الربيع والصيف في الاقاليم المعتدلة، والخريف والشتاء في الأقاليم الحارة الدافئة. وهو من الطيور الضواري التي تسير في الليل. معظم اسرابه يقيم في لبنان أسابيع معدودة وبعضها يقيم نحو ١٨ اسبوعاً ابتداءً من أوائل أيار.

جسمه رشيق القوام، قدره قدر الحمامة. طوله نحو ٣٢ سم. وبسطه نحو ٤٦ سم. رأسه متوسط القد. عيناه صغيرتان، مستديرتان، برتقائيتا اللون، يطوقهما اطار امرط. منشقاه مستديرا النقرة. منقاده واسع الشدق، معتدل الطول، ضعيف البنية، مقوص الطرف، اسمر اللون، اصفر القاعدة، اسود الملقط. رسغاه قصيرتان، ضعيفتان، لونهما الى الصفرة. رجلاه رابعيتا الأصابع الصفراء اللون الضعيفة المخالب. جناحه مستطيل القد، مدبب الطرف. ذنبه مخروطي الشكل، رتاجي التصنيف بالغ الطول، عشاري الرفال.

ثوبه قريب الشبه بثوب الباشق مع ارمداه وتوشيمه وحسن تبيجه، رأسه ورداءه وظهره وعجزه وسائر صفحاته العلوية الى الرمادي السبوري الازرق الموج. نحره وزوره الى الرمادي الفاتح الجميل اللمعة. قوادم جناحه مدبجة ببقع بيض. صدره وبطنه واطلاها وافنيكه الى الغبرة البيضاء تعلوها خطوط بيضاء داكنة. ذنبه الى الزرقة السوداء الموج. رفاله بيض الأطراف ويعلمو نصالها الوحشية والانسية بعض التبايع البيض اللامتساوية الاتساع.

الانثى اصغر قدماً من الذكر وثوبها يختلف، بعض الشيء، عن ثوبه. رأسها ونحرها وزورها مجذعة وموشمة بالبيبي الأسمر. رداؤها وظهرها وعجزها والصفحة العليا من جناحها وذنبها الى السمرة البنية الصفراء الموج تعلوها تجذيع معترض قاتم السمرة الكستنية متباين الرحابة والطول. صدرها وبطنها واطلاها وافنيكها لا تختلف عما في الذكر إلا ان غبرة البياض تنحرف الى الصفرة.

اليافع كالبالغ ولكنه قليل التزاويق.

ومن أسمائه الوَصَع والْوَصَع ج. وِضَعَان. ويدعى في مصر «طرغلودس» و «بكله الاسوار». وهو طائر غريد من فصيلة الوصعيات ورتبة الجوائم، اعطانه تشمل معظم البلاد الاسيوية والاروية وافريقية الشمالية. وهو من اوابد لبنان المبدولة في معظم المناطق.

جسمه صغير القد، طوله لا يتجاوز ١٠ سم، وبسطه نحو ٩ سم. ثوبه الى الريدة السماء يعلوها تجذيع معترض اسود. صفحته العليا من الرأس الى الذنب اعقب من السفلى، الصنابية الموج. جناحاه مستعرضان قصيران يعلوهما عند الاطراف الخارجية تجذيع ابيض يتخلل الأسود. صدغاه وزوره الى الصهبة الصنابية. حدقة عينه خنوية اللون. منقاره مخزوي الشكل، دقيق الطرف المحدودب بعض الشيء، لونه الى الشهبة الحمراء الموج. ذنبه متوسط الطول، مقطوم الطرف. رسغاه وأصابعه الى الجؤوة.

الانثى واليافع يرتديان الثوب نفسه.

يألف الحدائق والادغال والعوسج والسيجات ويجتنب المواقع الجرداء الخالية من الشجر. يتميز بشدة النشاط والمرح والحذر. يدلف الى الأرض بسرعة ويتنقل بخفة ورشاقة ولكنه لا يطير إلا مسافات قصيرة، طيرانه سفيف افقي الخط، قصير الشوط.

يدئن عشه في الادغال والجنبات الفناء. عشه كروي الشكل، جانبي المدخل، متين الحبك يحوكة الذكر بالطحلب والشبا والقش الناعم وقرشه الانثى بالسيب والصفوف. الانثى تبيض مرتين في العام، المرة الاولى في نيسان والثانية في تموز. حضنتها تراوح من ٦ الى ٨ بيضات عاجية اللون يعلوها موج اصفر وتنقيط جوي يكثر عند العقب، الحضن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

قوته الديدان والعناكب والذباب والارق والهوام.

يعتبر من العصافير الجزيلة النفع الجديرة بالحماية.

فهرس الكتاب

N.S. Cuculus canorus.
Fr. Coucou gris.
Eng. Cuckoo (European form).

يتميز بصوته الذي يشبه الوقوة وبخفة طيرانه وسرعة انقضاضه وبطء سعيه على الأرض وعلى الأغصان .

ومن ميزات هذا النوع ان الذكور أكثر عددًا من الإناث والإناث تبيض في موسمها الحولي الذي يطول نحو ١٤ اسبوعًا من ٦ الى ٨ بيضات . وهي لا تحضن البيض ولا ترقق الفراخ بل تضع البيض خلسة في أعشاش بعض الطيور الجوانم واخصها الذرة والدخلة والهازجة والجشنة وابلق القلع الخ ... ولا تلقي في العش الواحد إلا بيضة واحدة ذلك لأنها تسافد عدة ذكور وكلما بكها ذكر تبيض بيضة . وحيث انها تبيض من ٦ الى ٨ بيضات ، لذلك يمكن القول انها تسافد في موسمها الحولي من ٦ الى ٨ ذكور .

بيضتها صغيرة القدغراء اللون مرقوشة بالاسمر والجوي والأخضر القاتم . النقف يستوجب نحو ١٢ يومًا . والفرخ بهجر العش عندما يبلغ عمره ١٩ يومًا . يألف الاحراج ولا يتعد عنها إلا قليلاً ، قوته الحشرات على اختلاف أنواعها واخصها الأساريع الكثيفة الهلب . يعتبر من الطيور النافعة اللامؤذية الواجب حمايتها .

الفهرس العربي

بوقفة سلطانة ٣٦
 بومة اذناء ٣٨
 بومة صمغاء ٣٩
 بوهة ٤٠

ت

تيس سرياني ٤٢
 ترغلة شائعة ٤٣
 ترغلة مطوقة ٤٤
 ترمدي ١٣٤
 تفلق الماء ٤٥
 تقييحي مبدول ٤٧
 تنجي قورمزي ٤٩

ث

ثيت ٨٩

ج

جدل ١٥٥
 جرادية ١٥٦
 جشة الحقل ٥٠
 جليل اغبس ١١١
 جمل الماء ٢٩
 جملاثة ٨٥
 جونية ١٩١

أم عجلان ١٠٢
 أم فصبي ١٩٥
 أم فويق ١٤٣
 أم نوح ٢١٧

ب

بازي ٢٧
 باشق معر ٢٨٠
 بجمع اشتمح ٢٩
 برفش مبدول ١٣٣
 برسكة ٣١
 بط خضما ٣١
 بعنة مبدولة ٣٣
 بقويفة سلطانة ٣٦

بكاسين سميرة ١٣٨
 بكاسين مبدولة ١٤٠
 بلاج ١٩٧
 بلبل الشعير ٢٥
 بلبل الغاب الأنمر ١٤٢
 بلبل الماء ٨٨
 بلبل لبناشي ٣٤
 بلقط ١٠٠
 بلقوط ١٠٠
 بوبانة الطيون ٣٥

ا

أبلق القلع ١٨
 أبو الجن ٢٠
 أبو الجناء ٢٠
 أبو براقش ٩٣
 أبو دحثة ٨٨
 أبو زريق ٢١
 أبو صوي ١٤٦
 أبو طيط متوج ٢٢
 أبو عمي ١١٩
 أبو قلنسوة ٢٣
 أبو قيق ٢٢
 أبو لوي ٢٤
 أبي الرقص ١٨٨
 أجدل ١٥٥
 أرطلان ٢٥
 آصي ٥٥
 أطرغلة شائعة ٤٣
 أطرغلة مطوقة ٤٤
 أكحل ٢٦
 آكل النطاط الأنمر ١٤٢
 أم السهر ١٤٣
 أم الصخر ٣٣
 أم سكمكع ١٠٣

- حَجَل أَحْمَر ٥١ .
حَجَل رُومِي ٥٣ .
حُجَيْجَة ٧٥ .
حِدَاء حَمْرَاء ٥٥ .
حِدَاء سَوْدَاء ٥٦ .
حِدَاء شَائِعَة ٥٥ .
حَذَف شَتَوِي ٥٧ .
حَذَف صَبِيغِي ٥٩ .
حَر ٦١ .
حَسُون ٦٢ .
حَمَام قَوَال ٢٢٥ .
حَمِيرَاء سَوْدَاء الرَّاس ١٩٨ .
حَمِيرَاء سَوْدَاء الزُّور ١٩٩ .
حَمَّة ٦٤ .
حَوْصَل ٢٩ .
حِيدُون ٦٦ .

- خَائِتَة ١٦٦ .
خَاطِيَة ١٦٦ .
خَبَل ٦٨ .
خَتَق ١٩٠ .
خُدَارِيَة ١٦٧ .
خُرْقَة ٧٠ .
خَضَار مَبْدُول ٧١ .
خَضِير ٧٣ .
خَضِيرِي ٧٣ .
خَطَاف المَدَاخِن ٧٤ .
خَطَاف النَّوَاذِن ٧٥ .
خَطَاف مَبْدُول ٧٤ .
خَطَف أَنَسَم ١٢٣ .
خَشَع الزَّيْتُون ١٠٥ .

خَشَع الغَاب ٢٥٨ .
خَبَال البَادِيَة الأَغْبَس ١١١ .

- دُج أَزْرَق ٧٦ .
دُج الصُّخُور ٧٧ .
دَجَاجَة الأَرْض المَبْدُولَة ٧٩ .
دَجَاجَة المَاء المَبْدُولَة ٨١ .
دُخَلَة البَسَاتِين ٨٣ .
دُخَلَة تَرْنَارَة ٨٤ .
دُخَلَة شَائِعَة ٨٥ .
دُخَلَة شَوَالَة ٨٦ .
دُخَلَة غَرِيذَة ٨٧ .
دَحَاء ٨٨ .
دَحَان ٨٨ .
دُرَاج شَائِع ٨٩ .
دُرَجُوج شَائِع ٨٩ .
دَرَسَة القَصَب المَطْوَقَة ١٥٧ .
دَرَسَة زَمْدَاء ٩٠ .
دَرَسَة سَوْدَاء الرَّاس ٩١ .
دَرَسَة صَفْرَاء ٩٢ .
دَرَسَة صَفْرَاء العُنُق ٢٥ .
دَرَسَة كَبِيرَة ٢٦ .
دِعْوِيَّتَة قَنْبَرِيَة ١٤٩ .
دِعْوِيَّتَة مُجَدَّعَة ١٥٠ .
دَعْنَاش مَبْدُول ٩٣ .
دَلَم ٩٥ .
دَمَشَق مُذَهَب ١١٢ .
دَمَشَق مَطْوَق ١١٤ .
دُورِي البِيَادِر ٩٧ .
دُورِي البِيوت ٩٨ .
دُورِي الغَاب ١٠٠ .
دُورِي جَبَلِي ٩٧ .

دُورِي مَبْدُول ٩٨ .
دُوتِك الجَبَل ٢١٩ .

ذُعْرَة الرِّبِيع ١٠١ .
ذُعْرَة بَلْقَاء ١٠٣ .
ذُعْلُوقَة الزَّيْتُون ١٠٥ .

رَحْمَة ١٠٧ .

زَاع ١٠٨ .
زُرْزُور مَأْلُوف ١٠٩ .
زُرُق الشَّرْق ١١٠ .
زُرِّيَاب البَلُوط ٢١ .
زُعْرُغ أَغْبَس ١١١ .
زَفْرَاق شَامِي ٢٢ .
زَفْرَاق مُذَهَب ١١٢ .
زَفْرَاق مَطْوَق ١١٤ .
زَفْرَاق نَاحِس ٢١٦ .
زَمَّت لُبْنَانِي ١٧٥ .
زُمُج المَاء الأَرْقَش ١١٥ .
زُمُج المَاء الأَغْبَر ١١٧ .

سَبَد شَائِع ١١٩ .
سَقَاء ٢٩ .
سَقَاوَة شَائِعَة ١٢٠ .
سُكْسُكَة الحَدَاقِيق ٢١٤ .
سُكْسُكَة صِنَائِيَة ٢١٥ .
سَكَلَة ٧٧ .
سَكَلَة زَرْقَاء ٧٦ .
سَلُوي ١٥٣ .

سَمَامَة الصُّرُود ١٢٢ .
سَمَامَة رَبْدَاء ١٢٣ .
سَمَامَة سَوْدَاء ١٢٤ .
سَمَانِي مَبْدُولَة ١٧٩ .
سَمَرَمَد ١٢٥ .
سَمَرَمَر ١٢٥ .
سَمَنَة اللِّبْق ١٢٦ .
سَمَنَة الهَدَال ١٢٦ .
سَمَنَة شَائِعَة ١٢٨ .
سَمَنَة غَرِيذَة ١٢٧ .
سَمَنَة مِجْرَالَة ٧ .
سَمَنَة مُطْرِبَة ١٢٨ .

سَمَلِي ١٩٦ .
سُنُونُو البِيوت ٧٥ .
سُنُونُو العُمْرَان ٧٤ .
سَهُوك ١٦٨ .

شَاه بَار ٢٧ .
شَاهِين ١٣٠ .
شَحْرُور أَسُود ١٣١ .
شَحْرُور سُورِي ١٣٢ .
شُخْفُوت ٢٢٥ .
شُرْشُور مَبْدُول ١٣٣ .
شُرْشِير شِتَوِي ٥٧ .
شُرْشِير صَبِيغِي ٥٩ .
شَرَق ١٣٤ .
شَرِيف خَضْرِي ٣١ .
شُسَنَة خَضْرَاء ١٣٦ .
شُقْرَاق أَزْرَق ١٣٧ .
شُقْرُق شَائِع ١٣٧ .
شُكْبَة المَسَاقِع ١٤٠ .
شُكْبَة صَغِيرَة ١٣٨ .

شُكْبَة مَبْدُولَة ١٤٠ .
شُنَار ٥٣ .
شُنْدَل أَنَمَر ١٤٢ .
شُنْقَبَة صَغِيرَة ١٣٨ .
شُنْقَبَة مَبْدُولَة ١٤٠ .
شَوَالَة ٨٦ .
شُوحَة ١٠٧ .
شُويْكِِي ٦٢ .

صَدَاحَة الغَاب ٢٠٦ .
صَدَى ١٤٣ .
صِر الصُّخُور ١٤٤ .
صِرَارَة المَتَوَسِّط ١٤٦ .
صِرْد أَزِيد ١٤٧ .
صِرْد البَادِيَة ١٤٧ .
صِعْوَة الحَطَب ٢٥ .
صِعْوَة قَنْبَرِيَة ١٤٩ .
صِعْوَة مُجَدَّعَة ١٥٠ .
صَعْنَج ٩٢ .
صَفْرَايَة مَبْدُولَة ١٥١ .
صَفْرَايَة الشَّعِير ٩٢ .
صَفْرَايَة الشَّعِير السُّورِيَة ٩٠ .
صَفْرَايَة الشَّعِير سَوْدَاء الرَّاس ٩١ .
صَفْرَايَة مَأْلُوقَة ١٥١ .
صِفْرِد ١٥٣ .
صَقْر ١٥٥ .
صَقْر الأَزْب ١٦٥ .
صَقْر الجِرَاد ١٥٦ .
صَقْر الغَزَال ١٣٤ .
صَقْر بَار ٢٧ .
صَقْر جِرَاح ١٢٠ .

صَقْر حَر ٦١ .
صَقْر حَوَام ١٢٠ .

ضَرْب أَزِيد ١٤٧ .
ضَوْضُؤ شَائِع ١٣٧ .

طَرَبَال مُطَوَّق ١٥٧ .
طَرَسُوم ٥٠ .
طَرَطْبِيس ٢٢ .
طُوط ٢٨ .

طَبِيط مَتَوَج ٢٢ .
طَبِيطُوي أَحْمَر السَّاق ١٥٩ .
طَبِيطُوي أَخْضَر ١٦٠ .

عَاسُوق مَعْرُوف ١٦٢ .
عُصْفُور السِّت ٢٢٤ .
عُصْفُور الشُّوك الجَبَلِي ١٦٣ .
عُصْفُور الشُّوك الصَّغِير ١٦٤ .
عُقَاب البَادِيَة ١٦٧ .
عُقَاب سَعَاء ١٦٥ .
عُقَاب قَيْصَرِيَة ١٦٦ .
عُقَاب مُسِيرَة ١٦٧ .
عُقَاب مُوزَرَة ١٦٨ .
عَقَمَق مَبْدُول ١٦٩ .
عَقَمَق مَعْرُوف ١٦٩ .
عَلْعَل مَبْدُول ١٧١ .
عَلْعَل مَعْرُوف ١٧١ .
عَلْعَلَة ١٧١ .
عَنْدَلِيب ١٧٢ .
عَوَار ١٢٢ .

عوسق ١٦٢ .
عوهق ١٢٤ .

غ

غُرَاب أَبْعَق ١٧٣ .
غُرَاب لُبْنَانِي ١٧٥ .
غُرَّة سَوْدَاء ١٧٦ .

ف

فَتَّاح ١٠١ .
فَدَادَة الشَّرْق ١٧٨ .
فِرْيَ مَبْدُول ١٧٩ .
فُسَيْكَة ١٩٥ .
فُضِيَّة مَرُوحِيَّة الذَّنَب ١٩٥ .
فَقَّاح ١٠١ .

ق

قَاق ١٧٣ .
قَاوْنِد شَائِع ١٨٨ .
قَبْرَة الحُقُول ١٨١ .
قَبْرَة العِيَاض ١٨٢ .
قَبْرَة مُتَوَجِّه ١٨٣ .
قَبْرَة مَعْرُوفَة ١٨١ .
قَرَاع أَحْمَر الرُّأْس ٢١١ .
قَرَاع صَغِير ٢١٢ .
قَرَاع كَبِير ٢١٣ .
قُرْقَب أَرْزَق ١٨٤ .
قُرْقَب كَبِير ١٨٦ .
قُرْقَف أَرْزَق ١٨٤ .
قُرْقَف كَبِير ١٨٦ .
قُرْقَفَنَة ٨٧ .

قِرْلَى شَائِع ١٨٨ .
قِسْعَام أَكْلَف ١٩٠ .

قَطَاة سَوْدَاء البُطْن ١٩١ .
قَطَاة شَرْقِيَّة ١٩١ .
قَطَاة عِرَاقِيَّة ١٩٢ .
قَطَاة كُدْرِيَّة ١٩٢ .
قَطَامِي ١٥٥ .

قَعَق ١٦٩ .

قَلْبِي ١٨ .

قَمِيحِي ٢٦ .

قُبْرَة العِيَاض ١٨٢ .

قُبْرَة مُتَوَجِّه ١٨٣ .

قُوبَاة ١٨٣ .

قُوع ١٠١ .

قُوف ٢٩ .

قُوقَل ٢٢٥ .

قَبُون إِزْمِيرِي ١٩٤ .

قَبُون العَاقِب ١٩٤ .

ك

كاسر الجوز السرياني ٤٢ .
كَحْلَاء ٢٦ .
كَحِيحِيَّة ٨٧ .
كُدْرِيَّة ١٩٢ .
كِرْكُج ٥٩ .
كِرْوَان مَبْدُول ١٩٥ .
كَمُتْر مَبْدُول ١٩٦ .
كَمِيَّت لُبْنَانِي ٣٤ .
كُنْدُش مَبْدُول ١٦٩ .
كُوكُو مَبْدُول ٢٢٥ .
كَمِي ٢٩ .

ل

لَفْلَاق أبيض ١٩٧ .
لَفْلَاق أبيض ١٩٧ .

٢٢٢

لَهَب أسود الرأس ١٩٨ .
لَهَب أسود الزور ١٩٩ .
لِوَاء ٢٤ .
لُويح ٢٧ .

م

مُتَوَقَل العَاقِب ٢٠١ .

مُرَعَة شَائِعَة ٢٠٢ .

مُرَعَة مَرُوطَة ٢٠٢ .

مَرِيحِي مَبْدُول ١٧٩ .

مُرَقَة ٢٠٤ .

مُسَهْر ٢٠٤ .

مَطُوق ١٨١ .

مَلَاعِب ظِلّه ١٨٨ .

مَلَك العُقْبَان ١٦٦ .

ن

نَاقُوبَة السِنْدِيَان ٢١٢ .

نَاقُوبَة الصَّنُوبِر ٢١٣ .

نَاقُوبَة حَمْرَاء الرُّأْس ٢١١ .

نَدَاخَة ٢٠٦ .

نَسْر الجِوَاء ٢٠٨ .

نَسْنَاسَة ١٦٠ .

نَعَّار ٢٠٩ .

نُعْر سُورِي ٢٠٩ .

نُعْر لُبْنَانِي ٣٤ .

نَقَّاد مَبْدُول ٢١٠ .

نَقَّار أَحْمَر الرُّأْس ٢١١ .

نَقَّار أَحْضَر ١٣٦ .

نَقَّار الشُّوك ٦٢ .

نَقَّار صَغِير ٢١٢ .

نَقَّار كَبِير ٢١٣ .

نَقْشَارَة الحَدَائِق ٢١٤ .

نَقْشَارَة صَيَابِيَّة ٢١٥ .
نُهَيُوع نَاحِيس ٢١٦ .
نُورِس أَرْقَش ١١٥ .
نُورِس أَغْبَر ١١٧ .

ه

هَازِجَة الأَسَل ٢١٧ .

هَازِجَة السُّعْد ٢١٧ .

هَازِجَة السَّمَار ٢١٧ .
هَازِجَة القَصَب ٢١٨ .
هَامَة ٣٣ .
هَذْمُد شَائِع ٢١٩ .
هَزَّار أَشْرَق ٢٢١ .
هُوهُ ٢٢٥ .

و

وَرَشَان ٢٢٢ .

وَرُور مَبْدُول ٧١ .
وَرُور مَبْدُول ٧١ .
وَصَعَة ٢٢٤ .
وَقُوق أُرِيد ٢٢٥ .

ي

يَعْقُوب ٥٣ .
يُؤْيُؤ ١٥٦ .

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام